

Bipacksedel: Information till användaren

ACO Acelösning 20 mg/g, kutan lösning
salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad ACO Acelösning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acelösning
3. Hur du använder ACO Acelösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Acelösning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Acelösning är och vad det används för

ACO Acelösning används för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acelösning

Använd inte ACO Acelösning:

- om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är i de sista tre månaderna av graviditeten.

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare vid djupa inflammatoriska förändringar då dessa kan orsaka ärr.

Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och ACO Acelösning

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen använt ACO Acelösning.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte ACO Acelösning om du är i de sista tre månaderna av graviditeten.

Du ska inte använda ACO Acelösning under graviditetens sex första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt.

Orala former (t.ex. tabletter) av den här läkemedelsklassen kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för ACO Acelösning när det används på huden.

Amning

Kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ACO Acelösning påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

ACO Acelösning innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller ca 550 mg alkohol (etanol) per ml.

Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

3. Hur du använder ACO Acelösning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Badda lösningen på redan existerande acne och på hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Lösningen kan ge övergående sveda.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): kontakteksem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Acelösning ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g kutan lösning innehåller 20 mg salicylsyra.
 - Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96 v/v %), glycerol och renat vatten.
- Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol och denatoniumbensoat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karakteristisk doft av etanol.
200 ml plastflaska med skruvlock samt insats av plast.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB
Box 622
194 26 Upplands Väsby

Tillverkare:
Unimedic AB
Matfors

FARMACLAIR - HEROUVILLE SAINT CLAIR
440 avenue du Général de Gaulle,
14200 Hérouville Saint Clair, France

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-04-29