

Bipacksedel: Information till användaren

Adenosin Life Medical 5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning.
(Adenosin)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Adenosin Life Medical är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Adenosin Life Medical
3. Hur du använder Adenosin Life Medical
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Adenosin Life Medical ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Adenosin Life Medical är och vad det används för

Adenosin Life Medical är ett läkemedel mot arytmi. Det används för att diagnostisera och behandla rytmförändringar i hjärtat. Det används också som hjälp att ställa diagnoser, för att utvidga blodådrorna i hjärtat i samband med ett stresstest (fotografering av hjärtat).

2. Vad du behöver veta innan du använder Adenosin Life Medical

Du kommer att få Adenosin Life Medical antingen som en injektion eller som en infusion (dropp). Innan du får Adenosin Life Medical kommer din läkare ställa frågor om din medicinska historia (tidigare sjukdomar).

Använd inte Adenosin Life Medical

- om du är överkänslig (allergisk) mot adenosin eller mannitol.
- om du har haft allvarliga hjärtbesvär
- om du växelvís har snabb och långsam hjärtrytm och inte har en fungerande pacemaker.
- om du har lågt blodtryck
- om du känner tryckande smärta mitt i bröstet.
- om du har haft hjärtsvikt

Använd inte Adenosin Life Medical som en *infusion* om

- du har förhöjt tryck i hjärnan
- du har minskad blodvolym (hypovolemi)
- du får dipyridamol (används till att förebygga blodproppar)

Tala om för din läkare om någon av ovanstående punkter stämmer på dig.

Varningar och försiktighet

På grund av medicinens verkningsätt, kan den påverka hjärtfunktionen. Din läkare kommer kontrollera hur ditt hjärta reagerar på behandlingen med denna medicin.

Tala om för din läkare:

- om du genomgått en hjärttransplantation, eftersom du då kan vara mer känslig för medicinens biverkningar.

- om du har haft hjärtproblem, inklusive hjärtattack.
- Om du lider av andfåddhet, pipande andningsljud eller annan sjukdom som påverkar lungorna.
- Om du tar teofyllin (används för astma eller bronkit)
- Om du tar någon annan medicin som påverkar hjärtrytmen.

Andra läkemedel och Adenosin Life Medical

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Adenosin Life Medical med mat och dryck

Tala om för läkare om du har ätit eller druckit någonting som innehåller koffein de senaste 12 timmarna.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du tror du är gravid. Det finns begränsad information om användande av Adenosin Life Medical under graviditet.

Adenosin Life Medical kan användas när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga särskilda försiktighetsåtgärder behövs.

3. Hur du använder Adenosin Life Medical

Adenosin Life Medical ges till dig direkt i en ven av en specialistläkare.

När Adenosin Life Medical används till att ställa diagnosen och behandla rytmförändringar i hjärtat, ges det som en snabb injektion och vanlig dos är:

Vuxna: Vanlig startdos är 5 mg, om detta inte fungerar kan 10 mg ges och sedan 15 mg.

Spädbarn, barn och ungdomar: Dosen är relaterad till kroppsvikten med en startdos på 50 µg/kg kroppsvikt.

När Adenosin Life Medical används till att ställa diagnos (stresstest) ges det som en infusion (dropp) och normal infusionshastighet är 140 µg/kg/min som ges under 4-6 minuter.

Ditt hjärta kontrolleras under tiden du får Adenosin Life Medical. Om du känner att effekten av Adenosin Life Medical är för stark eller för svag, tala om det för din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lindriga och snabbt övergående.

När Adenosin Life Medical ges som injektion, försvinner symtomen vanligen inom 30 sekunder.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Andningssvårigheter, rodnad, tryckkänsla i bröstet, huvudvärk, yrsel, bröstsmärtor, snabba hjärtslag, illamående, myrkrypningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

svettning, hjärklappning, lågt blodtryck, metallsmak i munnen, tryck i ljumsken, snabb andningsfrekvens, oro, dimsyn.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Försämring av astma bronkiale, förändringar i hjärtfunktionen kan inträffa.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Spasm i hjärtats artärer vilket kan leda till en hjärtinfarkt.

När medicinen ges som intravenös infusion, förekommer biverkningar oftare, men är fortfarande lindriga och försvinner efter några minuter. För att minska frekvensen biverkningar kan infusionen kombineras med lättare fysisk aktivitet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, bröst- och käksmärta, yrsel, rodnad, förändring i hjärtrytm men såsom missade eller extra hjärtslag. Oregelbundna eller långsamma hjärtslag, illamående, magont, andningssvårighet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): hjärklappning, lågt blodtryck, snabb andningsfrekvens.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Bronkospasm, även hos patienter som inte lider av bronkial astma eller obstruktiv lungsjukdom

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Spasm i hjärtats artärer vilket kan leda till en hjärtinfarkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. HUR ADENOSIN LIFE MEDICAL SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Medicin som inte använts direkt ska kasseras.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är adenosin, 5mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är mannitol 50 mg/ml och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Adenosin Life Medical är en adenosinlösning för injektion eller infusion (dropp).

Klar och färglös lösning i glasflaskor (10 eller 50 ml) eller i glasampuller (2 ml).

Förpackningsstorlekar: 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml, 10 x 50 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare:

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Formvägen 5 B; Box 3076, SE-903 03 Umeå.

eller

Anfarm Hellas S.A 61st km National Road Athens-Lamia, Schimatari Viotias, 32009 Grekland

Denna bipacksedel innehåller inte all information om din medicin. Om du är osäker, tala med din läkare.

Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-08