

Bipacksedel: Information till användaren

Algovil 400 mg mjuk kapsel ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna bipacksedel. du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre:
 - Ungdomar: efter 3 dagars behandling,
 - Vuxna: efter 3 dagars behandling av feber eller efter 4 dagars behandling av smärta.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Algovil är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Algovil
3. Hur du använder Algovil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Algovil ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Algovil är och vad det används för

Ibuprofen hör till en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Dessa läkemedel ger symtomlindring genom att ändra kroppens reaktion på smärta och feber.

Algovil används till vuxna och ungdomar med en vikt på 40 kg eller mer (12 år och äldre) för tillfällig behandling av:

- lätt till måttlig smärta såsom huvudvärk, mensvärk, tandvärk
- feber i samband med förkylning.

Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om ditt tillstånd försämras:

- Ungdomar: efter 3 dagars behandling,
- Vuxna: efter 3 dagars behandling av feber eller efter 4 dagars behandling av smärta.

Ibuprofen som finns i Algovil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Algovil

Använd inte Algovil

- Om du är allergisk mot ibuprofen eller något av de övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du tidigare har haft andnöd, astma, rinnande näsa, svullnad eller nässelutslag (kliande hudutslag) efter att ha tagit acetylsalicylsyra eller andra liknande smärtstillande läkemedel (NSAID).

- Om du har eller har haft sår, perforering (hål i tarmväggen) eller blödning i magsäcken eller tolvfingertarmen vid minst två tillfällen.
- Om du haft blödning eller perforering i magtarmkanalen när du tidigare tagit NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).
- Om du har av oförklarliga störningar i blodbildningen.
- Om du har allvarlig njur-, lever- eller hjärtsvikt.
- Om du är i graviditetens sista tre månader (se avsnitt "Graviditet och amning").
- Om du lider av svår uttorkning på grund av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag.
- Om du har blödning i hjärnan (cerebrovaskulär blödning) eller annan aktiv blödning.

Använd inte Algovil till ungdomar som väger mindre än 40 kg eller till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Algovil:

- Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller bindvävssjukdom som ger varierande symtom (störningar i immunsystemet som orsakar ledsmärta, utslag och feber).
- Om du har vissa ärftliga störningar i blodbildningen (t.ex. akut intermittent porfyri) eller problem med blodkoagulering.
- Om du har eller har haft tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom).
- Om du har nedsatt njurfunktion.
- Om du har leverproblem.
- Om du nyligen har genomgått en större operation.
- Om du har eller har haft astma eller allergiska besvär, då andnöd kan förekomma.
- Om du lider av hösnuva, näspolyper eller kroniskt obstruktiva luftvägssjukdomar då det finns en ökad risk för allergiska reaktioner. Dessa reaktioner kan yttra sig som astmaanfall (s.k. analgetisk astma), akuta svullnader (angioödem) eller hudutslag.
- Om du tar andra läkemedel som kan öka risken för sårbildning eller blödning, t.ex. orala kortikosteroider, blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin), selektiva serotoninåterupptagshämmare (läkemedel mot depression) eller trombocythämmande medel som acetylsalicylsyra.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

I samband med ibuprofen har tecken på en allergisk reaktion på detta läkemedel, inklusive andningssvårigheter, svullnad i ansiktet och halsregionen (angioödem), bröstsmärta, rapporterats. Avbryt omedelbart intaget av Algovil och kontakta läkare eller medicinsk akutmottagning om du märker något av dessa tecken.

Övriga varningar

- Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan förvärra symtomen. Om detta gäller dig ska du sluta använda av Algovil och kontakta läkare.
- Använd inte Algovil om du har vattkoppor (varicella).
- Om Algovil tas under en längre tid, bör blod-, lever- och njurvärden kontrolleras regelbundet.
- Om Algovil tas tillsammans med andra NSAID-preparat, inklusive selektiva cyklooxygenas-2-hämmare, kan det orsaka ökad risk för biverkningar och ska därför undvikas. (se avsnitt "Andra läkemedel och Algovil" nedan).
- Långvarig eller frekvent användning av (olika typer av) smärtstillande läkemedel kan i allmänhet leda till permanenta allvarliga njurproblem och bör därför undvikas. Saltförlust och uttorkning ökar risken ytterligare.
- Hos uttorkade ungdomar finns risk för nedsatt njurfunktion.

Infektioner

Algovil kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Algovil göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits

vid lunginflammation orsakad av bakterier och bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och dina symtom på infektionen kvarstår eller förvärras, kontakta läkare:

- *Ungdomar över 12 år*: Kontakta läkare om ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.
- *Vuxna*: Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 3 dagar vid feber och 4 dagar vid smärta.

Hudreaktioner

I samband med användning av ibuprofen har allvarliga hudreaktioner som exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofila granulocyter och systemiska symtom (DRESS), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) rapporterats. Avbryt intaget av Algovil och kontakta omedelbart läkare om du får något av de symtom som är relaterade till allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Värktabletter och antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen kan vara förknippade med viss ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke, särskilt när de används i höga doser. Den rekommenderade dosen eller behandlingstiden får inte överskridas.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du:

- har hjärtproblem, t.ex. hjärtsvikt, kärlkramp (angina pectoris) eller om du har haft en hjärtinfarkt, bypassoperation, perifer artärsjukdom (dålig blodcirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade artärer) eller stroke (inklusive "mini-stroke" eller övergående ischemisk attack "TIA").
- har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, förekomst av hjärtsjukdom eller stroke i släkten eller om du är rökare.

För att minimera biverkningar ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga tid. Risken för biverkningar är större hos äldre personer.

Om något av ovanstående gäller dig, rådgör med läkare innan du tar Algovil.

Ungdomar

Använd inte Algovil till ungdomar som väger mindre än 40 kg eller till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Algovil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Algovil kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

- antikoagulerande medel (läkemedel som förhindrar blodproppar, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)
- blodtryckssänkande läkemedel (ACE-hämmare såsom kaptopril, betablockerare såsom atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister såsom losartan)

Behandlingen med Algovil kan också påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Rådfråga därför alltid läkare eller apotekspersonal innan du tar Algovil tillsammans med andra läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

Andra NSAID-preparat (antiinflammatoriska och smärtstillande medel), inklusive selektiva hämmare av cyklooxygenas-2	Kan öka risken för magsår eller blödning i magtarmkanalen
Digoxin (vid hjärtsvikt)	Effekten av digoxin kan förstärkas

Glukokortikoider (läkemedel som innehåller kortison eller kortisonliknande substanser)	Kan öka risken för magsår eller blödning i magtarmkanalen
Trombocytsänkande läkemedel	Kan öka risken för magsår eller blödning i magtarmkanalen
Fenytoin (mot epilepsi)	Effekten av fenytoin kan förstärkas
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (läkemedel som används mot depression)	Kan öka risken för blödning
Litium (läkemedel mot manodepressiv sjukdom och depression)	Effekten av litium kan förstärkas
Probenecid och sulfipyrazon (läkemedel mot gikt)	Det kan ta längre tid för ibuprofen att brytas ner av kroppen
Kaliumsparande diuretika	Kan leda till förhöjda kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi)
Metotrexat (läkemedel mot cancer eller reumatism)	Effekten av metotrexat kan förstärkas
Takrolimus och cyklosporin (immunosuppressiva läkemedel)	Njurskador kan uppstå
Zidovudin (läkemedel mot hiv)	Användning av Algovil kan leda till ökad risk för blödning i leder eller blödning som orsakar svullnad hos hiv-positiva hemofilpatienter
Sulfonylureaderivat (diabetesläkemedel)	Interaktioner kan förekomma
Kinolonantibiotika	Risken för konvulsioner (kramper) kan öka
Mifepriston (används för avbrytande av graviditet)	Mifeprisons effekt kan minska
Acetylsalicylsyra (låg dos)	Den blodförtunnande effekten kan försämrats
Blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin)	Ibuprofen kan öka effekten av dessa läkemedel
Vorikonazol och flukonazol (CYP2C9-hämmare) för behandling av svampinfektioner	Ibuprofens effekt kan öka. Minskning av ibuprofendosen bör övervägas, särskilt om en hög dos ibuprofen används samtidigt med vorikonazol eller/och flukonazol
Aminoglykosider (läkemedel mot vissa typer av bakterier)	NSAID kan minska utsöndringen av aminoglykosider
Kolestyramin (för behandling av högt kolesterol)	Upptaget av ibuprofen fördröjs och minskar. Läkemedlen bör därför intas med minst en timmes intervall.

Algovil med alkohol

När du tar Algovil ska du inte dricka alkohol. Risken för vissa biverkningar, t.ex. sådana som påverkar gastrointestinala kanalen eller centrala nervsystemet, kan öka om alkohol intas samtidigt som Algovil.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Tala om för din läkare att du är gravid om du tar Algovil.

Ta inte Algovil under graviditetens tre sista månader eftersom det kan skada ditt ofödda barn eller orsaka problem vid förlossningen. Det kan orsaka njur- och hjärtproblem hos ditt ofödda barn. Det kan påverka din och barnets benägenhet att blöda och göra att förlossningen sker senare eller tar längre tid än förväntat.

Du ska inte ta Algovil under graviditetens 6 första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden eller medan du försöker att bli gravid ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Från och med 20:e graviditetsveckan kan orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn om du tar det under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller slutning av ett blodkärl (ductus arteriosus) i barnets hjärta. Om du behöver längre behandling än några dagar kan din läkare rekommendera ytterligare övervakning.

Amning

Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Ibuprofen kan användas under amning om den rekommenderade dosen används under kortast möjliga tid. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av ibuprofen under amning.

Kvinnlig fertilitet

Om du har problem med att bli gravid ska du tala med din läkare innan du använder Algovil. Detta preparat tillhör en grupp av läkemedel (NSAID) som kan påverka fertiliteten hos kvinnor. Effekten försvinner dock när du slutar använda läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har vid kortvarig användning och vid normal dosering ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om man känner sig yr, dåsig, svimfärdig eller får synstörningar när man tar ibuprofen ska man inte köra bil eller använda maskiner. Effekterna kan förvärras om ibuprofen används i kombination med alkohol.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Algovil innehåller sorbitol

Varje kapsel av detta läkemedel innehåller 81,270 mg sorbitol.

Algovil innehåller nykockin

Kan orsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du använder Algovil

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om inte din läkare ordinerar annan dos är den vanliga doseringen följande:

Dosering

Vuxna och ungdomar med kroppsvikt från 40 kg (över 12 år)

Startdos: 1 kapsel (400 mg ibuprofen) med vatten, därefter vid behov 1 kapsel (400 mg ibuprofen) var sjätte timme.

Mer än 400 mg åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Ta inte mer än tre kapslar (1200 mg) per dygn.

Hur du tar Algovil

Ska sväljas. Tugga inte läkemedlet eftersom det kan orsaka irritation i munnen eller halsen.

Ta Algovil tillsammans med mat om du har känslig mage. Effekten kan vara fördröjd om Algovil tas strax efter en måltid. Tag i så fall inte mer Algovil än vad som rekommenderas och vänta tills det lämpliga intervallet mellan 2 doser har passerat.

Behandlingstid

Detta läkemedel är endast avsett för **kortvarig användning**. Lägsta effektiva dos ska användas under den kortaste tid som krävs för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och om symtomen (t.ex. feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

Användning hos ungdomar

Kontakta läkare om ungdomar behöver detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symtomen förvärras.

Användning hos vuxna

Kontakta din läkare om du behöver Algovil i mer än 3 dagar för behandling av feber och 4 dagar för behandling av smärta.

Kontakta läkare eller apotekspersonal även om du tror att effekten av detta läkemedel är starkare eller svagare än du förväntat dig.

Användning för barn

Ej avsett för ungdomar med en kroppsvikt under 40 kg eller barn under 12 år. Det finns andra mer lämpliga beredningar av ibuprofen tillgängliga för barn.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Läkare bör konsulteras av patienter med leverproblem innan de tar Algovil.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Läkare bör konsulteras av patienter med njurproblem innan de tar Algovil.

Om du använt för stor mängd av Algovil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med dig läkemedelsförpackningen och denna bipacksedel.

Eventuella symtom är illamående, kräkningar (kan vara blodiga kräkningar), blod i avföringen (gastrointestinal blödning), tinnitus, huvudvärk, magsmärtor, diarré och ryckiga ögonrörelser. Vid användning av höga doser har det rapporterats svaghet och yrsel, dåsighet, förvirring, desorientering, medvetlöshet, kall kroppskänsla, bröstsmärta, hjärtklappning, anfall av medvetlöshet med muskelryckningar (kramper, särskilt hos ungdomar), blod i urinen och andningssvårigheter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För att minimera biverkningarna bör man ta den lägsta dosen under den kortaste tid som krävs för att lindra symtomen. Det är möjligt att du får någon av de kända biverkningarna av NSAID-preparat (se nedan). Om detta sker, eller om du är orolig, ska du sluta använda detta läkemedel och snarast möjligt tala med din läkare. Äldre personer som tar detta läkemedel löper ökad risk för biverkningsproblem.

SLUTA TA detta läkemedel och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får:

- **symtom på tarmlödning**, t.ex.: svåra magsmärtor, svart tjärliknande avföring, kräkningar som innehåller blod eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump.
- **symtom på mycket sällsynta men allvarliga allergiska reaktioner**, t.ex. förvärrad astma, oförklarlig väsande andning, andnöd, svullnad i ansikte, tunga eller hals, andningssvårigheter, snabb hjärtrytm, plötsligt blodtrycksfall som kan leda till chock. Detta kan förekomma även om du tar detta läkemedel för första gången.
- **svåra hudreaktioner**, t.ex:
 - rödaktiga, icke upphöjda, målformade eller cirkulära fläckar på kroppen, ofta med centrala blåsor, hudavlossning, sår i mun, hals, näsa, könsorgan och ögon. Sådana svåra hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom [exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys].
 - omfattande utslag, hög kroppstemperatur och förstörade lymfkörtlar (DRESS-syndromet).
 - röda, fjällande, utbredda utslag med knölar under huden och blåsor åtföljda av feber. Symtomen uppträder vanligen i början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos).
- **bröstmärta**, vilket kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion kallad Kounis syndrom.

Meddela din läkare om du får någon av följande biverkningar, om de förvärras eller om du märker av några biverkningar som inte nämns i listan.

Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 person av 10)

- besvär i magtarmkanalen, t.ex. halsbränna, magsmärtor, illamående, matsmältningsstörningar, kräkningar, gasbildning, diarré, förstoppning. Lätt blodförlust i mage och/eller tarm som i undantagsfall kan orsaka blodbrist (anemi).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 person av 100)

- sår i magen eller tarmen, ibland med blödning och perforering, inflammation och sår i munslemhinnan (ulcerös stomatit), inflammation i magsäcken (gastrit), försämring av ulcerös kolit och Crohns sjukdom
- tillstånd i centrala nervsystemet, t.ex. huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, oro, irritabilitet eller trötthet
- synrubbningsar
- allergiska reaktioner, såsom utslag, klåda och astmaanfall. Avbryt användning av Algovil och kontakta läkare omedelbart.
- olika typer av utslag.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- tinnitus (ringningar i öronen)
- njurskador (papillär nekros) och förhöjda nivåer av urinsyra i blodet
- nedsatt hörsel
- förhöjda nivåer av urea i blodet
- sänkta hemoglobinnivåer

Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer)

- i samband med NSAID-behandling har svullnad (ödem), högt blodtryck (hypertoni) och hjärtsvikt rapporterats.
- inflammation i matstrupen eller bukspottkörteln, bildning av membranliknande förträngningar i tunn- och tjocktarmen (intestinala membranstrukturer).
- svåra infektioner i hud och mjukdelar har förekommit vid vattkoppor (varicella).
- mindre urinmängd och svullnad (särskilt hos patienter med högt blodtryck eller nedsatt njurfunktion); svullnad (ödem) och grumlig urin (nefrotiskt syndrom); inflammatorisk njursjukdom (interstitiell nefrit), som kan leda till akut njursvikt. Avbryt behandlingen med Algovil och kontakta omedelbart

läkare om något av de ovan nämnda symtomen uppträder eller om du känner dig allmänt nedstämd. Dessa symtom kan vara de första tecknen på njurskada eller njursvikt.

- problem med produktionen av blodkroppar; de första symtomen är: feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, svår trötthet, blödningar i näsa och hud. I sådana fall måste du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare. Dessa symtom får inte behandlas med smärtstillande medel eller andra läkemedel som sänker febern (febernedsättande medel).
- psykotiska reaktioner och depression
- vid behandling med NSAID har försämring av infektionsrelaterade inflammationer (t.ex. nekrotiserande fasciit) beskrivits. Om infektionssymtom uppträder eller förvärras under behandlingen med Algovil ska du omedelbart kontakta din läkare, som kan bedöma om behandling av infektionen med antibiotika eller andra infektionshämmande läkemedel är nödvändig.
- högt blodtryck, hjärklappning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt.
- försämrad leverfunktion, leverskada, särskilt under långvarig behandling, leversvikt, akut leverinflammation (hepatit).
- vid användning av ibuprofen har symtom på aseptisk meningit med nackstyvhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber eller medvetslöshet observerats. Patienter med autoimmuna sjukdomar (systemisk lupus erythematosus, blandad bindvävssjukdom) kan löpa högre risk att drabbas. Kontakta omedelbart läkare om du upplever dessa biverkningar.
- svåra former av hudreaktioner såsom utslag med rodnad och blåsbildning (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, Lyells syndrom), håravfall (alopeci).
- svåra generella överkänslighetsreaktioner.
- förvärring av astma och bronkospasm.
- inflammation i blodkärlen (vaskulit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- en svår hudreaktion som kallas DRESS syndrom (frekvens okänd) kan förekomma. Symtom på DRESS är: utslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).
- röda, fjällande, utbredda utslag med knölar under huden och blåsor. Knölarne är fyllda med var. Utslagen uppträder främst i hudveckan, bälgen och de övre extremiteterna (armarna) och åtföljs av feber när behandlingen inleds (akut generaliserad exantematös pustulos AGEP). Om dessa symtom uppstår ska du avbryta behandlingen med Algovil och omedelbart kontakta läkare. Se även avsnitt 2.
- huden blir ljuskänslig.

Läkemedel som Algovil kan vara förknippade med viss ökad risk för hjärtinfarkt (hjärtattack) eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Algovil ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen. Varje mjuk kapsel innehåller 400 mg ibuprofen.
- Övriga ingredienser är makrogol 600 (E1521), kaliumhydroxid (E525), gelatin, flytande sorbitol delvis dehydratiserad (E420), nykockin(E124) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Algovil är en röd, oval, genomskinlig, mjuk kapsel.

Blister av ogenomskinlig PVC/PVDC-aluminium.

Förpackningsstorlekar: 10 eller 20 mjuka kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories S.A

Kalyftaki 27

GR-145 64, Kifisia Attiki

Grekland

Tillverkare

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

14th km National Road 1

GR-145 64 Kifisia

Grekland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Cypern: Algovil Rapid 400 mg capsule, soft

Danmark: Algovil

Frankrike: Ibuprofen Intermed 400 mg, capsule molle

Grekland: Algotren Rapid

Nederländerna: Algotrencaps 400 mg capsule, zacht

Sverige: Algovil 400 mg capsule, soft

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-03