Bipacksedel: Information till användaren

Amidazed 1 mg/ml ögondroppar, lösning

propamidinisetionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amidazed är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Amidazed
3. Hur du använder Amidazed
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amidazed ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amidazed är och vad det används för

Amidazed innehåller den aktiva substansen propamidinisetionat. Den tillhör en grupp läkemedel som används mot infektioner orsakade av bakterier och/eller mikrosvampar. Det verkar genom att stoppa tillväxt av bakterier, vilket gör att din kropp kan bekämpa infektionen.

Det används för att behandla lindriga infektioner i ögonen eller ögonlocken. Symtom innefattar irriterade, röda eller inflammerade ögon, att ögonlocken är kladdiga eller att det bildas skorpor.

Propamidinisetionat som finns i Amidazed kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Amidazed

Använd inte Amidazed
- Om du är allergisk mot propamidinisetionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du använder kontaktlinser. Du ska inte använda kontaktlinser medan du använder dessa ögondroppar.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om något av följande inträffar under behandling med Amidazed:
- Du får nedsatt syn
- Du får en allergisk reaktion (hudrodnad, inflammation)

Barn och ungdomar
Användning av Amidazed hos barn och ungdomar har inte fastställts.

Andra läkemedel och Amidazed
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Din syn kan bli suddig precis efter att du använt detta läkemedel. Om det inträffar ska du inte framföra fordon eller använda verktyg eller maskiner förrän din syn har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amidazed innehåller bensalkoniumklorid
Detta läkemedel innehåller 0,05 mg bensalkoniumklorid per ml lösning motsvarande 0,05 mg/ml.

Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna.

Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

3. Hur du använder Amidazed

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1-2 droppar i det påverkade ögat upp till tre till fyra gånger dagligen, beroende på hur svår infektionen är.

Bruksanvisning:
- Tvätta händerna
- Ta av locket från flaskan
- Luta huvudet bakåt
- Tryck ut en eller två droppar innanför det nedre ögonlocket utan att droppspetsen vidrör ögat, ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor. Det kan förorena dropparna.
- Blunda och tryck med ett finger mot ögonvrån vid näsan i minst 1 minut. Det hindrar att läkemedlet når resten av kroppen.
- Torka bort eventuellt överskott av vätska från ögonen med ett rent papper.
- Sätt alltid tillbaka locket på flaskan direkt efter användning.
- Om du behöver använda andra ögonläkemedel måste du vänta minst 15 minuter mellan användning av varje läkemedel.

Tala med läkare eller apotekspersonal om dina symtom förvärras eller inte förbättras efter 2 dagar.

Om du har använt för stor mängd av Amidazed
Det finns inga kända risker med att använda mer än två droppar i ögat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.
Om du råkat svälja läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Amidazed
Om du har glömt att ta en dos, ta dropparna så fort du kommer ihåg. Om det nästan är dags att ta nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal**.**

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Amidazed och kontakta läkare snarast möjligt om:
- Du får någon form av hudproblem, såsom utslag eller klåda runt ögonen eller att ögonen blir mer röda.
- Du får ögonsmärta eller -irritation, såsom svidande eller brännande känsla.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Amidazed ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Öppnad flaska kan användas i upp till 28 dagar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förvaras vid högst 25 °C.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är propamidinisetionat. 1 ml lösning innehåller 1 mg propamidinisetionat.
- Övriga innehållsämnen är ammoniumklorid, natriumklorid, bensalkoniumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Detta läkemedel är en klar och färglös lösning förpackad i en vit plastflaska med en genomskinlig droppspets och ett vitt lock. Varje flaska innehåller 10 ml lösning och varje förpackning innehåller 1 flaska.

Innehavare av godkännande för försäljning
HORUS PHARMA
22, allée Camille Muffat,
Inedi 5,
06200 Nice
Frankrike

Tillverkare
Laboratorio Edol Productos Farmaceuticos S.A
Rua Quinta do Salrego nº22-22a, Portela De Carnaxide,
2790-144 Carnaxide
Portugal
och
Rua Casal do Canas nº6-6A,
2790-204 Carnaxide
Portugal

Lokal företrädare
Horus Pharma Nordic AB
Stockholm, Sverige
contact-nordics@horus-pharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-09-17

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se