

Bipacksedel: Information till användaren

Bensydamin Geiser 1,5 mg/ml munhålespray, lösning

bensydaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bensydamin Geiser är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bensydamin Geiser
3. Hur du använder Bensydamin Geiser
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bensydamin Geiser ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bensydamin Geiser är och vad det används för

Bensydamin Geiser innehåller den aktiva substansen bensydaminhydroklorid och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Det verkar genom att lindra smärta och svullnad (inflammation).

Bensydamin Geiser används för lokal behandling för lindring av symtom vid smärta och irritation i munhåla och svalg hos vuxna och barn över 6 år som kan samarbeta (t.ex. hålla andan under sprayning av läkemedlet).

Benzydamin som finns i Bensydamin Geiser kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bensydamin Geiser

Använd inte Bensydamin Geiser

- om du är allergisk mot bensydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bensydamin Geiser

- om du är allergisk mot salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra och salicylsyra) eller andra läkemedel mot feber, smärta och inflammation (så kallade NSAID)
- om du har eller har haft astma eller allergiska sjukdomar, eftersom du har ökad risk att utveckla bronkospasm och allergi.

Om du får en allergisk reaktion ska du sluta använda läkemedlet och kontakta läkare eller akutvården.

Sår i mun och svalg kan vara symtom på allvarigare sjukdomar. Om dina symtom inte förbättras, om du känner dig sämre efter 3 dagar eller om du får feber eller andra symtom ska du kontakta läkare.

Långvarig användning av läkemedlet kan vara skadlig för bakteriefloran i munnen och kan leda till utveckling av överkänslighet. I så fall måste du avbryta användningen tillfälligt och kontakta läkare.

Behandlingen ska inte pågå mer än 7 dagar.

Undvik att få läkemedlet i ögonen.

Barn

Bensydamin Geiser rekommenderas inte till barn som inte kan hålla andan under sprayningen.

Andra läkemedel och Bensydamin Geiser

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

Du ska inte använda Bensydamin Geiser under graviditet om det inte är absolut nödvändigt och om det inte rekommenderas av din läkare. Om du behöver behandling ska du använda den lägsta dosen under kortast möjliga tid.

Bensydamin Geiser ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Bensydamin Geiser har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Bensydamin Geiser innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg/ml per 0,5 ml läkemedel.

Bensydamin Geiser innehåller metylparahydroxibensoat och makrogolglycerolhydroxistearat (ricinolja)

Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.

Makrogolglycerolhydroxistearat (ricinolja) kan ge magbesvär och diarré.

3. Hur du använder Bensydamin Geiser

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel, eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bensydamin Geiser är avsett att användas i svalget eller munhålan. Ta inte mer än rekommenderad dos. Behandlingen ska inte pågå mer än 7 dagar.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar över 12 år

Spraya 4 till 8 puffar varje gång, 2 till 6 gånger dagligen (inte oftare än med 1,5 till 3 timmars mellanrum).

Barn mellan 6 och 12 år

Spraya 4 puffar varje gång, 2 till 6 gånger dagligen (inte oftare än med 1,5 till 3 timmars mellanrum).

Används inte till barn som inte kan hålla andan under sprayningen.


Barn under 6 år

Detta läkemedel ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Äldre


Om inte tandläkaren eller läkaren ordinerar andra doser gäller de doser som rekommenderas för vuxna.

Bruksanvisning:



1. Fäll upp spraypipen.

2. För in spraypipen i munnen och rikta sprayen mot det område som ska behandlas. Tryck på sprayhuvudet med pekfingret.



Innan du använder Bensydamin Geiser första gången måste du trycka på knappen på sprayhuvudet flera gånger så att sprayningen blir jämn. Medan du sprayar ska du hålla andan.

Detta läkemedel ska inte användas omedelbart före mat eller dryck.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

Om du har använt för stor mängd Bensydamin Geiser

Om du eller ett barn använder för mycket eller av misstag sväljer större mängder Bensydamin Geiser, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bensydamin Geiser

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Fotosensitivitet (huden blir känsligare än vanligt för solljus, vilket orsakar kliande, röda, fjällande utslag, ibland med blåsbildning)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Klåda och muntorrhet

Domning i mun och svalg (denna effekt är en del av läkemedlets verkningsmekanism och försvinner snabbt)

Illamående

Kräkningar

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Svårt att andas eller svälja (laryngospasm eller bronkospasm)

Smärtsam subkutan svullnad i slemhinnan (angioödem)

- *Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):* Allergiska reaktioner (överkänslighet)
- **Sök omedelbart vård om du får någon av biverkningarna som listas nedan**
Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Tecken på en sådan reaktion kan bland annat vara svårt att andas, smärta eller trångghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimning, svår klåda eller upphöjda bulor på huden, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller svalget. Denna reaktion kan vara livshotande.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Bensydamin Geiser ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat..

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. Efter att förpackningen öppnats kan läkemedlet användas i upp till 6 månader om det förvaras under 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration:

Den aktiva substansen är bensydaminhydroklorid.

1 ml munhålespray, lösning innehåller 1,5 mg bensydaminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Glycerol 85 %

Etanol 96 %

Makrogolglycerolhydroxistearat

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Sackarinnatrium (E 954)

Natriumvätekarbonat (E 500) för pH-justering

Körsbärsarom

Renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bensydamin Geiser 1,5 mg/ml munhålespray, lösning är förpackat i HPDE-flaskor med en doseringspump av HDPE och LDPE. Det är en klar och färglös vätska med körsbärssmak.

Förpackningsstorlekar: 88 puffar (15 ml), 176 puffar (30 ml), 352 puffar (60 ml).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Geiser Pharma S.L.
Polígono Mutilva
Calle E, 5 Bajo
31192 Multiva, Aranguren
Navarra
Spanien

Tillverkare

Laboratorium Sanitatis S.L.,
Parque Tecnológico de Álava c/
Leonardo Da Vinci, 01510 Miñano
(Álava)
Spanien

Terapia SA
Strada Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca
Rumänien

Laboratorios Bohm SA.
Calle de Molinaseca, 23, 28947 Fuenlabrada, Madrid
Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-09-25