

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Betnovat med chinofom, kräm

betametason och kliokinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Betnovat med chinofom är och vad det används för
2. Innan du använder Betnovat med chinofom
3. Hur du använder Betnovat med chinofom
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Betnovat med chinofom ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Betnovat med chinofom är och vad det används för

Betnovat med chinofom är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt, kombinerat med chinofom som har effekt mot bakterie- och svampinfektioner. Betnovat med chinofom används när hudförändringarna är infekterade. Krämen lämpar sig för vätskande hudförändringar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovat med chinofom

Använd inte Betnovat med chinofom

- om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något av övriga innehållsämnen i Betnovat med chinofom (anges i avsnitt 6)
- till barn under 1 år
- för att behandla något av följande hudproblem:
 - virusinfektioner, som t.ex. munsår, herpes eller vattkoppor
 - svampinfektioner, som t.ex. ringorm, fotsvamp eller torsk
 - acne
 - vid ansiktssjukdomen rosacea (ett tillstånd då näsan, kinderna, hakan, pannan eller hela ansiktet är ovanligt rött med eller utan små synliga blodkärl, knottor eller varblåsor)
 - vid utslag kring munnen (perioral dermatit)
 - på kliande hud som inte är inflammerad
 - vid klåda kring genitalerna (penis och vagina)
 - på öppna sår.

Varningar och försiktighet

- Betnovat med chinofom ska inte spädas.
- Använd endast under så lång tid som din läkare har rekommenderat. Om ditt tillstånd inte förbättras efter 2-4 veckor, tala med din läkare.
- Används inte till barn utan läkares ordination. Barn behandlas endast i speciella fall.
- Använd endast täckförband om din läkare har sagt att du ska. Om du applicerar Betnovat med chinofom under täckförband, inklusive blöja, se till att huden är ordentligt rengjord innan ett

nytt täckförband sätts på. Detta för att undvika infektion. Täckförband bör undvikas vid infekterade hudförändringar.

- Var försiktig när du applicerar Betnovat med chinofarm i ansiktet under en längre period då hudförtunning kan uppkomma. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och ögonregionen bör endast behandlas kortvarigt.
- Var försiktig när du applicerar Betnovat med chinofarm på ögonlocken. Undvik att få Betnovat med chinofarm i ögonen.
- Om du har dermatit (inflammation i huden) kring ett bensår kan lokala kortikosteroider öka risken för en allergisk reaktion eller infektion kring bensåret.
- Om du har psoriasis kommer din läkare att vilja träffa dig oftare då risk för toleransutveckling och återfall föreligger.
- Det finns en liten teoretisk risk för nervpåverkan (subakut myelo-optisk neuropati, SMON) vid långtidsbehandling speciellt under täckförband.
- Betnovat med chinofarm kan färga hud, hår och kläder.
- Användning av Betnovat kan medföra att betametason påverkar hela kroppen. Symptom som viktuppgång med ändrad fettfördelning (buk, nacke, ansikte), tunn och skör hud, ökad kroppsbehåring, minskad bentäthet, högt blodtryck kan då uppstå (Cushings syndrom). Hos barn och unga kan tillväxthämning ses. Om något av detta observeras, kontakta behandlande läkare för gradvis avslutande av behandlingen genom att minska på frekvensen av appliceringen eller genom att byta ut mot en mindre potent kortikosteroid. Abrupt avslutande av behandlingen kan resultera i glukokortikoidbrist (se biverkningar).
- Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.
- Tala med din läkare om du tidigare fått en överkänslighetsreaktion mot något kortisonpreparat eller mot jod.
- Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar.

Lokala överkänslighetsreaktioner såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas. →Kontakta din läkare om en infektion utvecklas (se avsnitt 4 Biverkningar).

Andra läkemedel och Betnovat med chinofarm En del läkemedel kan påverka hur Betnovat med chinofarm fungerar eller öka risken för biverkningar. Exempel på sådana läkemedel inkluderar:

- Ritonavir (läkemedel vid HIV-infektioner) och itraconazol (läkemedel mot svampinfektioner)
- Vigabatrin (läkemedel vid epilepsi)

→Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av dessa. Det finns andra läkemedel som kan ha liknade effekt. Det är därför viktigt att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har eller nyligen har tagit andra läkemedel, eller om du ska börja att ta nya, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, eller tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, använd inte Betnovat med chinofarm utan att rådgöra med läkare *före* användning av Betnovat med chinofarm .

Rådgör med läkare vid bruk av Betnovat med chinofarm under amning.

- Om du använder Betnovat med chinofarm under amning använd inte Betnovat med chinofarm på området på bröstet för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig Betnovat med chinofarm i munnen.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovat med chinofarm.

3. Hur du använder Betnovat med chinfoform

Använd alltid Betnovat med chinfoform enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd en eller två gånger per dag. Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du ska använda läkemedlet. Antalet gånger du använder läkemedlet kan komma att reduceras vartefter din hud blir bättre. Din läkare kan förskriva en svagare steroid för dig att använda istället.

Påstrykes tunt och försiktigt, använd endast tillräcklig mängd för att täcka det område som ska behandlas. Tillåt tillräckligt med tid för absorption innan mjukgörande kräm appliceras.

Tvätta dina händer efteråt såvida det inte är händerna som ska behandlas. Detta läkemedel ska inte användas varje dag i mer än 4 veckor i taget.

Barn, äldre och patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion ska använda minsta möjliga mängd under kortast möjliga tid.

Om du har glömt att använda Betnovat med chinfoform

- Stryk på det så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som vanligt.
- Stryk inte på extra Betnovat med chinfoform för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Betnovat med chinfoform

- Om du använder Betnovat med chinfoform regelbundet, tala med din läkare innan du slutar att använda det. Dosen bör minskas gradvis.

Om du använt för stor mängd av Betnovat med chinfoform

Överdoserering är osannolik, men i fall av långvarig överdoserering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för riskbedömning och rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.

Om allergiska reaktioner vid appliceringsstället (som kan orsakas av betametason eller konserveringsmedlet, klorkresol, i krämen) uppstår. Avbryt behandlingen och tag kontakt med läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- klåda
- lokalt brännande känsla/smärta i huden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- hudförtunning som kan orsaka hudbristningar
- utslag i ansiktet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- pigmentförändringar
- ökad kroppsbehåring.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- hämning av binjurebarkfunktionen
- viktökning/fetma
- månansikte/rundare ansikte
- hudrynkor
- torr hud
- synliga blodkärl under huden
- håravfall, avsaknad av hårtillväxt, skadat hår
- förvärrade symtom
- irritation/smärta vid appliceringsstället
- hudrodnad
- utslag eller nässelutslag
- om du har psoriasis kan du få varblåsor under huden. Detta förekommer väldigt sällsynt under eller efter behandlingen och kallas för pustulös psoriasis
- infektion som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt (opportunistiskt infektion)
- missfärgning av hår, hud och kläder
- fördröjd viktuppgång
- långsam tillväxt hos barn
- minskning av hormonet kortisol i blodet
- ökade nivåer av socker i blod eller urin
- ökat blodtryck
- grumlig lins i ögat (grå starr) eller ökat tryck i ögat (grön starr)
- försvagat skelett (osteoporos)
- allergiska reaktioner i form av ökad hudirritation.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Betnovat med chinofarm ska förvaras

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 25 °C.
- Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Betnovat med chinofarm är betametason och kliokinol.

1 g kräm innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat) och 30 mg kliokinol. Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogol cetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, natriumdivätefosfat, fosforsyra, natriumhydroxid, vatten, klorkresol (konserveringsmedel).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Betnovat med chinoform kräm är blekt gul och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-09-14