

Bipacksedel

BLOCADREN[®] DEPOT 2,5 mg/ml och 5 mg/ml **Depotögondroppar utan konserveringsmedel (engångspipetter)**

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination på apoteketiketten.

Vad innehåller BLOCADREN DEPOT?

Verksamt innehållsämne: Timolol maleat motsvarande timolol 2,5 mg/ml eller 5 mg/ml.

Övriga innehållsämnen: Heteropolysackarid framställd av gellangummi, mannitol, trometamol och vatten till injektionsvätskor.

Hur verkar BLOCADREN DEPOT?

BLOCADREN DEPOT är en s k beta-blockerare, som sänker trycket i ögat huvudsakligen genom att minska inflödet av kammarvatten dvs vätskan i främre ögonkammaren.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Innehavare av försäljningstillstånd:

Merck Sharp & Dohme B.V.

P.O. Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Information:

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 7125

192 07 Sollentuna

Tfn: 08-626 14 00

Vad används BLOCADREN DEPOT för?

BLOCADREN DEPOT används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid grön starr (glaukom).

När skall BLOCADREN DEPOT inte användas?

Om du har eller har haft astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak, mycket låg puls, obehandlad hjärtsvikt, viss störning i hjärtats retledningssystem eller vid överkänslighet mot något innehållsämne. Om du är tveksam kontakta din läkare.

Att tänka på innan och under tiden du använder BLOCADREN DEPOT

Berätta för din läkare om eventuella medicinska problem som du har eller har haft tidigare, speciellt svårbehandlad diabetes, allvarlig njursjukdom (gäller bl a dialyspatienter), claudicatio intermittens (sk fönstertittarsjuka) samt allergier. Om du misstänker att BLOCADREN DEPOT orsakar en allergisk reaktion (t ex hudutslag, röda ögon eller klåda i ögonen) avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast möjligt.

Kontakta din läkare om du får en ögoninfektion, får en ögonskada, genomgått ögonkirurgi eller får en reaktion såsom nya eller förvärrade symtom.

BLOCADREN DEPOT bör inte ges till barn (erfarenhet saknas).

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare *före* användning av BLOCADREN DEPOT under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför *inte* BLOCADREN DEPOT under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning

Eftersom BLOCADREN DEPOT kan ge dimsyn i 1/2 - 5 minuter efter indroppning i ögat bör du se till att du ser tydligt innan du t ex kör bil eller utför arbeten som kräver god syn.

Vad skall du undvika när du använder BLOCADREN DEPOT?

Effekten av behandlingen kan påverkas om BLOCADREN DEPOT tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda andra mediciner inklusive andra ögondroppar (gäller även receptfria medel). Speciellt viktigt är det för doktorn att känna till om du redan behandlas med blodtryckssänkande medicin, hjärtmedicin, vissa medel mot smärta/inflammation, slemhinneavsvällande medel (vid nästäppa) samt medel vid diabetes.

Hur skall du använda BLOCADREN DEPOT? (Dosering)

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dosering: 1 droppe lösning i det angripna ögat (ögonen) en gång dagligen.


Om BLOCADREN DEPOT används tillsammans med andra ögondroppar bör medicinerna ges med minst 10 minuters mellanrum (BLOCADREN DEPOT droppas sist).

Ändra inte doseringen utan att rådgöra med läkare. Om du måste avbryta behandlingen kontakta läkare omgående.

Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan regelbundet doseringsschemat.

Bruksanvisning

1. Öppna foliekuvertet som innehåller 15 engångspipetter.
2. Drag loss en pipett från pipettkartan och öppna pipetten genom att vrida av vingen, se figur.
3. "Knäpp" ner lösningen i spetsen på pipetten och droppa en droppe i ögat/ögonen. En pipett räcker till båda ögonen. Kasta pipetten, även om det finns lösning kvar.
4. Stäng noggrant kuvertet med de återstående pipetterna.



Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112) för rådgivning.

Vilka biverkningar kan BLOCADREN DEPOT ge?

Alla mediciner kan ge oönskade effekter s k biverkningar.

Vanligast: Dimsyn, som kan kvarstå 1/2-5 minuter efter indroppningen är vanligast och förekommer hos cirka 6 av 100 patienter. Brännande och stickande känsla i ögat, klubbiga ögonfransar, känsla av "skräp i ögat" och klåda har också observerats.

Mindre vanliga/sällsynta: Röda ögon, ökat tårflöde, värk i ögonen.

När lösning droppas i ögat kan en liten mängd verksamt ämne tas upp i blodet. Effekter, som inte bara rör ögat, kan därför inte uteslutas t ex yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, nedstämdhet, svimningskänsla (t ex då man hastigt reser sig upp), alltför låg puls, bröstsmärtor, hjärklappning, oregelbundna hjärtslag, försämrade genomblödning i hjärnan, överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, håravfall, försämring av myasthenia gravis (ökad muskelsvaghet), sammandragande effekt på luftrören med bl a andnöd (framför allt hos dem som tidigare haft sådana besvär).

I vissa fall kan dubbelseende och inflammation i ögon/ögonlock uppträda. Om besvärande eller ovanliga reaktioner inträffar kontakta läkare.

Hur skall BLOCADREN DEPOT förvaras?

Ljuskänsligt. Förvaras mörkt. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Öppnat kuvert är hållbart 1 månad.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Denna bipacksedel uppdaterades senast: 1999-12-17

Vill du veta mer kontakta din läkare eller närmaste apotek.