

Bipacksedel: Information till användaren

Cardizem Unotard 180 mg depottabletter
Cardizem Unotard 240 mg depottabletter
Cardizem Unotard 300 mg depottabletter

diltiazemhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cardizem Unotard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem Unotard
3. Hur du använder Cardizem Unotard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cardizem Unotard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cardizem Unotard är och vad det används för

Cardizem Unotard är en så kallad kalciumantagonist som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln. Risken för kärlkramp minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket sjunker. Cardizem Unotard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett med små hål. Tablett skalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut under vägen genom mag-tarmkanalen. Behandling av högt blodtryck (hypertoni) och kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris).

2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem Unotard

Använd inte Cardizem Unotard

- Om du är allergisk mot diltiazemhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du lider av allvarliga hjärtproblem (t.ex. vissa typer av hjärtblock, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen).
- Om du lider av digitalisförgiftning.
- Om du redan tar ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.
- Om du redan tar ett läkemedel innehållande lomitapid som används för behandling av höga kolesterolnivåer (se avsnitt: "Andra läkemedel och Cardizem Unotard").

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cardizem Unotard om du har haft hjärtsvikt tidigare, har nytillkomna andningsbesvär, har långsamma hjärtslag eller har lågt blodtryck. Eftersom fall av njurskada hos patienter med sådana tillstånd har rapporterats kan din läkare behöva övervaka din njurfunktion.

Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandlingen med Cardizem Unotard påbörjas:

- lågt blodtryck
- förträngning av stora kroppspulsådern
- någon hjärtsjukdom som påverkar hjärtats rytm
- nedsatt njur- eller leverfunktion
- risk att utveckla stopp i tarmen (tarmobstruktion).

Kalciumantagonister såsom diltiazem kan ge humörsvängningar, inklusive depression.

Sluta att ta Cardizem Unotard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Andra läkemedel och Cardizem Unotard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte detta läkemedel och tala om för läkaren särskilt om du tar läkemedel innehållande lomitapid som används för behandling av höga kolesterolnivåer. Diltiazem kan öka koncentrationen av lomitapid, vilket kan leda till en ökad sannolikhet för och ökad allvarlighetsgrad av leverrelaterade biverkningar.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cardizem Unotard, t.ex. vissa läkemedel:

- mot högt blodtryck (nifedipin, betablockerare, alfablockerare och kalciumantagonister)
- mot högt blodtryck och kärlkramp (amlodipin)
- mot kärlkramp (nitratderivat)
- mot rubbningar av hjärtrytmen (t.ex. amiodaron)
- blodfettsänkande läkemedel (simvastatin)
- mot epilepsi (karbamazepin)
- med lugnande och sömngivande effekt (midazolam, triazolam)
- mot ångest och depression (buspiron, imipramin)
- mot smärta vid operationer (alfentanil)
- vid transplantation (ciklosporin)
- mot manisk-depressiv sjukdom (litium)
- läkemedel som hämmar bildningen av saltsyra och som används mot bl.a. sår i magsäck (ranitidin, cimetidin)
- mot tuberkulos (rifampicin)
- mot inflammatoriska sjukdomar såsom reumatism, ulcerös kolit och astma (metylprednisolon)
- läkemedel som undertrycker immunsystemet (sirolimus, temsirolimus och everolimus).

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Om du behöver narkos vid en operation ska narkosläkaren informeras om att du tar Cardizem Unotard.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare *före* användning av Cardizem Unotard under graviditet.

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cardizem Unotard under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Cardizem Unotard kan biverkningar som yrsel och sjukdomskänsla förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cardizem Unotard innehåller sackaros och natrium

Sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per depottablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Cardizem Unotard

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Cardizem Unotard depottabletter ska tas en gång per dygn och *sväljas hela med minst ½ glas vätska 15 minuter före måltid vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Tabletterna får ej delas eller tuggas.*

Om du använt för stor mängd av Cardizem Unotard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Cardizem Unotard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Cardizem Unotard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem), förekommer utan känd frekvens.
- en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom), förekommer utan känd frekvens.
- allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (toxisk epidermal nekrolys), förekommer utan känd frekvens.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- svullnad i benen

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk, yrsel
- atrioventrikulärt block (ett slags arytmi), hjärtklappning, låg hjärtfrekvens (bradykardi)
- hudrodnad
- förstopning, matsmältningsbesvär (dyspepsi), magsmärta, illamående
- hudutslag
- svullnad i leder
- energilöshet (asteni), trötthet, sjukdomskänsla

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- nervositet, svårt att somna (insomni)
- blodtrycksfall när man sätter sig upp snabbt, med eller utan yrsel (hypotension)
- kräkningar, diarré
- förhöjda nivåer av leverenzymmer i blodet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- muntorrhet
- hudirritation och klåda (urtikaria)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- minskat antal trombocyter (trombocytopeni)
- minskad aptit, förhöjt blodsocker (hyperglykemi)
- humörförändringar inklusive depression, förvirring, hallucinationer, förändringar av personlighet och sönmönster
- rörelsestörningar (extrapyramidalt syndrom), minnesförlust (amnesi), onormal krypande känsla, dåsigheit eller brännande känsla (parestesi), sömnighet (somnia), tillfällig medvetandeförlust (svimning), skakningar, plötsliga och ofrivilliga ryckningar i en muskel eller muskelgrupp
- synstörningar (delvis synförlust i ett eller båda ögon), ögonirritation
- ringande i öronen (tinnitus)
- avbrott eller förändring av den elektriska signalen i hjärtat (sinoatriellt block, sinusarrest), svårigheter för hjärtat att pumpa blodet (kongestiv hjärtsvikt), snabb hjärtrytm (takykardi), avvikande hjärtsammandragningar (ventrikulär extrasystole), oregelbunden hjärtrytm (arytmi), smärta eller tryckande känsla i bröstet (kärlkramp)
- inflammation i blodkärl (vaskulit)
- andningssvårigheter (dyspné), näsblödning (epistaxis), nästäppa
- tandköttinflammation (tandköttshyperplasi)
- hepatit (inflammationssjukdom som påverkar levern), förändringar i levern (granulomatös leversjukdom)
- ljuskänslighet (fotosensitivitet), erythema multiforme (en allvarlig hudsjukdom förknippad med röda prickar och blåsor), svettningar, exfoliativ dermatit (hudrodnad, klåda, hårförlust) och akut generaliserad exantematös pustulös dermatit (plötsligt hudutslag åtföljt av feber och bildande av pustler eller lesioner på hudens yta som kännetecknas av att de är små, inflammerade, varfyllda och liknar blåsor), små röda prickar på huden (petekier), klåda (pruritus)
- ledsmärta, muskelsmärta
- urinträngningar på natten (nokturi), ökat antal urinträngningar (polyuri)
- förstoring av bröstet hos män (gynecomasti), onormal sexuell funktion
- svårigheter att gå
- förhöjda nivåer av enzymet kreatinfosfokinas (CPK) i blodprover, viktökning
- ett tillstånd där kroppens försvarssystem angriper normal vävnad, vilket orsakar symptom såsom inflammerade leder, energilöshet och hudutslag (så kallat "lupusliknande syndrom").

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Cardizem Unotard ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 180 mg, 240 mg respektive 300 mg per tablett.
Övriga innehållsämnen är: Natriumdivätecitrat, sackaros (33 mg, 38 mg resp 38 mg per tablett), povidon, magnesiumstearat, makrogol, acetyltributylcitrat, polymeriserad ricinolja, natriumvätekarbonat, etylvanillin, titandioxid (färgämne E171), polymerbeläggning.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

180 mg respektive 240 mg depottabletter är vita, kupade och ovala.

300 mg depottabletter är vita, kupade och runda.

Förpackningsstorlekar:

Cardizem Unotard 180 mg depottabletter

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 100 tabletter.

Cardizem Unotard 240 mg depottabletter

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 100 tabletter.

Cardizem Unotard 300 mg depottabletter

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 100 tabletter.

Burken med det barnskyddande locket öppnas genom att locket hålls nedtryckt och skruvas moturs.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB
113 63 Stockholm
Tel: 08-550 520 00

E-mail: medical.information@pfizer.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-12-17