

Bipacksedel: Information till patienten

Cefadroxil Viatris 500 mg hårda kapslar

cefadroxil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cefadroxil Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Viatris
3. Hur du använder Cefadroxil Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cefadroxil Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cefadroxil Viatris är och vad det används för

Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

Cefadroxil Viatris används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

Cefadroxil som finns i Cefadroxil Viatris kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Viatris

Använd inte Cefadroxil Viatris

- om du är allergisk, eller tror att du kan vara allergisk, mot cefadroxil, något annat cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cefadroxil Viatris:

- om du är allergisk mot penicilliner.
- om du använder kemiska tester för att kontrollera glukos i urinen. Cefadroxil kan orsaka en falsk positiv reaktion. Detta sker inte om du använder enzymtest med sticka.
- om du ska göra ett test som kallas Coombs test, som undersöker röda blodkroppar i blodet.

Andra läkemedel och Cefadroxil Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av nedanstående läkemedel, eller om du tar något annat läkemedel, inklusive receptfria sådana:

- antibiotika såsom tetracyklin, erytromycin, sulfonamider (t.ex. sulfametoxazol/trimetoprim), kloramfenikol, polymyxin B, vancomycin, colistin, aminoglykosider t.ex. gentamicin.
- probenecid (mot gikt)
- höga doser av diuretika (urindrivande läkemedel) såsom furosemid.

- blodförtunnande läkemedel

Intag av Cefadroxil Viatris med mat och dryck

Cefadroxil Viatris ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren forskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.

Körförmåga och användning av maskiner

Cefadroxil bör inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cefadroxil Viatris kapslar innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Cefadroxil Viatris

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg:

Rekommenderad dos för vuxna och barn som väger mer än 40 kg, är 500 mg till 1 g två gånger dagligen.

Kapslar ska inte ges till barn under 6 års ålder.

Patienter med njurproblem ska ta 500 mg var 12:e till 36:e timme beroende på njurproblemets svårighetsgrad. Följ din läkares rekommendation noga.

Hur du ska ta kapslar:

- Ta detta läkemedel under eller efter måltid.
- Kapslarna bör sväljas med riklig mängd vätska.
- Svälj kapslarna hela.

Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Viatris

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kom ihåg att ta med dig förpackningen och det som finns kvar av läkemedlet. Symtom på överdosering innefattar allergisk reaktion som orsakar svårighet att andas eller som orsakar yrsel, blodtrycksfall och ökad eller minskad puls, illamående, kräkning, hudutslag, diarré, kramper, sänkt medvetandegrad, muskelsammandragningar eller koma.

Om du har glömt att ta Cefadroxil Viatris

Ta dosen så snart du kommer ihåg det, om det inte nästan är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Cefadroxil Viatris

Sluta inte att ta Cefadroxil Viatris utan att ha talat med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fullföljer hela cefadroxilbehandlingen som förskrivits av din läkare. Du kommer att behöva ta Cefadroxil Viatris 2 till 3 dagar efter att symtomen förvunnit eller under minst 10 dagar för vissa typer av infektioner.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du råkar ut för något av nedanstående, **sluta ta** Cefadroxil Viatris och kontakta **omedelbart** läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning, **Du kan behöva behandling.**

- cefadroxil kan orsaka en minskning i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Om du får en infektion med symtom såsom feber och allvarligt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom halsont, smärta i svalget eller munnen eller problem med att urinera bör du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar minskat (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om din medicinering.
- om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaxi), såsom svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, svårigheter att svälja, nässelutslag och/eller svårigheter att andas, tryck över bröstet.
- om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem.

Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

- allvarlig diarré (kolit), som kan innehålla blod
- allvarliga hudreaktioner, med blåsor på huden, munnen, ögonen och könsorganet
- om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.

Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.

Övriga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 10 användare):

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - illamående | - svår klåda |
| - kräkning | - hudutslag |
| - diarré | - allergiska hudreaktioner |
| - matsmältningsbesvär | - nässelutslag |
| - magsmärta | - öm, svullen tunga |

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- vaginal svampinfektion eller svampinfektion i munnen (torsk)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- oförklarliga blåmärken eller blödningar, som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera
- en ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov
- feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)
- ledvärk
- ändringar i leverenzym (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- trötthet
- huvudvärk
- yrsel
- nervositet
- sömnlöshet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- ett rött, upphöjt, mässlingsliknande utslag

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

5. Hur Cefadroxil Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Kapslar: Förvara burkar och blister i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är cefadroxil (som monohydrat). Varje kapsel innehåller 500 mg cefadroxil.
- Övriga innehållsämnen är:
- Natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (E171) och gelatin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cefadroxil Viatris 500 mg kapslar är hårda gelatinkapslar som är vita och ogenomskinliga.

Cefadroxil Viatris 500 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i tryckförpackning och i plastburk på 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 30 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatri Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15, DUBLIN
Irland

Lokal företrädare

Viatri AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige

Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,
Dublin 13, Irland
Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, Kundl, 6250, Österrike.

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-02