

Bipacksedel: Information till patienten

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb 20 mg/40 mg tabletter cinnarizin/dimenhydrinat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb
3. Hur du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb är och vad det används för

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb innehåller två aktiva innehållsämnen. Det ena är cinnarizin och det andra är dimenhydrinat. De två substanserna tillhör olika grupper av läkemedel. Cinnarizin ingår i en grupp som kallas kalciumantagonister. Dimenhydrinat tillhör en grupp som kallas antihistaminer.

Båda substanserna verkar genom att minska symtomen på vertigo (en känsla av yrsel eller av att det "snurrar") och illamående. När dessa två substanser används tillsammans är de effektivare än när de används var för sig.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb används till vuxna för att behandla olika typer av vertigo. Vertigo kan ha många olika orsaker.

Cinnarizin och dimenhydrinat som finns i Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Ta inte Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb:

- om du är allergisk mot cinnarizin, dimenhydrinat eller difenhydramin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot andra antihistaminer (såsom astemizol, klorfeniramin och terfenadin, vilka används som allergiläkemedel). Du ska inte ta detta läkemedel, om din läkare inte har sagt till dig att göra det.
- om du lider av trångvinkelglaukom (en speciell typ av ögonsjukdom).
- om du har epilepsi.
- om du har förhöjt tryck i hjärnan (t.ex. på grund av en tumör).
- om du lider av alkoholmissbruk.

- om du har prostataproblem som gör det svårt att urinera.
- om du har lever- eller njursvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb om du lider av:

- lågt eller högt blodtryck
- förhöjt tryck i ögat
- tilltäppning i tarmarna
- förstora prostata
- överaktiv sköldkörtel
- allvarlig hjärtsjukdom
- Parkinsons sjukdom.

Användningen av Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan förvärra dessa tillstånd.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kanske ändå är bra för dig, men din läkare kan behöva ta hänsyn till dessa fakta.

Andra läkemedel och Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan interagera med andra läkemedel som du tar.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan göra dig trött eller sömnig om det tas tillsammans med de läkemedel som anges nedan:

- barbiturater (läkemedel som ofta tas för att man ska bli lugn)
- narkotiska analgetika (starka smärtstillande medel såsom morfin)
- lugnande medel (en typ av läkemedel som används för att behandla depression och ångest)
- monoaminoxidashämmare (används för att behandla depression och ångest).

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan öka effekterna av följande läkemedel:

- tricykliska antidepressiva medel (används för att behandla depression och ångest)
- atropin (ett läkemedel som är muskelavslappnande och ofta används för att undersöka ögonen)
- efedrin (kan användas för att behandla hosta eller täppt näsa)
- läkemedel som tas för att sänka blodtrycket

Prokarbazin (ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av cancer) kan öka effekten av cinnarizin / dimenhydrinat.

Aminoglykosider (en typ av antibiotika) kan skada innerörat. Om du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kanske du inte märker att denna skada uppstår.

Du ska inte ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb tillsammans med läkemedel som används för att korrigera problem med hjärtslagen (antiarytmiska medel). Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan även förändra det sätt på vilket din hud reagerar på allergitest.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb med mat, dryck och alkohol

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan orsaka magbesvär, vilka kan minskas genom att ta tabletterna efter måltid. Drick inte alkohol medan du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb, eftersom det kan göra dig trött eller sömnig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb ska inte användas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan göra dig sömning. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett tre gånger dagligen. Svälj tablett tillsammans med lite vätska efter måltid.

Vanligtvis tar man Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb i upp till 4 veckor. Din läkare kommer att tala om för dig om du behöver ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb längre tid än så.

Användning för barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn eller ungdomar under 18 år eftersom effekten av läkemedlet hos barn och ungdomar inte är känd.

Om du har tagit för stor mängd av Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar för mycket Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan du bli mycket trött, yr och darrig. Dina pupiller kan utvidgas och du kanske inte kan urinera. Din mun kan kännas torr, ditt ansikte kan rodna, du kan få snabbare hjärtfrekvens, feber, svettningar och huvudvärk.

Om du har tagit en stor mängd Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb kan du få krampanfall, hallucinationer, högt blodtryck, känna dig darrig, bli upphetsad och tycka att det är svårt att andas. Koma kan förekomma.

Om du har glömt att ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Om du har glömt att ta en tablett Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb så hoppa över tablett. Ta nästa Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb-tablett nästa gång då du i vanliga fall skulle ha tagit den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb

Sluta inte att ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb innan din läkare säger till dig att göra det. Du kommer troligen att få symtom på vertigo igen (yrsel och att det "snurrar") om du avslutar behandlingen för tidigt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- dåsighet
- muntorrhet
- huvudvärk
- magsmärtor.

Dessa är vanligen lindriga och försvinner inom några dagar, även om du fortsätter att ta Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- svettning
- hudrodnad
- magbesvär
- illamående
- diarré
- nervositet
- kramper
- glömska
- tinnitus (ringningar i öronen)
- parestesi (stickningar i händer eller fötter)
- tremor (darrning).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- nedsatt syn
- allergiska reaktioner (t.ex. hudreaktioner)
- ljuskänslighet och
- svårighet att urinera.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- antalet vita blodkroppar och blodplättar kan bli lägre och
- antalet röda blodkroppar kan sjunka kraftigt, vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka risken för infektioner.

Om du får infektioner med feber och allvarligt försämrat allmäntillstånd, uppsök läkare och berätta om ditt läkemedel.

Andra möjliga reaktioner (förekommer hos okänt antal användare) som kan inträffa med denna typ av läkemedel omfattar:

- viktökning
- förstoppning
- tryckkänsla över bröstet
- gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna orsakad av problem med levern eller blodet), förvärrat trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom med förhöjt tryck inuti ögat), okontrollerbara rörelser
- ovanlig upphetsning och rastlöshet (särskilt hos barn)
- allvarliga hudreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges blister och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är: 20 mg cinnarizin och 40 mg dimenhydrinat.
- Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende

Vita till benvita, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på 8 mm.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

Medochemie Ltd, Limassol, Cypern

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-12-11