Bipacksedel: Information till användaren

Citalopram Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter
Citalopram Jubilant 20 mg filmdragerade tabletter
Citalopram Jubilant 30 mg filmdragerade tabletter
Citalopram Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter

citalopram

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Citalopram Jubilant är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Citalopram Jubilant
3. Hur du tar Citalopram Jubilant
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citalopram Jubilant ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citalopram Jubilant är och vad det används för

Hur fungerar Citalopram Jubilant?
Citalopram Jubilant tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel påverkar serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna.

Citalopram Jubilant används vid behandlingen av depression och panikångest, såväl som förebyggande mot återfall eller nya fall av depression.

Din läkare kan ha ordinerat Citalopram Jubilant för någon annan sjukdom. Fråga din läkare om du har några frågor om varför Citalopram Jubilant har ordinerats åt dig.Citalopram som finns i Citalopram Jubilant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Citalopram Jubilant

Ta inte Citalopram Jubilant
- om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- samtidigt som du tar medicin som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). MAO-hämmare inkluderar läkemedel som fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin och moklobemid (används för behandling av depression), selegilin (används vid behandling av Parkinsons sjukdom) och linezolid (ett antibiotikum). Även om du har slutat ta en av följande MAO-hämmare: fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid eller tranylcypromin måste du vänta 2 veckor innan du börjar ta dina Citalopram Jubilant-tabletter. En dag måste gå efter att du har tagit moklobemid. Efter att ha avslutat Citalopram Jubilant måste du vänta 1 vecka innan du tar någon MAO-hämmare.
- om du är född med eller har haft en period med onormal hjärtrytm (som syns på EKG, en undersökning för att se hur hjärtat fungerar).
- om du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt "Andra läkemedel och Citalopram Jubilant" nedan).

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Citalopram Jubilant om du:
- har diabetes, eftersom Citalopram Jubilant kan ändra dina blodsockernivåer.
- har epilepsi eller får krampanfall, eftersom det finns en möjlig risk för krampanfall när du tar antidepressiva läkemedel.
- har fått elektrokonvulsiv behandling (ECT).
- tidigare haft mani/hypomani. Citalopram Jubilant bör användas med försiktighet och du bör sluta ta läkemedlet när du går in i en manisk fas.
- har njur- eller leverproblem. Citalopram Jubilant rekommenderas inte till patienter med allvarliga njurproblem.
- har en ökad blödningsbenägenhet eller om du är gravid (se "Graviditet, amning och fertilitet")
- använder läkemedel som påverkar blodets förmåga att levra sig (se "Andra läkemedel och Citalopram Jubilant").
- har låga natriumnivåer i blodet.
- lider av psykoser med depressiva perioder.
- Om du lider eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen har haft en hjärtattack.
- Om du har en låg vilopuls och/eller du vet att du kan ha saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (vätskedrivande medel).
- om du upplever snabba eller oregelbundna hjärtslag, svimning, kollaps eller yrsel när du reser dig upp, vilket kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.
- om du har problem med ögonen, såsom vissa typer av grön starr.

Vänligen kontakta din läkare, även om dessa uttalanden var tillämpliga på dig någon gång i det förflutna.

Vänligen notera:
Vissa patienter med manodepressiv sjukdom kan gå över i en manisk fas. Denna kännetecknas av ovanliga och snabbt skiftande idéer, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet. Om du upplever detta, kontakta din läkare.

Symtom som rastlöshet eller svårigheter att sitta eller stå still kan också uppstå under de första veckorna av behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever dessa symtom.
Läkemedel såsom Citalopram Jubilant (så kallade SSRI/SNRI) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom fortsatt efter avslutad behandling.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv
Om du är deprimerad och/eller har ångest kan du ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa kan öka när du börjar använda antidepressiva läkemedel, eftersom alla dessa läkemedel tar tid att ger effekt. vanligtvis cirka två veckor men ibland längre.

Du kanske är mer benägen att tänka så här:
- om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.
- om du är en **yngre vuxen**. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus Om du någon gång har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad eller har ångest. Be dem läsa denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende har förändrats.

Barn och ungdomar
Citalopram Jubilant ska normalt inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan citalopram skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna av läkemedlet på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Citalopram Jubilant
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Var särskilt noga med att informera din läkare om följande mediciner:
- Icke-selektiva monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som innehåller fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid och tranylcypromin som aktiv substans. Om du har tagit något av dessa läkemedel måste du vänta 14 dagar innan du börjar med Citalopram Jubilant. Efter avslutad behandling med Citalopram Jubilant måste du vänta 7 dagar innan du tar något av dessa läkemedel.
  Dessa ska inte tas samtidigt som Citalopram Jubilant (se **Ta inte Citalopram Jubilant**)

Var särskilt noga med att informera din läkare om följande mediciner:
- Linezolid (ett antibiotikum).
- Litium (används för att förebygga och behandla mani) och tryptofan (ett antidepressivt läkemedel).
- Reversibla, selektiva MAO-A-hämmare innehållande moklobemid (läkemedel mot depression).
- Imipramin och desipramin (läkemedel mot depression).

- Irreversibla MAO-B-hämmare innehållande selegilin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Dessa ökar risken för biverkningar.
- Metoprolol (läkemedel mot högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar). Dosen av Citalopram Jubilant kan behöva justeras.
- Sumatriptan och liknande läkemedel (läkemedel mot migrän) och tramadol och liknande läkemedel (opioider, läkemedel mot svår smärta). Dessa ökar risken för biverkningar.
- Cimetidin, lansoprazol och omeprazol (används för att behandla magsår), flukonazol (används för att behandla svampinfektioner) och fluvoxamin (antidepressivt läkemedel) och tiklopidin (används för att minska risken för blodproppar). Dessa kan orsaka ökade nivåer av citalopram i blodet.
- Läkemedel som ökar risken för blödning, t.ex. antikoagulantia (läkemedel som hämmar blodets förmåga att koagulera), NSAID (läkemedel mot smärta och/eller inflammation) (t.ex. tiklopidin och dipyridamol) och salicylsyraderivat (t.ex. acetylsalicylsyra) kan orsaka hud- och slemhinneblödningar om de ges samtidigt med Citalopram Jubilant.
- Traditionella växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Johannesört kan öka risken för biverkningar.
- Meflokin (läkemedel mot malaria) och bupropion (läkemedel mot depression och rökavvänjning) på grund av eventuell risk för att sänka anfallströskeln.
- Neuroleptika (läkemedel mot schizofreni, psykos) på grund av eventuell risk för att sänka anfallströskeln, och antidepressiva medel.
- Läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Ta inte Citalopram Jubilantom du tar läkemedel för problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, t.ex. antiarytmika av klass IA och III, antipsykotika (läkemedel mot psykoser), t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol, tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor om detta bör du tala med din läkare.

Citalopram Jubilant med mat, dryck och alkohol
Citalopram Jubilant kan tas med eller utan mat (se avsnitt 3).

Som med alla antidepressiva läkemedel är det klokt att undvika att dricka alkohol under behandling, även om citalopram inte har visat sig öka effekterna av alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Plötsligt avbrytande av behandlingen bör undvikas under graviditet.

<u>Graviditet</u>
Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram Jubilant. När läkemedel såsom Citalopram Jubilant används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertoni hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska och/eller läkare omedelbart.

Även, om du tar Citalopram Jubilant under de tre sista månaderna av graviditeten ska du tala om det för läkare, eftersom ditt barn kan uppvisa vissa symtom i anslutning till födseln. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. De inkluderar svårighet att sova eller äta ordentligt, andningsbesvär, blåaktig hud eller svårighet att reglera kroppstemperaturen, illamående, ihållande gråt, spända eller förslappade muskler, ökad sömnighet, darrningar, skakningar eller krampanfall. Om ditt barn har några av dessa symtom vid födseln, ska du tala med läkare som kommer att kunna ge dig råd.
Om du tar Citalopram Jubilant nära slutet av din graviditet kan det finnas en ökad risk för kraftiga vaginalblödningar kort efter födseln, särskilt om du har en historia av blödningsrubbningar. Din läkare eller barnmorska bör vara medveten om att du tar Citalopram Jubilant så att de kan ge dig råd.

Amning
Citalopram Jubilant passerar över till bröstmjölken i små mängder. Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Om du tar Citalopram Jubilant, tala med läkare innan du börjar amma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Fertilitet
I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu inte påvisats hos människa.

Köra och använda maskin
Citalopram Jubilant påverka vanligtvis inte förmågan att utföra normala dagliga aktiviteter. Men om du känner dig yr eller sömnig när du börjar ta detta läkemedel, bör du vara försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför arbeten som kräver att du är uppmärksam tills dessa effekter försvinner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Citalopram Jubilant innehåller laktos och natrium.
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip "natriumfritt".
Citalopram Jubilant innehåller laktos.
Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Citalopram Jubilant

Hur många du ska ta
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Depression
Vanlig dos är 20 mg per dag. Läkaren kan öka dosen till maximalt 40 mg per dag.
Panikattacker
Startdosen är 10 mg per dag under den första veckan innan dosen ökas till 20-30 mg per dag. Läkaren kan öka dosen till maximalt 40 mg per dag.

Äldre patienter (> 65 år)
Startdosen bör sänkas till hälften av den rekommenderade dosen, d.v.s. 10-20 mg per dag. Äldre patienter bör vanligtvis inte behandlas med mer än 20 mg per dag.

Användning för barn och ungdomar
Citalopram Jubilant ska inte användas vid behandlingen av barn och ungdomar under 18 år. (se "**Varningar och försiktighet").**

Patienter med särskilda risker
Patienter med leverbesvär bör inte få mer än 20 mg per dag.

Hur och när du ska ta Citalopram Jubilant
Citalopram Jubilant tas varje dag som en daglig dos. Citalopram Jubilant kan tas när som helst på dygnet med eller utan mat. Svälj tabletterna med vatten

Behandlingens varaktighet
Liksom andra läkemedel av denna typ ger Citalopram Jubilant ingen omedelbar lindring av symtomen, utan i allmänhet först efter några veckor. Ändra inte dosen utan att först prata med din läkare. Fortsätt att ta Citalopram Jubilant så länge som din läkare rekommenderar. Om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen återkomma. Det rekommenderas att du fortsätter behandlingen i minst 6 månader efter att du mår bra igen. Den underliggande sjukdomen kan finnas kvar under en längre tid och om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen återkomma. Patienter med återkommande depression kan behöva behandlas i flera år för att undvika återfall.

Om du tar mer Citalopram Jubilant än vad du borde
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom. Om du går till läkare eller sjukhus, ta med dig Citalopram Jubilant-förpackningen.

Symtom på överdosering kan inkludera:
• Oregelbunden hjärtrytm
• Kramper
• Förändringar i hjärtrytmen
• Att må illa (illamående)
• Kräkningar
• Svettas
• Dåsighet
• Koma
• Snabba hjärtslag

• Darrningar
• Förändringar i blodtrycket
• Serotonergt syndrom (se avsnitt 4)
• Agitation
• Yrsel
• Förstorade ögonpupiller
• Blåaktig hud
• Andas för snabbt

Om du har glömt att ta Citalopram Jubilant
Om du har glömt att ta en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera för den dosen du glömt. Om du glömmer att ta en dos och kommer ihåg innan du går och lägger dig, ta dosen på en gång. Fortsätt som vanligt nästa dag. Om du under natten eller nästa dag inser att du har glömt en dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt.

Om du slutar att ta Citalopram Jubilant
Sluta inte att ta Citalopram Jubilant om inte läkaren har berättat för dig att göra detta. Eftersom utsättningssymtom kan uppstå, bör dosen minskas gradvis i intervaller under 1-2 veckor.

Utsättningssymtom ses vid utsättningSå kallade utsättningssymtom är vanliga när behandling med Citalopram Jubilant avslutas. Risken kan vara ökad om Citalopram Jubilant använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskats för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom övergående inom två veckor.

Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis. Om den inte minskas gradvis är risken större för utsättningssymtom. Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare. Om du får utsättningssymtom betyder inte detta att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Citalopram Jubilant.Utsättningssymtomen omfattar: yrsel, stickningar eller avdomning, känsla av att man får elektriska stötar, känsellöshet, sömnsvårigheter, livliga drömmar, oro/rastlöshet, ångest, sjukdomskänsla eller illamående, skakningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, emotionell instabilitet, irritabilitet och synstörningar. De flesta utsättningssymtom är milda och övergående men kan vara allvarliga hos vissa patienter. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Ett fåtal personer kan utveckla en allvarlig allergisk reaktion. Detta är en mycket sällsynt men allvarlig biverkning. **Om du upplever något av följande symtom ska du sluta ta Citalopram Jubilant och genast kontakta läkare eller akutmottagning på sjukhus:**

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- Hög feber, ångest, förvirring, skakningar och plötsliga muskelsammandragningar: kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas serotonergt syndrom som har rapporterats vid samtidig användning av flera läkemedel mot depression.

- Svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg (angioödem) som leder till svåra svårigheter att svälja eller andas.
- Blödning i magen eller tarmen.
- Snabba, oregelbundna hjärtslag, svimning som kan vara symtom på ett livshotande tillstånd som kallas torsades de pointes.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- Hyponatremi: låga nivåer av natrium i blodet, vilket kan orsaka trötthet, förvirring och muskelryckningar.

Följande biverkningar är vanligtvis lindriga och försvinner efter några dagars behandling. Observera att många av symtomen kan också bero på din sjukdom och kommer därför att minska när du börjar må bättre. Kontakta läkare om några biverkningar är besvärliga eller varar längre än några dagar. Torrhet i munnen ökar risken för karies. Du ska borsta tänderna oftare än vanligt.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- Sömnighet
- Sömnsvårigheter
- Huvudvärk
- Ökad svettning
- Muntorrhet (torr mun ökar risken för karies, så se till att rengöra tänderna oftare än vanligt)
- känna sig sjuk (Illamående)
- Svaghetskänsla (asteni)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Minskad aptit
- Agitation
- Minskad sexlust
- Ångest
- Nervositet
- Förvirring
- Onormala drömmar (ovanliga och intensiva drömmar)
- Darrningar
- Stickningar eller domningar i händer eller fötter
- Ringningar i öronen (tinnitus)
- Gäspningar
- Diarré
- Kräkningar
- Förstoppning
- Klåda
- Smärta i muskler och leder
- Män kan uppleva problem med utlösning och erektion
- Kvinnor kan uppleva svårighet att uppnå orgasm
- Trötthet
- Viktminskning
- Koncentrationsproblem

- Avsaknad av känslor eller entusiasm
- Yrsel
- Täppt eller rinnande och kliande näsa
- Matsmältningsbesvär/halsbränna
- Magsmärtor
- Gasproblem
- Ökad saliv

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
- Lätt att få blåmärken
- Ökad aptit
- Aggression
- Depersonalisering (känner sig frånkopplad eller avskild från kropp och tankar)
- Hallucinationer
- Mani
- Svimning
- Stora pupiller (ögats mörka centrum)
- Snabb hjärtrytm
- Långsam hjärtrytm
- Nässelfeber
- Håravfall
- Hosta
- Utslag
- Känslighet för solljus
- Svårigheter att urinera
- Riklig menstruationsblödning
- Svullnad i armar eller ben
- Ökad vikt
- Sjukdomskänsla

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)
- Krampanfall
- Ofrivilliga rörelser
- Smakförändringar
- Blödning
- Inflammation i levern (hepatit)
- Feber

Vissa patienter har rapporterat (förekommer hos ett okänt antal användare)
Tankar på att skada sig själva eller att begå självmord, se även avsnitt 2 "Vad du behöver veta innan du tar Citalopram Jubilant"
- Ökad blödning eller blåmärken orsakad av minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
- Låga kaliumnivåer i blodet
- Panikattack
- Tandgnissel
- Rastlöshet
- Ovanliga muskelrörelser eller stelhet
- Ofrivilliga rörelser i musklerna (akatisi)

- Näsblödning
- Blödningsrubbningar inklusive hud-och slemhinneblödning (ekkymos)
- Plötslig svullnad av hud eller slemhinna
- Hos män, smärtsamma erektioner
- Flöde av bröstmjölk hos män eller hos kvinnor som inte ammar (galaktorré)
- Onormala leverfunktionstester
- Ökad urinvolym
- Synstörningar
- Lågt blodtryck
- En ökad risk för benfrakturer har observerats hos patienter som tar denna typ av läkemedel
- Onormal hjärtrytm
- Oregelbunden menstruationsblödning
- Kraftig vaginal blödning kort efter födseln (blödning efter förlossningen), se Graviditet i avsnitt 2 för mer information

Berätta också för din läkare om du fortsätter att ha andra symtom kopplade till din depression. Detta kan innefatta hallucinationer, ångest, mani eller förvirring.

Eftersom utsättningssymtom kan uppstå, bör dosen minskas gradvis i intervaller under 1-2 veckor.
Utsättningssymtomen omfattar: yrsel, stickningar eller avdomning, känsla av att man får elektriska stötar, känsellöshet, sömnsvårigheter, livliga drömmar, oro/rastlöshet, ångest, sjukdomskänsla eller illamående, skakningar, förvirring, svettningar, huvudvärk, diarré, hjärtklappning, emotionell instabilitet, irritabilitet och synstörningar. De flesta av utsättningsreaktionerna är lindriga och försvinner av sig själva.

Alla biverkningar som uppstår brukar vanligtvis försvinna efter några dagar.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Citalopram Jubilant ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

- Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaring.

- Används före utgångsdatum som anges på blistern och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är citalopram. Varje tablett Citalopram Jubilant innehåller 10 mg, 20 mg, 30 mg eller 40 mg citalopram (som hydrobromid).
- Övriga innehållsämnen är:
  mikrokrystallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, kopovidon (E1201), kroskarmellosnatrium (E468), majsstärkelse, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), glycerol (E422).
  titandioxid (E171), makrogol (E1521).

Hur Citalopram Jubilant ser ut och innehållet i förpackningen
Citalopram Jubilant finns som 10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg filmdragerade tabletter. Tabletterna beskrivs nedan.

Citalopram Jubilant 10 mg: Vita, runda, filmdragerade tabletter med cirka 5,60 mm diameter, präglade med '**F7**' på ena sidan och ingenting på andra sidan.

Citalopram Jubilant 20 mg: Vita, ovalt formade, bikonvexa, filmdragerade tabletter cirka 8,15 mm långa och 5,65 mm breda, med brytskåra på ena sidan, präglade med '**F**' på den vänstra sidan och '**8**' på den högra sidan om brytskåran och ingenting på den andra sidan.

Citalopram Jubilant 30 mg: Vita, modifierade kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, cirka 11,15 mm långa och 5,65 mm breda, med brytskåra på båda sidorna, präglade med '**F**' och '**9**' på endera sidan om brytskåran på tablettens ena sida.

Citalopram Jubilant 40 mg: Vita, ovalt formade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, cirka 11,65 mm långa och 7,15 mm breda, med brytskåra på ena sidan, präglade med '**G**' på den vänstra sidan och '**1**' på den högra sidan om brytskåran och ingenting på den andra sidan.

Citalopram Jubilant finns i följande förpackningsstorlekar:

<u>Alu/PVC/PVDC blister i pappkartong</u>
20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter

<u>Alu/Alu blister i pappkartong</u>
20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Jubilant Pharmaceuticals nv
Axxes Business Park
Guldensporenpark 22 – Block C
9820 Merelbeke

Belgien

Tillverkare
PSI supply nv
Axxes Business Park
Guldensporenpark 22 – Block C
9820 Merelbeke
Belgien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark	:	Citalopram Jubilant 10 – 20 – 30 – 40 mg Filmovertrukket tablet
Sverige	:	Citalopram Jubilant 10 – 20 – 30 – 40 mg Filmdragerad tablett

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-25