

Bipacksedel

Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

Vad innehåller läkemedlet

1 ml injektionsvätska innehåller:

Aktiva innehållsämnen: Prilokainhydroklorid 30 mg, felypressin 0,54 mikrogram,

Hjälpämnen: natriumklorid 6 mg, natriumhydroxid/saltsyra till pH 3,5-5,2, vatten för injektionsvätskor.

Hur verkar läkemedlet

Citanest Dental Octapressin är ett lokalbedövningsmedel, som hindrar nervsignalerna. Effekten av bedövningen kommer snabbt, vanligen inom 2-3 minuter och sitter kvar i cirka 45 minuter. Vid bedövning av underkäksnerven tar det cirka 5 minuter innan full effekt och effekten sitter kvar i cirka 2 timmar.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Dentsply DeTrey GmbH

De-Trey-Strasse 1

78467 Konstanz

Tyskland

Tillverkare:

Pierrel Farmaceutica S.p.A.

SS Appia

Capua

Italien

LABORATORIOS INIBSA S.A

Ctra, de Sabadell a Granollers, km. 14,5

08185 Llica de Vall

Barcelona

Spanien

Vad används läkemedlet för?

Lokalbedövning inom tandvården.

När ska läkemedlet inte användas

Om du är överkänslig mot lokalbedövningsmedel eller har methemoglobulinemi (ett tillstånd då blodet innehåller röda blodkroppar som inte kan transportera syre och koldioxid i kroppen).

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Du bör undvika att äta innan bedövningen släppt eftersom du kan skada dig genom att bita dig i tex. läppar och tunga.

Om du har någon hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodbrist, njur- eller leversjukdom är det viktigt att du upplyser din tandläkare om det eftersom det kräver speciell uppmärksamhet.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Okänt om Citanest Dental Octapressan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Trafikvarning

Påverkan på rörelseförmågan och koordinationen har rapporterats vid bedövning med Citanest Dental Octapressin. Du bör inte köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete om du får dessa symtom.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel

Citanest Dental Octapressin kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot malaria, infektioner samt mot rytmrubbningar i hjärtat. Tala om för din tandläkare om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel även receptfria sådana.

Doseringsanvisning

Tandläkaren doserar läkemedlet så att det passar dig.

Biverkningar

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): allergiska reaktioner. Ansiktssvullnad.

Domningskänsla och kvarstående känselstörningar har observerats i sällsynta fall.

Nedsatt syresättning av blodet (till följd av methemoglobinemi) kan förekomma efter höga doser eller upprepad dosering av små doser.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-10