

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Corsodyl 2 mg/ml munhålespray

klorhexidindiglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med tandläkare eller läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Corsodyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Corsodyl
3. Hur du använder Corsodyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Corsodyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel.

Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttinflammation och tandlossning. Lösningen kan även användas vid fast tandställning.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

Använd inte Corsodyl

- om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

- Corsodyl ska inte sväljas. Spotta ut eventuellt överskott.
- Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.
- Behandlingen måste kombineras med mekanisk bakteriebeläggings- och tandstensborttagning.
- För långvarigt bruk endast enligt läkares eller tandläkares föreskrift.

- Sluta använda Corsodyl och sök vård omedelbart om du får utslag, eller om dina läppar, tunga, hals eller ansikte svullnar upp, eller om du får svårt att andas.
- Sluta använda Corsodyl och prata med din tandläkare om din mun blir öm eller irriterad.
- Tillfällig missfärgning av tänder och tunga kan uppkomma. Missfärgningen kan förebyggas genom att man begränsar intaget av livsmedel som kan missfärga, som till exempel te, kaffe och rödvin. Missfärgningen kan minskas med hjälp av tandborstning men i vissa fall behövs även mekanisk polering hos tandläkare/tandhygienist.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Inga kända risker vid användning under amning

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd påverkan av Corsodyl på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, etanol och sorbitol

Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudreaktioner.

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg vid max dos (12 sprayningar).

Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

Använd alltid Corsodyl exakt enligt läkarens eller tandläkarens anvisningar. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Sprayas två gånger per dag över tänder och tandköttssytor och munslemhinna. Högst 12 sprayningar per gång.

Rekommenderad dos ska inte överskridas.

Corsodyl sprayas efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av Corsodyl. Vid behov kan eventuell missfärgning poleras bort.

Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.

Om du har använt för stor mängd av Corsodyl

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta använda Corsodyl och kontakta snarast läkare, akutmottagning eller ring 112 om du upplever:

- Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall
- Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg
- Svårigheter att svälja
- Andningssvårigheter

Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.

Övriga biverkningar

- Beläggning på tungan

Denna biverkning är *mycket vanlig* (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare).

- Muntorrhet
- Förändring av smakupplevelsen
- Brännande känsla på tungan

Dessa biverkningar är *vanliga* (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

- Missfärgning av tänder och tunga
- Irritation och/eller svullnad i munnen
- Inflammation i öronspottkörteln
- Hudirritation

Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.

Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på flaskan efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 2 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är etanol (96 %), makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmyntolja och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Corsodyl är en klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek: 60 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Tel: 020-10 05 79

E-mail: mystory.nd@haleon.com

Tillverkare

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland

Denna bipacksedel uppdaterades senast:

2023-06-08