

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Cytisiniklin Ebb 1,5 mg tabletter**

cytisiniklin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

**Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Cytisiniklin Ebb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cytisiniklin Ebb
3. Hur du använder Cytisiniklin Ebb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cytisiniklin Ebb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Cytisiniklin Ebb är och vad det används för**

Rökstopp och minskning av nikotinbegär hos rökare som är villiga att sluta röka. Målet med behandling med Cytisiniklin Ebb är permanent stopp av användning av produkter som innehåller nikotin.

Användning av Cytisiniklin Ebb kan möjliggöra en gradvis minskning av nikotinberoende genom att minska abstinensbesvären.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Cytisiniklin Ebb**

**Använd inte Cytisiniklin Ebb:**

- om du är allergisk mot cytisiniklin (tidigare använt namn: cytisin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),
- om du har instabil angina (kärlkramp),
- om du nyligen har haft hjärtinfarkt,
- om du har störningar i hjärtrytmen,
- om du nyligen har haft en hjärnblödning,
- om du är gravid eller ammar.

#### **Varningar och försiktighet**

Cytisiniklin Ebb ska användas med försiktighet i fall av hjärt- och kärlsjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, feokromocytom (en tumör i binjuren), åderförkalkning och andra kärlsjukdomar i armar och ben, sår i magsäck eller tolvfingertarm, refluxsjukdom i mage och matstrupe, överaktiv sköldkörtel, diabetes, schizofreni, njur- och leversvikt.

Cytisiniklin Ebb ska endast tas av de som seriöst avser att sluta röka. Att använda Cytisiniklin Ebb och fortsätta röka kan leda till allvarliga biverkningar av nikotin.

### **Barn och ungdomar**

Cytisiniklin Ebb rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av begränsad erfarenhet.

### **Äldre personer**

Cytisiniklin Ebb rekommenderas inte till personer över 65 år på grund av begränsad erfarenhet.

### **Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion**

Det finns ingen erfarenhet av Cytisiniklin Ebb hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion, och därför rekommenderas inte läkemedlet till dessa patienter.

### **Andra läkemedel och Cytisiniklin Ebb**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ta inte Cytisiniklin Ebb om du använder läkemedel mot tuberkulos.

I vissa fall kan rökstopp, med eller utan Cytisiniklin Ebb, leda till att man måste justera dosen av andra mediciner. Detta är särskilt viktigt om du använder andra mediciner som innehåller teofyllin (för att behandla astma), takrin (för Alzheimers), klopazin (för schizofreni) och ropinirol (för att behandla Parkinsons). Om du är osäker ska du prata med din läkare eller farmaceut.

Det är för närvarande okänt om Cytisiniklin Ebb kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Om du använder ett hormonellt preventivmedel bör du lägga till en andra barriärmetod (t.ex. kondomer).

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du måste använda effektiva och säkra preventivmedel om du är en kvinna i fertil ålder. Rådfråga din läkare.

Cytisiniklin Ebb ska inte användas under graviditet och amning.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Cytisiniklin Ebb påverkar inte förmågan att köra och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Effekt av rökavvänjning**

Att sluta röka, med eller utan Cytisiniklin Ebb-behandling, kan påverka din kropp och ändra det sätt på vilket andra läkemedel fungerar. Därför måste man i vissa fall justera dosen av andra läkemedel. Se ovan under "Andra läkemedel och Cytisiniklin Ebb" för vidare information.

Att sluta röka, med eller utan behandling, har för vissa personer förknippats med en ökad risk för att uppleva förändringar i hur man tänker eller uppför sig, depression och oro (i sällsynta fall självmordstankar och självmordsförsök). Att sluta röka kan även förknippas med en försämring av en pågående psykiatrisk sjukdom. Om du har eller haft en psykiatrisk sjukdom bör du diskutera detta med din läkare.

## **3. Hur du använder Cytisiniklin Ebb**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En förpackning Cytisiniklin Ebb (100 tabletter) är tillräcklig för en fullständig behandling. Behandlingsperioden är 25 dagar. Cytisiniklin Ebb ska sväljas med en lämplig mängd vatten, enligt följande schema.

| Behandlingsdagar        | Rekommenderad dosering   | Maximal daglig dos |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Från dag 1 till dag 3   | 1 tablett varannan timme | 6 tabletter        |
| Från dag 4 till dag 12  | 1 tablett var 2,5 timme  | 5 tabletter        |
| Från dag 13 till dag 16 | 1 tablett var 3 timme    | 4 tabletter        |
| Från dag 17 till dag 20 | 1 tablett var 5 timme    | 3 tabletter        |
| Från dag 21 till dag 25 | 1–2 tabletter om dagen   | 2 tabletter        |

Du måste sluta röka senast dag 5 av behandlingen. Du ska inte fortsätta röka under behandlingen, eftersom detta kan förvärra negativa biverkningar. I fall av att behandlingen inte fungerar ska behandlingen avslutas och kan återupptas efter 2 till 3 månader.

#### **Om du använt för stor mängd av Cytisiniklin Ebb**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på nikotinförgiftning observeras vid en överdos av Cytisiniklin Ebb. Symtom på en överdos inkluderar diffus känsla av obehag och trötthet, illamående, kräkningar, ökad hjärtrytm, svängningar av blodtrycket, andningsproblem, dimsyn, kramper.

Om du får något ett av dessa symtom eller ett något symtom som inte beskrivs i denna bipacksedel, sluta att ta Cytisiniklin Ebb och kontakta din läkare eller farmaceut.

#### **Om du har glömt att använda Cytisiniklin Ebb**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

#### **Om du slutar att använda Cytisiniklin Ebb**

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Dessa biverkningar kan förekomma mer eller mindre ofta, som definierat nedan:

**Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):** förändrad aptit (oftast ökad aptit), viktökning, yrsel, irritabilitet, humörsvägningar, oro, ökat blodtryck (hypertoni), torr mun, diarré, hudutslag, trötthet, sömnstörningar (sömnlöshet, dåsighet, tillstånd av slöhet/apati/dvala, onormala drömmar, mardrömmar), huvudvärk, ökad hjärtrytm, illamående, smakförändringar, halsbränna, förstoppning, kräkning, magont (särskilt i övre delen av buken), muskelsmärter.

**Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):** koncentrationssvårigheter, långsam hjärtrytm, uppsvälld buk, brännande tunga, diffus känsla av obehag och trötthet.

**Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):** känsla av tyngd i huvudet, minskad sexlust, ökat tårflöde, andnöd, ökad salivmängd, dregling, svettningar, minskad hudelasticitet, trötthet, ökade nivåer av serumtransaminas i blodet.

Biverkningar är vanligast vid behandlingens början och avtar allteftersom behandlingen fortgår. Dessa symtom kan även vara ett resultat av att du har slutat röka (abstinensbesvär), och inte behandlingen med Cytisiniklin Ebb.

## **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## **5. Hur Cytisiniklin Ebb ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är cytiniklin (tidigare använt namn: cytin). En tablett innehåller 1,5 mg av cytiniklin.
- Övriga innehållsämnen är: mannitol, cellulosa mikrokristallin, magnesiumstearat, glyceroldibehenat, hypromellos.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Cytiniklin Ebb är en rund, bikonvex vit tablett med en diameter på 6 mm.

PVC/PCTFE/Aluminium eller PVC/PE/PVDC/Aluminium-blisterpack i en pappkartong som innehåller 100 tabletter.

### **Parallellimportör**

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

### **Ompackare**

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

### **Tillverkare**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Ksawerów, Polen

### **Denna bipacksedel ändrades senast**

2026-01-05