

BIPACKSEDEL

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Dalmarelin vet 25 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och kaniner

2. Sammansättning

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

lecirelin 25 µg (som lecorelinacetat)

Hjälpämnen:

bensylalkohol (E1519) 20 mg.

Klar färglös lösning, utan synliga partiklar.

3. Djurslag

Nötkreatur (ko) och kaniner.

4. Användningsområden

Nötkreatur

- Behandling av follikulära ovariecystor.
- Cyklus-induktion i tidiga post-partum-kor från dag 14 post-partum.
- Induktion av ägglossning vid inseminationstillfället vid kort, tyst brunst eller långvarig brunst.
- Induktion av ägglossning hos kor i cyklus i samband med artificiell insemination för att optimera ägglossningstiden.
- Induktion och synkronisering av brunst och ägglossning i kombination med prostaglandin F2α (PGF2α) eller PGF2α-analog, med eller utan progesteron, som en del av protokollen för artificiell insemination med fast tid (FTAI).

Kaniner

- Induktion av ägglossning.
- Förbättring av befruktningsfrekvensen.

5. Kontraindikationer

Inga.

6. Särskilda varningar

Särskilda varningar:

Läkemedlet bör administreras till kor med normala äggstockar minst 14 dagar efter kalvning på grund av frånvaron av mottaglighet hos hypofysen före denna tidpunkt.

Läkemedlet ska administreras minst 35 dagar efter förlossningen för induktion av ägglossning i samband med artificiell insemination (med eller utan FTAI-protokoll).

OvSynch-proceduren kanske inte är lika effektiv hos kvigor som hos kor.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Djur i dåligt tillstånd, vare sig det beror på sjukdom, otillräcklig näring eller andra faktorer, kan svara dåligt på behandlingen.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

- Personer som är överkänsliga för GnRH-analoger och bensylalkohol ska undvika kontakt med läkemedlet.
- Lecirelin har visat sig vara fostertoxiskt hos råttor; därför bör gravida kvinnor inte hantera läkemedlet. Kvinnor i fertil ålder bör administrera läkemedlet med försiktighet.
- Undvik ögon- och hudkontakt med läkemedlet. Vid oavsiktlig kontakt, skölj noggrant med vatten. Om hudkontakt med läkemedlet uppstår, tvätta omedelbart det exponerade området med tvål och vatten, eftersom lecirelin, liksom alla GnRH-analoger, kan absorberas genom huden. Tvätta händerna efter användning.
- Vid administrering av läkemedlet bör försiktighet iaktas för att undvika oavsiktlig självinjektion genom att säkerställa att djuren är fasthållna på lämpligt sätt och att appliceringsnålen är skyddad fram till injektionsögonblicket. Vid oavsiktlig självinjektion, sök omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.
- Ät, drick eller rök inte när du hanterar läkemedlet.

Dräktighet och digivning:

Användning rekommenderas inte under dräktigheten.

Kan användas under laktation.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Inga kända interaktioner.

Överdoser:

Inga biverkningar registrerades hos nötkreatur med upp till 3 gånger den rekommenderade dosen och hos kaniner med upp till 2 gånger den rekommenderade dosen.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

7. Biverkningar

Nötkreatur (ko) och kaniner.

Inga kända.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem: Läkemedelsverket. Box 26, 751 03 Uppsala.
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

8. Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Administreras intramuskulärt.

Doseringen varierar beroende på indikationerna och djurarten enligt följande.

Nötkreatur

- Behandling av follikulära ovariecystor: 4 ml av läkemedlet (100 µg lecirelin).

- Cyklusinduktion i tidiga post-partum-kor från dag 14 post-partum: 2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin).
- Induktion av ägglossning vid inseminationstillfället vid kort, tyst brunst eller långvarig brunst: 2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin).
- Induktion av ägglossning hos kor i cyklus i samband med artificiell insemination för att optimera ägglossningstiden: 2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin). Efter brunst upptäckt bör läkemedlet administreras vid tidpunkten för den artificiella inseminationen (AI) eller upp till 8 timmar innan. Det bör inte gå mer än 20 timmar mellan början av observerbar brunst och AI.
- Induktion och synkronisering av brunst och ägglossning i kombination med prostaglandin F2α (PGF2α) eller PGF2α-analog, med eller utan progesteron, som en del av protokoll för artificiell insemination (FTAI): 2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin).

På basis av resultat från kliniska studier och vetenskaplig litteratur kan lecorelin användas i kombination med prostaglandin F2α (PGF2α)/PGF2α-analog, med eller utan progesteron, i protokoll för induktion och synkronisering av ägglossning (t.ex. OvSynch) med artificiell insemination med fast tid (AI) hos nötkreatur.

OvSynch-protokollet (dvs. GnRH/prostaglandin/GnRH) för avel av mjölkkor vid en förplanerad tidpunkt utan behov av specifik brunstdetektering sammanfattas nedan:

Dag 0	2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin)
Dag 7	PGF2α/PGF2α-analog vid luteolytisk dos
Dag 9	2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin)
AI	16 - 20 timmar efter den andra lecorelininjektionen, eller vid observerad brunst om tidigare.

OvSynch-protokollet kombinerat med progesterontillskott för avel av mjölkkor vid en förplanerad tidpunkt utan behov av specifik brunstdetektering sammanfattas nedan:

Dag 0	Sätt in progesteronavgivande intravaginal inlägg Administrera 2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin)
Dag 7	Ta bort vaginalinlägget Administrera PGF2α/PGF2α-analog i luteolytisk dos
Dag 9	2 ml av läkemedlet (50 µg lecorelin)
AI	16 - 20 timmar efter den andra lecorelininjektionen, eller vid observerad brunst om tidigare

Andra protokoll kan vara lika relevanta i en given besättning. Bedömning av vilket protokoll som ska användas bör göras av den ansvarige veterinären, på grundval av den individuella besättningens betingelser.

Kaniner

- Induktion av ägglossning: 0,2 ml.
- Förbättring av befruktningsfrekvensen: 0,3 ml.

Behandling kan ges 24 timmar efter förlossningen.

Parning eller insemination måste ske omedelbart efter administrering.

9. Råd om korrekt administrering

Förslutningarna bör inte punkteras mer än 25 gånger.

10. Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjölk: Noll timmar.

11. Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Exp.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

12. Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Fråga veterinären eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

13. Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt.

14. Nummer på godkännande för försäljning och förpackningsstorlekar

MTnr: 62988

- Kartong med 1 injektionsflaska med 4 ml
- Kartong med 10 injektionsflaskor med 4 ml
- Kartong med 1 injektionsflaska med 10 ml
- Kartong med 5 injektionsflaskor med 10 ml
- Kartong med 1 injektionsflaska med 20 ml
- Kartong med 1 injektionsflaska med 50 ml
- Kartong med 1 hopfällbar behållare med 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

15. Datum då bipacksedeln senast ändrades

2026-02-19

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas
(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italien.
Tel: +39 051 6512711

17. Övrig information

Lecirelin är en syntetisk analog av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH). Den skiljer sig genom att D-tertiär leucin ersätts med glycin i position 6 och ersättning av glycin med etylamid i position 10. Därmed är det en nonapeptid.

På grund av strukturella skillnader mellan lecirelin och naturligt GnRH, visar lecirelinmolekylen större fortbestånd vid platsen för de specifika hypofyseala receptorererna.

Den fysiologiska verkan av gonadotropinerna är ett resultat av att stimulera mognaden av follikeln, inducera ägglossning och uppkomsten av corpora lutea (gulkropp) i äggstocken.

Lecirelin administrerat intramuskulärt och absorberas snabbt.

Plasmaeliminering sker snabbt, medan den hormonella verkan kvarstår i flera timmar, på grund av större styrka i bindningen till receptorstället.

Farmakokinetiken är dock art- och dosberoende.

GnRH-analoger ackumuleras primärt i levern, njurarna och hypofysen, varpå de metaboliseras enzymatiskt och producerar metaboliter som saknar farmakologisk aktivitet, vilka därefter utsöndras i urinen.