

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Dentan 0,05 % munsköljvätska** natriumfluorid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Dentan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
3. Hur du använder Dentan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dentan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Dentan är och vad det används för**

Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförts lokalt i munhålan, t ex genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en bruksfärdig natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn över 6 år och vuxna. Dentan kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk t.ex. vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan**

##### **Använd inte Dentan**

- om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med tandläkare/läkare, apotekspersonal innan du använder Dentan om du har:

- svår njursjukdom.

##### **Andra läkemedel och Dentan**

Tala om för tandläkare, läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Behandlande tandläkare/läkare bör känna till samtidig behandling med andra läkemedel innehållande fluor.

##### **Graviditet och amning**

Det finns inga risker med att använda Dentan under graviditet och amning.

##### **Körförmåga och användning av maskiner**

Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

### **Dentan innehåller metylparahydroxibensoat**

Dentan innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

### **3. Hur du använder Dentan**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### Dosering

*Barn 6-12 år:* Dosering enligt rekommendation av tandvårdspersonal.

*Barn över 12 år och vuxna med hög kariesrisk eller med mycket karies:*

10 ml Dentan fluorlösning 1-2 gånger dagligen, som alternativ till fluortabletter.

Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut.

Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

#### **Om du använt för stor mängd av Dentan**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att använda Dentan**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

#### **Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom**

(angioödem, mycket sällsynt)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

#### **Andra biverkningar**

*Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):* Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brinnande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).

*Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):* överkänslighetsreaktioner (även lokalt i munhålan).

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
www.lakemedelsverket.se

## **5. Hur Dentan ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är natriumfluorid 0,5 mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) och vatten.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Cooper Consumer Health B.V.  
Verrijn Stuartweg 60,  
1112AX Diemen  
Nederländerna

### **Tillverkare**

Unimedic AB  
Box 91  
864 21 Matfors

**Denna bipacksedel ändrades senast:**

2025-09-02