

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Dentirol Fluor Svartvinbär 0,25 mg och 0,75 mg fluor sugtablett

Dentirol Fluor Mint 0,25 mg fluor sugtablett

Dentirol Fluor Smultron 0,25 mg fluor sugtablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Dentirol Fluor sugtabletter.

Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Dentirol Fluor sugtabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå bästa resultat.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare/tandläkare eller tandhygienist om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare eller tandhygienist eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Dentirol Fluor sugtabletter är och vad det används för.
2. Att tänka på innan du tar Dentirol Fluor sugtabletter.
3. Hur du använder Dentirol Fluor sugtabletter.
4. Eventuella biverkningar.
5. Hur Dentirol Fluor sugtabletter skall förvaras.
6. Övriga upplysningar.

1. VAD DENTIROL FLUOR SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sugtabletterna används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos barn och vuxna med förhöjd risk för karies, t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker, delprotes eller fastsittande tandställning eller efter bedömning av tandläkaren.

När du suger på tabletten höjs fluorhalten i saliv och plack, Detta gynnar emaljen och små kariesskador (hål) kan läkas.

2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER DENTIROL FLUOR SUGTABLETTER

Om du är allergisk mot natriumfluorid eller något av innehållsämnen skall du inte använda Dentirol Fluor sugtabletter.

Dentirol Fluor bör ej användas i områden med hög koncentration av fluor i dricksvattnet. Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Graviditet.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning.

Dentirol Fluor går inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner.

Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.

Viktig information om något innehållsämne i Dentirol Fluor.

Sugtablett innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. HUR DU ANVÄNDER DENTIROL FLUOR SUGTABLETTER**Doseringsanvisning**

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

Sugtabletter 0,25 mg: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen minst 4 och högst 6 gånger dagligen.

Sugtabletter 0,75 mg: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen 2 gånger dagligen.

Annan dos enligt tandläkarens/läkarens eller tandhygienists föreskrift. Följ alltid läkares/tandläkares eller tandhygienists ordination och anvisningarna på apoteketiketten.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller fluorsköljning skall dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkarens eller tandhygienists rekommendation.

Fördela intaget av sugtabletter och användningen av fluortandkräm över dagen så att fluortillförseln sker vid så många tillfällen som möjligt.

Sug långsamt på tablett så att den får verka så länge som möjligt.

Om du tagit för stor mängd Dentirol Fluor sugtabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR.

Liksom alla läkemedel kan Dentirol Fluor sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga: Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tuggummi och/eller tabletter – ge upphov till lätt emaljförändring, emaljfluoros, med obetydliga vita fläckar på kindtänderna som resultat.

Mycket sällsynta: I mycket sällsynta fall har svullnad (angioödem) i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Dentirol Fluor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare eller tandhygienist eller apotek.

5. HUR SKA DENTIROL FLUOR SUGTABLETTER FÖRVARAS

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor eller 0,75 mg fluor.

Övriga innehållsämnen är: Xylitol 203 mg (E967), sorbitol 172-178 mg (E420), magnesiumsterat, spearmintarom, smultronarom eller svartvinbärsarom, karmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Vita runda sugtabletter med smak av mint, smultron eller svartvinbär. Dentirol Fluor svartvinbär 0,75 mg fluor är märkt med "75".

Förpackningar:

Sugtabletter 0,25 mg fluor, mint, svartvinbär och smultron;

160 st i plastburk

200 st i plastburk

240 st i plastburk

540 st i platsburk (endast receptbelagd förpackning).

Sugtabletter 0,75 mg fluor, svartvinbär;

100 st i plastburk

120 st i plastburk

200 st i plastburk (endast receptbelagd förpackning).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Dentirol Medical AB

Box 11099

404 22 Göteborg

Telefon: 031-13 09 19

e-post: info@dentirol.se

Denna bipacksedel godkändes senast:

2015-09-01