Bipacksedel: Information till användaren

Desloratadin Orion 2,5 mg munsönderfallande tabletter

desloratadin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Desloratadin Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadin Orion
3. Hur du tar Desloratadin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desloratadin Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Desloratadin Orion är och vad det används för

Vad Desloratadin Orion är
Desloratadin Orion innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

Hur Desloratadin Orion verkar
Desloratadin Orion är ett antiallergiskt läkemedel. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

När Desloratadin Orion ska användas
Desloratadin Orion lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna, ungdomar och barn 6 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Desloratadin Orion används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Desloratadin som finns i Desloratadin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadin Orion

Ta inte Desloratadin Orion
- om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desloratadin Orion:
- om du har nedsatt njurfunktion
- om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

Barn och ungdomar
Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år.

Andra läkemedel och Desloratadin Orion
Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadin Orion och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Desloratadin Orion med mat, dryck och alkohol
Var försiktig om du tar Desloratadin Orion tillsammans med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Intag av Desloratadin Orion rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner
Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Desloratadin Orion munsönderfallande tabletter innehåller aspartam
Detta läkemedel innehåller 1,5 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Övriga innehållsämnen
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du tar Desloratadin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning för vuxna och ungdomar 12 år och äldre
Rekommenderad dos är två tabletter en gång dagligen.

Användning för barn från 6 till och med 11 år
Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen.

Placera tabletten i munnen där den löses upp omedelbart före du sväljer. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tabletten.

Beträffande behandlingens längd fastställer din läkare orsaken till behandlingen och informerar dig om hur länge du ska ta Desloratadin Orion. Du ska följa din läkares ordination.

Om du har tagit för stor mängd av Desloratadin Orion
Ta Desloratadin Orion endast som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Desloratadin Orion
Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård:

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):
- allvarliga allergiska reaktioner, inklusive angioödem (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och/eller svullnad av ansikte, tunga eller svalg).

Andra biverkningar som kan förekomma

I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.

Vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare*):
- trötthet
- muntorrhet
- huvudvärk.

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):
- utslag
- bultande eller oregelbundna hjärtslag, snabba hjärtslag
- ont i magen, illamående, kräkningar, orolig mage, diarré
- yrsel, dåsighet, sömnsvårigheter, krampanfall, rastlöshet med ökad kroppsrörelse
- muskelsmärtor
- hallucinationer
- leverinflammation, avvikande leverfunktionstester.

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):
- ovanlig svaghet
- gulfärgning av hud och/eller ögon
- ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis, och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium
- förändringar i hur hjärtat slår

- avvikande beteende, aggression, nedstämdhet
- viktökning
- ökad aptit
- torra ögon.

Ytterligare biverkningar hos barn

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):
- långsamma hjärtslag, arytmi (oregelbunden hjärtrytm).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Desloratadin Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är desloratadin. Varje munsönderfallande tablett innehåller 2,5 mg desloratadin.
- Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, röd järnoxid, polakrilinkalium, citronsyra, pepparmintsmak (maltodextrin, akaciagummi, smakämnen), aspartam (E951), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Svagt röda, runda, platta, spräckliga tabletter märkta med ”D1” på ena sidan och omärkta på den andra. En diameter på cirka 6 mm.

Desloratadin Orion förpackas i blister i förpackningar innehållande 30, 90 och 100 munsönderfallande tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Tillverkare
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:
Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-06-11