

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Desloratadin Orion 2,5 mg munsönderfallande tabletter**

desloratadin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Desloratadin Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadin Orion
3. Hur du tar Desloratadin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desloratadin Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Desloratadin Orion är och vad det används för**

##### **Vad Desloratadin Orion är**

Desloratadin Orion innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

##### **Hur Desloratadin Orion verkar**

Desloratadin Orion är ett antiallergiskt läkemedel. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

##### **När Desloratadin Orion ska användas**

Desloratadin Orion lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel höснуva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna, ungdomar och barn 6 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Desloratadin Orion används också för att lindra symtomen som är förknippade med kronisk idiopatisk urtikaria (en hudåkomma med okänd orsak) hos vuxna, initialt diagnostiserad av läkare. Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Desloratadin som finns i Desloratadin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

## **2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadin Orion**

### **Ta inte Desloratadin Orion**

- om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desloratadin Orion:

- om du har nedsatt njurfunktion
- om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

Om du lider av kronisk idiopatisk urtikaria bör detta diagnostiseras av din läkare innan du tar Desloratadin Orion.

### **Barn och ungdomar**

Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år.

### **Andra läkemedel och Desloratadin Orion**

Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadin Orion och andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

### **Desloratadin Orion med mat, dryck och alkohol**

Var försiktig om du tar Desloratadin Orion tillsammans med alkohol.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Intag av Desloratadin Orion rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Desloratadin Orion munsönderfallande tablett innehåller aspartam**

Detta läkemedel innehåller 1,5 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

### **Övriga innehållsämnen**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

## **3. Hur du tar Desloratadin Orion**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Användning vid allergisk rinit**

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar 12 år och äldre är två tabletter en gång dagligen.

Rekommenderad dos för barn från 6 till och med 11 år är en tablett en gång dagligen.

### **Användning vid kronisk idiopatisk urtikaria**

Rekommenderad dos för vuxna är två tabletter en gång dagligen.

Om du behöver använda detta läkemedel längre än 3 månader, ska du kontakta läkare för att undersöka om dina symtom har en annan orsak.

Placera tablett i munnen där den löses upp omedelbart före du sväljer. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tablett.

Behandlingens längd beror på typen av besvär, hur länge de har pågått och hur de utvecklas. Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Sök omedelbart sjukvård om du får andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga eller hals.

### **Om du har tagit för stor mängd av Desloratadin Orion**

Ta Desloratadin Orion endast enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Desloratadin Orion**

Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

**Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård:**

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- allvarliga allergiska reaktioner, inklusive angioödem (svårigheter att andas, pip ljud, klåda, nässelutslag och/eller svullnad av ansikte, tunga eller svalg).

### **Andra biverkningar som kan förekomma**

I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en överksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en överksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- trötthet
- muntorrhet
- huvudvärk.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- utslag
- bultande eller oregelbundna hjärtslag, snabba hjärtslag
- ont i magen, illamående, kräkningar, orolig mage, diarré
- yrsel, dåsighet, sömnsvårigheter, krampanfall, rastlöshet med ökad kroppsrörelse
- muskelsmärter
- hallucinationer
- leverinflammation, avvikande leverfunktionstester.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- ovanlig svaghet
- gulfärgning av hud och/eller ögon
- ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis, och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium
- förändringar i hur hjärtat slår
- avvikande beteende, aggression, nedstämdhet
- viktökning
- ökad aptit
- torra ögon.

### **Ytterligare biverkningar hos barn**

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- långsamma hjärtslag, arytm (oregelbunden hjärtrytm).

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Desloratadin Orion ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är desloratadin. Varje munsönderfallande tablett innehåller 2,5 mg desloratadin.

- Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, röd järnoxid, polakrilinkalium, citronsyra, pepparmintsmak (maltodextrin, akaciagummi, smakämnen), aspartam (E951), magnesiumstearat.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Svagt röda, runda, platta, spräckliga tabletter märkta med "D1" på ena sidan och omärkta på den andra. En diameter på cirka 6 mm.

Desloratadin Orion förpackas i blister i förpackningar innehållande 30 munsönderfallande tabletter.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Finland

**Tillverkare**

Orion Corporation Orion Pharma  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Finland

Orion Corporation Orion Pharma  
Joensuunkatu 7  
FI-24100 Salo  
Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:  
Orion Pharma AB, Danderyd, [medinfo@orionpharma.com](mailto:medinfo@orionpharma.com)

**Denna bipacksedel ändrades senast 2026-06-11**