

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Diamox 250 mg tabletter**

acetazolamid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Diamox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Diamox
3. Hur du tar Diamox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diamox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Diamox är och vad det används för**

Diamox innehåller acetazolamid som aktivt innehållsämne, vilket sänker trycket inuti ögat genom att minska produktionen av kammarvatten (vätska inuti ögongloben).

Diamox används som korttidsbehandling vid ögonkirurgi då det finns anledning att befara att trycket i ögat stiger. Diamox används också som tilläggsterapi vid behandling av grön starr (glaukom), innan ögonoperation som behandling av akut trångvinkelglaukom och som tilläggsterapi vid behandling av epilepsi (petit mal).

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Diamox**

##### **Ta inte Diamox**

- om du är allergisk mot acetazolamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har renal hyperkloremisk acidosis (störning i kroppens saltbalans pga. rubbning i njurfunktionen)
- om du har Addisons sjukdom (nedsatt produktion av kortikoidhormoner i binjurarna ovanför njurarna)
- om du har eller har haft starkt nedsatt lever- eller njurfunktion
- om du har sänkta nivåer av natrium och/eller kalium i blodet
- om du är allergisk mot sulfonamider
- om du behandlas för kroniskt icke-kongestivt trångvinkelglaukom (en typ av glaukom där de normala avrinningskanalerna i ögat har smalnat, vilket leder till ett ökat tryck i ögat och nedsatt syn). Din läkare kommer att prata med dig om detta.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Diamox:

- om du har lung- eller andningsproblem såsom lungemfysem eller tidigare haft lung- eller andningsproblem (vätska i lungorna) efter intag av acetazolamid.
- om du har eller tidigare har haft problem med njurarna såsom njursten

- om du har diabetes eller problem med ditt blodsocker

Om du blir andfådd eller får svårt att andas efter att du har tagit Diamox ska du omedelbart söka läkarvård (se även avsnitt 4).

Om hudpåverkan eller allvarliga förändringar i blodbilden uppstår kan din läkare eventuellt sätta ut behandlingen och påbörja annan lämplig behandling.

Diamox kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Diamox har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Synnedstättning eller ögonsmärta kan vara symtom på ansamling av vätska i ögats kärlskikt (koroidal effusion eller koroidal avlossning). Detta kan uppstå inom några timmar efter intag av Diamox. Tala omedelbart med läkare om du får dessa symtom.

### **Andra läkemedel och Diamox**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekterna av något av dessa läkemedel kan förändras, särskilt om du tar eller använder något av följande:

- läkemedel mot epilepsi eller kramper (speciellt fenytoin, topiramat, karbamazepin eller primidon)
- läkemedel mot diabetes för att sänka blodsockret (t ex metformin)
- andra läkemedel i en grupp som kallas karbanhydrashämmare (används för behandling av högt tryck inuti ögat/ögonen)
- läkemedel som påverkar folsyra t ex metotrexat, pyrimetamin eller trimetoprim
- blodförtunnande medel t ex warfarin
- aspirin och närbesläktade läkemedel t ex acetylsalicylsyra
- hjärtläkemedel såsom hjärtglykosider (t ex digoxin)
- läkemedel mot högt blodtryck
- läkemedel mot urinvägsinfektioner (metenamin)
- läkemedel som innehåller amfetamin (ett stimulerande medel), kinidin (behandlar oregelbundna hjärtslag), memantin (behandlar Alzheimers sjukdom) eller litium (behandlar allvarliga mentala problem)
- ciklosporin (används efter transplantationer för att trycka ner immunförsvaret)
- behandling med natriumbikarbonat (används vid tillstånd där det är för mycket syra i din kropp).

Diamox kan påverka vissa medicinska undersökningar. Om du besöker ett sjukhus eller mottagning för en medicinsk undersökning ska du berätta för din läkare att du tar Diamox. Kontakta din läkare. Det kan vara nödvändigt att ändra dosen.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

#### Graviditet

Diamox kan påverka fostret. Diamox bör därför inte användas om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

#### Amning

Acetazolamid passerar över i modersmjölk. Det finns risk att barn som ammas påverkas. Använd därför inte Diamox under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

#### Fertilitet

Det finns en risk att potens och sexlust hos män påverkas.

#### **Körförmåga och användning av maskiner**

Om Diamox gör att du känner dig yr, dåsig eller förvirrad ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Det kan tillfälligt orsaka närsynthet; om detta händer och du känner att du inte längre kan köra säkert ska du sluta köra bil och kontakta läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### **Information om natriumhalt:**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

### **3. Hur du tar Diamox**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

*Korttidsbehandling vid ögonkirurgi:* Rekommenderad dos är mellan 250-1000 mg dagligen.

*Akut trångvinkelglaukom och glaukom:* Rekommenderad dos är 250-1000 mg dagligen uppdelat på 2-4 doser. Diamox kan användas tillsammans med vanliga pupillsammandragande medel.

*Som tilläggsbehandling vid epilepsi (petit mal):* Rekommenderad dos för vuxna är 375-1000 mg dagligen, uppdelat på 2-4 doser.

När Diamox ges i kombination med andra antiepileptika, föreslås en startdos på 250 mg dagligen som tillägg till redan insatt behandling. Denna dos ökas därefter till ovanstående nivå.

Innan du börjar ta Diamox, och under behandlingen, kommer din läkare att ta blodprover för att kontrollera om du fortfarande behöver ta Diamox.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Diamox**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att ta Diamox**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Kontakta omedelbart läkare ifall du får något av följande tillstånd:

- om du får plötslig väsande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det drabbar hela kroppen). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).
- om du får en allergisk reaktion som orsakar ledvärk, utslag och feber (Stevens-Johnsons syndrom) allvarlig sjukdom med blåsor på huden och i ett mer allvarligt tillstånd (toxisk epidermal nekrolys) med ökade skador på huden eller utbredda utslag med typiska punkter (erythema multiforme). Denna biverkan är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).
- om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Läkare bör via blodprov ta reda på om du har allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Denna biverkan är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).
- om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).
- om du får allvarligt nedsatt leverfunktion (levernekros), leverinflammation (hepatit), gulnad hud och ögon, mörkfärgad urin och blek avföring (gulsot), njursvikt. Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).
- Om du får ökad surhetsgrad i blodet som kan leda till symtom som illamående, kräkningar, hjärtklappning eller huvudvärk. Denna biverkan är vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).
- Om du utvecklar andningsbrist eller andningssvårigheter. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i lungorna (lungödem). Frekvensen av denna biverkning kan inte beräknas från tillgängliga data (ingen känd frekvens).

Övriga biverkningar som kan uppkomma:

*Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)*

- smakstörning (dysgeusi)
- yrsel, trötthet.

*Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)*

- stickningar eller domningar i fingrar eller tår
- klåda
- kräkningar eller illamående
- smärta i ländryggen på grund av njursten
- feber, kraftlöshet.

*Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)*

- allmän trötthet, blekhet i huden, halsinfektion (aplastisk anemi)
- muskelsvaghet
- kramper (anfall)
- tillfällig närsynthet som försvinner när dosen minskas eller behandlingen avslutas
- öronringningar eller svårighet att höra
- diarré
- ökad ljuskänslighet
- ökad behåring hos kvinnor.

*Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)*

- huvudvärk, irritation, upphetsning

- brist på koordination av muskler
- depression, dåsigheit, förvirring
- försämrad hörsel
- svart eller tjärliknande avföring
- nässelutslag
- hudrodnad
- ökad urin, grumlig urin, blod eller socker i urinen
- ökad törst
- minskad sexuell lust
- benskörhet
- synnedsättning eller ögonsmärta på grund av ansamling av vätska i ögats kärlskikt (koroidal effusion eller koroidal avlossning).

*Följande kan ses vid rutinmässiga undersökningar:*

- ändrad leverfunktion
- blod eller socker kan finnas i urinen
- förändrade urinsyranivåer i blodet
- ändrade blodsockerhalter
- förändringar i blodbilden

Om du tar Diamox tabletter under en lång tid kan det ibland påverka mängden kalium eller natrium i blodet. Din läkare kommer förmodligen att ta blodprover för att kontrollera att detta inte händer. Du kan också uppleva benförtunning eller risk för njursten med långvarig behandling.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen och läkmedels säkerhet.

Om någon av biverkningarna blir allvarlig eller om du får några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Diamox ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är acetazolamid 250 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Diamox 250 mg är vita, runda, lätt bikonvexa tabletter med krysskåra på den ena sidan och präglade med "FW" och "147" på andra sidan.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter i plastburk.

**Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**Innehavare av godkännande för försäljning

Amdipharm Limited  
Unit 17  
Northwood House  
Northwood Crescent  
Northwood  
Dublin 9  
D09 V504  
Irland

Tillverkare

Abcur AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg  
Sverige

eller

Skyepharma Production S.A.S.  
Zone Industrielle Chesnes Ouest  
55, rue du Montmurier  
SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070  
Frankrike

**Denna bipacksedel godkändes senast**

2025-09-01