

Bipacksedel: Information till användaren

Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan 1 mg/ml + 250 mg/ml rektallösning

dokusatnatrium/sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om symtomen försämrats eller inte förbättras inom 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan
3. Hur du använder Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan är och vad det används för

Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan utövar sin effekt genom att öka vatteninnehållet i avföringen. Hård avföring mjukas upp och därigenom underlättas tarmtömningen. Effekten inträder ca 5-20 minuter efter applicering. De normalt fungerande tarmreflexerna störs ej.

Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan används vid tillfällig förstoppning i ändtarmen. På ordination från läkare eller annan sjukvårdspersonal används läkemedlet även för rengöring av ändtarmen före undersökning (rektoskopering), före röntgenundersökning av bäckenregionen samt före förlossning.

Dokusatnatrium/sorbitol som finns i Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan

Använd inte Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan:

- om du är allergisk mot dokusatnatrium, sorbitol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du lider av inflammatorisk tarmsjukdom
- om du har tarmlödningar
- om du har buksmärtor av okänt ursprung
- om du har stopp i tarmkanalen

Varningar och försiktighet

Användning av rektallösningar kan skada tarmväggen och Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan bör därför inte användas under mer än en veckas tid. Användning under längre tid än en vecka kan leda till irritation i tarmen och till att natrium- och kaliumnivåerna i blodet rubbas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Inga förväntade effekter på det barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Dosering för vuxna

Vid tillfällig förstoppning eller för rengöring av ändtarmen används 120 ml eller vid behov 240 ml. Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan värms lämpligen i vattenbad till kroppstemperatur före användning.

Bruksanvisning

1. Dra av skyddshylsan, som sitter på pipen
2. Smörj pipen med vaselin eller genom att pressa ut några droppar lösning
3. Lagg dig på vänster sida med det vänstra benet utsträckt och det högra benet böjt framåt för att få balans
4. Håll runt flaskan med hela handen. För försiktigt in pipen i ändtarmen och pressa sedan långsamt ut lösningen. Om vätskan inte kan pressas ut ur flaskan kan det bero på att pipen ligger emot något. Försök då ändra pipens riktning.
5. Fortsätt att hålla flaskan sammanpressad medan du drar ut pipen, för att förhindra att vätskan åker tillbaka in i flaskan.
6. Ligg kvar och försök att hålla kvar lösningen i tarmen ca 5 minuter, så att lösningen hinner verka. Besök sedan toaletten.
7. Kasta bort den tömda flaskan. Det är normalt att en liten del av vätskan blir kvar i flaskan.

Om du har använt för stor mängd av Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Enstaka fall av nässelutslag och svårare typer av allergi med blodtrycksfall och andningssvårigheter har rapporterats. Knipsmärtor och illamående kan förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är dokusatnatrium och sorbitol. 1 ml rektallösning innehåller 1 mg dokusatnatrium och 250 mg sorbitol.
- Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dokusatnatrium/Sorbitol Evolan är en ofärgad, klar, lätt simmig rektallösning.

Förpackningsstorlekar:
120 ml: 1, 10, 30, 50 och 100 st.
240 ml: 1, 10, 30 och 50 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd

Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-11-14.