

Bipacksedel

DUVAXYN T VET

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Duvaxyn T vet injektionsvätska, suspension.

DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

1 vaccindos innehåller:

Aktiva innehållsämnen: Renad tetanustoxoid >150 IE/ml

Adjuvans: Aluminiumfosfat 3,5 mg

Hjälpämnen: Tiomersal (konservans) 100 mikrogram

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Fort Dodge Animal Health Holland

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp

Nederländerna

Ombud:

Ceva Vetpharma AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

DJURSLAG

Häst

INDIKATIONER

För vaccination av friska hästar mot sjukdom (stelkramp) orsakad av *Clostridium tetani*.

DOSERING

1 dos = 1 ml

Vaccinet omskakas väl före användning och ges djupt intramuskulärt.

Grundvaccination:

Två vaccinationer med 4 – 6 veckors mellanrum.

Föl vaccineras från 5 månaders ålder. Vid ökad risk för tetanus hos unga föl – särskilt vid otillräckligt intag av kolostrum – kan en extra vaccination ges från 3 månaders ålder. Full grundvaccination skall ges till dessa föl från 5 månaders ålder.

Revaccination:

Den tredje vaccinationen ges 6 månader efter fullföljd grundvaccination.

Därefter revaccineras hästen 1 gång vart tredje år.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Vaccinet skall administreras djupt intramuskulärt.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Vaccinet skall omskakas väl före användning.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

ANVÄNDNING UNDER DRÄKTIGHET OCH DIGIVNING

Vaccinet kan ges till dräktiga och digivande ston.

BIVERKNINGAR

Lokala reaktioner på injektionsstället kan förekomma. Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

KARENSTID

Slakt: 0 dygn.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på etiketten.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Tillstånd av stress vid vaccinationstillfället bör i möjligaste mån undvikas.

Effekten av vaccinet kan utebli om hästen står på kortisonbehandling eller annan immunosuppressiv behandling.

Vid oavsiktlig självinjektion, kontakta läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Tomma förpackningar behandlas som hushållsavfall.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST REVIDERADES

2004-11-30