

Bipacksedel: Information till patienten

Epsolay 50 mg/g kräm

bensoylperoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Epsolay är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Epsolay
3. Hur du använder Epsolay
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Epsolay ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Epsolay är och vad det används för

Epsolay innehåller bensoylperoxid. Denna typ av läkemedel tillhör en grupp antibakteriella läkemedel avsedda för användning på huden. Epsolay är ett läkemedel som används för behandling av inflammatoriska hudförändringar såsom finnar och upphöjningar som är förknippade med rosacea hos vuxna.

Bensoylperoxid som finns i Epsolay kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Epsolay

Använd inte Epsolay

Om du är allergisk mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Epsolay.

- Undvik användning av Epsolay på hud med sår, skrubbsår, eksem eller på solbränd hud.
- Begränsa din tid i solljus. Undvik solljus eller artificiellt solljus såsom sollampor eller solarier. Epsolay kan göra din hud mer känslig för solen och ljuset från sollampor och solarier. För att skydda dig mot solen kan du använda t.ex. solskyddsmedel och bär löst sittande kläder som täcker huden när du vistas i solljus. Sluta använda Epsolay om du blir solbränd.
- Undvik samtidig användning med tetracykliner (läkemedel mot bakterieinfektioner t.ex. tetracyklin, doxycyklin).
- Undvik att få Epsolay i håret eller på färgade textilier (t.ex. kläder). Epsolay kan bleka hår eller färgade textilier.

- Tala om för din vårdgivare innan du använder Epsolay om du har andra sjukdomar, inklusive andra hudproblem, såsom eksem, sår eller solbränd hud.
- Om du får tecken på hudirritation, använd en icke-komedogen (täpper inte till porerna) mjukgörande kräm, , förlänga tidsintervallet mellan doserna (t.ex. varannan dag) eller avbryt behandlingen tillfälligt eller permanent såsom sjukvårdspersonalen instruerat dig.
- Tvätta händerna omedelbart efter applicering. Om Epsolay kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart och noggrant med ljummet vatten.

Barn

Epsolay har inte studerats hos barn under 18 år.

Andra läkemedel och Epsolay

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt sådana som kan göra huden mer känslig för solljus, såsom läkemedel i gruppen tetracykliner (läkemedel mot bakterieinfektioner t.ex. tetracyklin eller doxycyklin).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Epsolay innehåller cetylalkohol

Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

3. Hur du använder Epsolay

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Epsolay är endast avsett för användning på huden. Får inte sväljas, användas i ögon eller vaginalt.

Rekommenderad dos:

- Applicera Epsolay i ansiktet 1 gång dagligen på ren och torr hud.
- Innan du använder Epsolay första gången, förbered pumpen genom att trycka ned (pumpa) tills den första droppen kräm kommer ut.
- Applicera en mängd motsvarande en ärtas storlek av Epsolay på varje område i ansiktet (panna, haka, näsa, varje kind) på ren och torr hud. Fördela som ett tunt lager över hela ansiktet. Undvik ögon, läppar och mun.
- Tvätta händerna direkt efter applicering.

Om du har använt för stor mängd av Epsolay

Epsolay har låg systemisk absorption. Risken för överdosering är därför inte relevant.

Om läkemedlet appliceras i för stor mängd kommer ingen snabbare eller bättre effekt att uppnås. I sådana fall ska behandlingen avbrytas tills huden har återhämtat sig.

Om du svält eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Epsolay

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Applicera nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om du slutar att använda Epsolay

Sluta inte använda Epsolay utan att rådfråga läkare.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om din hud blir irriterad, eller om rodnad, fjällning, torrhet, sveda eller brännande känsla uppstår, kan du använda en mjukgörande kräm. Tala om för läkare om dina symtom inte förbättras, eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Epsolay.

Tala omedelbart med läkare om du utvecklar en allvarlig allergisk reaktion.

Tecken på allvarliga allergiska reaktioner kan inkludera:

- nässelutslag, utslag eller kraftig klåda
- svullnad i ansikte, ögon, läppar, tunga eller svalg
- andningssvårigheter eller känsla av trånghet i halsen
- känsla av att svimma, yrsel eller ostadighet

Vanliga biverkningar: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Smärta, rodnad, klåda och svullnad vid appliceringsstället.

Detta är inte alla möjliga biverkningar av Epsolay.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Epsolay ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

Kassera oanvänd Epsolay 60 dagar efter första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är bensoylperoxid

- Övriga innehållsämnen är citronsyra, cetrimoniumklorid, cetylalkohol, cyklometikon, dinatriumedetat, glycerol, koncentrerad saltsyra, mjölksyra, makrogolstearat (typ I), glycerolmonostearat 40–55 (typ II), fenoxietanol, polyquaternium 7, kiseldioxid, kolloidal hydrerad, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Epsolay är en vit till benvit kräm förpackad i en lufttät pump med 30 ml (30 g) kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Galenica AB
Medeon Science Park
205 12 Malmö
Sverige

Tillverkare

Galenica AB
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö
Sverige

Eurodep Pharma
7 Rue Antoine De Saint Exupery
Zac Du Parc De Compans
Mitry Mory 77290
Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark	Epsolay
Finland	Epsolay 50 mg/g emulsiovoide
Island	Epsolay 50 mg/g krem
Norge	Epsolay 50 mg/g krem
Sverige	Epsolay 50 mg/g kräm

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-07-09

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se