

Bipacksedeln: Information till användaren

Ery-Max 200 mg granulat till oral suspension, dospåse

erytromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ery-Max är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ery-Max
3. Hur du tar Ery-Max
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ery-Max ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ery-Max är och vad det används för

Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.

Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri, vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien samt vid ögoninfektion och lunginflammation hos nyfödda orsakade av Chlamydia-bakterien.

Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner vid överkänslighet för penicillin.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max

Använd inte Ery-Max

- om du/ditt barn är allergisk mot erytromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du/ditt barn visat sig vara överkänslig för makrolider (den grupp av antibiotika som Ery-Max tillhör)
- om du/ditt barn har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvat QT-förlängning) ska Ery-Max inte användas.
- om du/ barnet samtidigt använder läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergi), cisaprid (läkemedel mot störningar i mag-tarmkanalen), disopyramid (läkemedel mot hjärtbesvär), domperidon (läkemedel mot illamående och kräkningar), pimozid (läkemedel vid psykisk sjukdom), ergotamin (läkemedel mot migrän), dihydroergotamin (läkemedel mot lågt blodtryck) eller statiner (läkemedel för kontroll av blodfetter).
- om du/ditt barn samtidigt använder läkemedel som innehåller den aktiva substansen lomitapid (används för att sänka förhöjda blodfetter såsom kolesterol och triglycerider). Intag av detta

läkemedel samtidigt med erytromycin kan leda till en ökning av enzymer som framställs av leverceller (transaminaser), vilket tyder på att levern är stressad och kan leda till leverproblem.

- om du/ ditt barn har onormalt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypomagnesemi eller hypokalemi).
- Om du/ ditt barn eller någon i din familj har en historik av hjärtrytmstörningar (ventrikulär hjärtarytmi eller torsades de pointes) eller en abnormalitet i elektrokardogrammet (elektrisk inspelning av hjärtat) som kallas "långt QT-syndrom".

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ery-Max

- om du/ ditt barn har nedsatt leverfunktion eller myastenia gravis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Ery-Max påbörjas.
- om du/ ditt barn tar andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytm.
- om du/ ditt barn har hjärtproblem.

Om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir irriterat vid matning bör du omedelbart kontakta läkare eftersom detta kan bero på pylorusstenosis, en förträngning i nedre magmunnen.

Andra läkemedel och Ery-Max

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ery-Max, till exempel vissa läkemedel:

- mot hjärtbesvär (kinidin, digoxin)
- mot smärta vid operationer (alfentanil)
- mot Parkinsons sjukdom (bromokriptin)
- mot ångest (buspiron)
- vid transplantation (ciklosporin, takrolimus)
- mot magsår (cimetidin)
- mot allergi (fexofenadin)
- mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)
- mot psykiska sjukdomar (klozapin)
- mot inflammation (metylprednisolon)
- mot erektionsproblem (silfenadil)
- mot astma (teofyllin)
- mot smärta (tramadol)
- mot sömnbesvär (triazolam, zopiklon)
- med lugnande effekt (alprazolam, midazolam)
- antikoagulantia (warfarin, rivaroxaban) används för blodförtunning
- vid behandling av cancer (vinca-alkaloider)
- vid tuberkulos (rifampicin, rifabutin)
- kortikosteroider, som intas via munnen, genom injektion eller inandning (används för att hämma kroppens immunsystem – detta är användbart vid behandling av många olika tillstånd)
- hydroxiklorokin eller klorokin (används för att behandla tillstånd som reumatism (reumatoid artrit) eller för att behandla eller förebygga malaria). Att ta dessa läkemedel samtidigt som erytromycin kan öka risken för att få onormal hjärtrytm och andra allvarliga biverkningar som påverkar ditt hjärta.
- läkemedel mot illamående och kräkningar (domperidon).
- läkemedel mot högt blodtryck (felodipin).

Användningen av naturläkemedel innehållande Johannesört kan påverka behandlingen med Ery-Max.

Ery-Max med mat och dryck

Ery-Max kan tas direkt före eller i samband med måltid.

Graviditet och amning

Det finns risk för fosterskadande effekter. Information från studier om risken för fosterskador ger motstridiga uppgifter, men vissa studier har rapporterat hjärtfel efter användning av Ery-Max under tidig graviditet. Ery-Max ska därför inte användas vid graviditet eller då graviditet planeras annat än på bestämd ordination av läkare.

Erytromycin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ery-Max under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ery-Max har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ery-Max innehåller sackaros och natrium.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Då granulatet innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.

Ery-Max innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dospåse, d.v.s. är näst intill natriumfritt.

3. Hur du tar Ery-Max

Ta alltid Ery-Max enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter barnets kroppsvikt.

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Ery-Max kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bruksanvisning

Påsen klipps upp eller rivs av på ena sidan. Innehållet rörs ut med lite vatten (20-30 ml).

Om du har tagit för stor mängd av Ery-Max

Om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Ery-Max och kontakta omedelbart läkare om du får någon av följande reaktioner:

Röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos), utslag och eventuellt sår i slemhinnor (erythema multiforme). En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom). Stora ytor av huden och slemhinnor som lossnar, följt av feber (toxisk epidermal nekrolys). Dessa biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och sjukhus eller behandlande läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magknip, illamående, diarré och hudutslag.

Mindre vanliga: Nässelutslag.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Förhöjda levervärden, ökning av gallfärgämne (bilirubinstegring), gallstockning i levern (intrahepatisk gallstas), kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) och övergående hörsselförlust.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (förlängt QTc- intervall, syns på EKG), påverkan på hjärtrytmen, livshotande oregelbundna hjärtslag kallad torsades de pointes eller hjärtstopp.

Kontakta omedelbart läkare om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir oroligt i samband med matning eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Ery-Max ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 dospåse innehåller:

- Den aktiva substansen är erytromycin etylsuccinat motsvarande erytromycin 200 mg.
- Övriga innehållsämnen är sackaros (socker) 792 mg, karmellosnatrium, magnesiumaluminiumsilikat, natriumcitrat, smakämne (körsbär).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat till oral suspension, dospåse, dospåsar i ask 20 st

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatri AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

Tillverkare:

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12
37081 Göttingen
Tyskland

Denna bipacksedel godkändes senast 2025-03-18