

Bipacksedel: Information till användaren

Fenoximetylpenicillin EQL 800 mg filmdragerade tabletter Fenoximetylpenicillin EQL 1 g filmdragerade tabletter

fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fenoximetylpenicillin EQL
3. Hur du använder Fenoximetylpenicillin EQL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL är och vad det används för

Den aktiva substansen i Fenoximetylpenicillin EQL, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

Fenoximetylpenicillin EQL används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

Fenoximetylpenicillin som finns i Fenoximetylpenicillin EQL kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Fenoximetylpenicillin EQL

Ta inte Fenoximetylpenicillin EQL

- om du är allergisk mot fenoximetylpenicillin, mot andra penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Fenoximetylpenicillin EQL

- om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel)
- om du har långvarig eller svår diarré

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare omedelbart kontaktas.

Andra läkemedel och Fenoximetylpenicillin EQL

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Fenoximetylpenicillin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

- vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)
- läkemedel mot gikt (probenecid).

Fenoximetylpenicillin EQL med mat och dryck

Fenoximetylpenicillin EQL har bäst effekt om det tas på fastande mage, dvs. minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns inga kända risker vid användning av Fenoximetylpenicillin EQL under graviditet.

Amning

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

3. Hur du tar Fenoximetylpenicillin EQL

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.

Tabletten kan delas i lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Fenoximetylpenicillin EQL

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Fenoximetylpenicillin EQL

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Fenoximetylpenicillin EQL

Även om du känner dig bättre redan efter några dagar, är det viktigt att ta hela behandlingskuren med Fenoximetylpenicillin enligt läkares ordination. I annat fall kan några bakterier överleva, börja växa och orsaka en ny infektion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Illamående
- Lös avföring
- Hudutslag

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- Feber
- Kräkningar
- Stomatit (infektion i munnen)
- Inflammation i tungan
- Problem med matsmältningen
- Ledsmärta
- Nässelutslag (urtikaria)
- Svullnad i hud, röda hudutslag (erythema multiforme eller exfoliativ dermatit). Exfoliativ dermatit är ett allvarligt hudtillstånd (med symtom som hudrodnad och hudfjällning), kontakta läkare eller sjukhus.
- Onormal ökning av antalet eosinofila celler (en typ av vita blodkroppar)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Sluta ta Fenoximetylpenicillin EQL och kontakta läkare.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Förändringar i blodbilden: minskning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) vilket orsakar blodbristliknande symtom såsom trötthet och feber.
- Minskning av leukocyter (leukopeni) vilket ökar tendensen att få infektioner.
- Minskning av blodplättar (trombocytopeni).
- Minskning av vita blodkroppar (agranulocytos) vilket orsakar feber, infektionssymtom som halsont eller urineringsproblem.
- Dessa tillstånd kan vara allvarliga. Kontakta läkare omedelbart om du får feber.
- Positivt resultat på Coombs test (test för hemolytiska syndrom)
- Klåda

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Allvarig diarré (Pseudomembranös kolit)
- Svampöverväxt i munhåla och underliv.

Kontakta läkare om du får långvarig eller svår diarré.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som står på blistret och förpackningen efter Utg.dat eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium 800 mg eller 1 g.
- Övriga innehållsämnen är:
 - Povidon (E1201)
 - Magnesiumstearat (E470b)
 - Hypromellos
 - Titandioxid (E171)
 - Makrogol 400

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: Vita till benvita kapselformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och P/0.8 på samma sida.

1 g: Vita till benvita kapselformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och P/1.0 på samma sida.

Förpackningsstorlekar:

Tabletter 800 mg: Aluminium - OPA/Al/PVC- blister packade i kartonger 20, 30, 40 och 100 tabletter

Tabletter 1 g: Aluminium - OPA/Al/PVC- blister packade i kartonger 20, 30, 40 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Tillverkare

Remedica Ltd

Aharnon Str., Limassol Industrial estate

3056 Limasson

Cypern

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Fenoximetylpenicillin EQL

Island: Fenoximetylpenicillin EQL

Sverige: Fenoximetylpenicillin EQL

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-05