

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Folsyra Evolan 5 mg tabletter folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Folsyra Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Folsyra Evolan
3. Hur du tar Folsyra Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folsyra Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folsyra Evolan är och vad det används för

Folsyra Evolan innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist. Folsyra Evolan ges för att bota eller förebygga folsyrabrist.

2. Vad du behöver veta innan du tar Folsyra Evolan

Ta inte Folsyra Evolan

- om du är överkänslig (allergisk) mot folsyra, eller mot något av övriga innehållsämnen i Folsyra Evolan (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Folsyra Evolan skall inte användas utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B₁₂.

Andra läkemedel och Folsyra Evolan

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller och vissa antibiotika. Din läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Folsyra Evolan påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Folsyra Evolan innehåller laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Folsyra Evolan

Ta alltid Folsyra Evolan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dygnsdos för vuxna vid blodbrist på grund av folsyrabrist är 1 tablett på 5 mg dagligen i två veckor, därefter kan dosen vanligtvis sänkas till 1 tablett på 1 mg dagligen, eventuellt kan högre dos behövas vid kvarstående folsyrabrist. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör en annan produkt väljas vid denna dosering.

Vanlig dos till barn är Vid folsyrabrist hos barn 10-18 år ges 1 tablett på 1 mg per dag. Eftersom det inte finns Folsyra Evolan tabletter med styrkan 1 mg bör annan produkt väljas i dessa fall.

Vid förebyggande behandling före och under graviditet skall Folsyra Evolan tas enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Folsyra Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Folsyra Evolan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Under behandlingen med Folsyra Evolan kan vissa patienter uppleva oönskade reaktioner (biverkningar).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Sällsynta: Klåda, hudutslag, nässelfeber.

Har rapporterats: allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Folsyra Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är 5 mg folsyra per tablett.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulospulver, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Folsyra Evolan är gula till gulorange, prickiga, runda, plankonvexa tabletter med skåra på ena sidan, diameter 7 mm.
Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlek à 100 och 105 tabletter (tryckförpackning) och 1000 tabletter (plastburk).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige

Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L.
145 A Alexandriei street,
Bragadiru, Ilfov,
Rumänien

Denna bipacksedel godkändes senast
2019-10-03