

Bipacksedel: Information till användaren

Folsyra Orifarm 5 mg tabletter

folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Folsyra Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Orifarm
3. Hur du använder Folsyra Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folsyra Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folsyra Orifarm är och vad det används för

Folsyra Orifarm innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyran i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet.

Folsyra Orifarm ges vid folsyrabrist eller vid risk för folsyrabrist.

Folsyra som finns i Folsyra Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Orifarm

Använd inte Folsyra Orifarm:

- om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Folsyra Orifarm:

- Använd inte Folsyra Orifarm utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B₁₂; ett tillstånd som kan medföra skador på nervsystemet.
- Folsyra Orifarm bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folsyra Orifarm.

Andra läkemedel och Folsyra Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingens effekt kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som vissa andra läkemedel.

Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Detta gäller särskilt om du

använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter) och vissa antibiotika.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Folsyra går över i modersmjölken men förväntas inte påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Folsyra Orifarm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Folsyra Orifarm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B₁₂. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen av Folsyra Orifarm är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.

- Vanlig dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett à 5 mg dagligen i två veckor eller tills blodvärdena är normala. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett à 1 mg dagligen.
- Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folsyra Orifarm tas enligt läkares föreskrift.
- Vanlig dos vid folsyrabrist hos barn (10-18 år): 1 tablett à **1 mg** dagligen.

Folsyra Orifarm finns även som 1 mg tablett (se denna separat bipacksedel för mer information).

Om du använt för stor mängd av Folsyra Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Folsyra Orifarm

Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) med hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (har rapporterats hos ett okänt antal användare).

Övriga biverkningar kan förekomma:

Klåda, hudutslag, nässelfeber (har rapporterats hos ett okänt antal användare).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Folsyra Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är folsyra. 1 tablett innehåller 5 mg folsyra.
- Övriga innehållsämnen är: hydroxipropylcellulosa (E 463); kroskarmellosnatrium; cellulosa, mikrokristallin (E 460); kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Gulaktiga till orange runda konvexa tabletter, med diametern 7 mm, märkta med "5" på ena sidan och skårade på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar

Blister: 90 och 100 tabletter.

Plastburk: 100 tabletter och 1000 tabletter (för dosdispensering).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Detta läkemedel finns som tabletter med styrkorna 5 mg och 1 mg.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S
Danmark

Lokal företrädare:
Orifarm Generics AB,
Box 56048
102 17 Stockholm
info@orifarm.com

Tillverkare
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark

eller

Santa S. A.
Str. Panselelor nr. 25, nr. 27, nr. 29
Brasov
cod 500419 jud. Brasov
Rumänien

eller

KeVaRo GROUP Ltd
9 Tzaritza Elenora Str., office 23
Sofia 1618
Bulgarien

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-09-26