

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Fusidinsyra Orifarm 2 % kräm**

fusidinsyra

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Fusidinsyra Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fusidinsyra Orifarm
3. Hur du använder Fusidinsyra Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fusidinsyra Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Fusidinsyra Orifarm är och vad det används för**

Fusidinsyra Orifarm innehåller en typ av antibiotikum som kallas fusidinsyra och som verkar mot bakterier som kan orsaka hudinfektioner.

Du kan använda Fusidinsyra Orifarm på infektioner orsakade av bakterier som är känsliga för fusidinsyra, och då det är lämpligt med lokal behandling.

Fusidinsyra, som finns i Fusidinsyra Orifarm, kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Fusidinsyra Orifarm**

**Använd inte Fusidinsyra Orifarm**

- om du är allergisk mot fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

**Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fusidinsyra Orifarm.

Om du använder Fusidinsyra Orifarm i ansiktet, var försiktig så att du inte får det i ögonen eftersom detta kan orsaka irritation.

**Andra läkemedel och Fusidinsyra Orifarm**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

**Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### Graviditet

Fusidinsyra Orifarm får bara användas under graviditet om läkaren rekommenderar detta.

### Amning

Du kan använda Fusidinsyra Orifarm medan du ammar så länge du inte stryker krämen på dina bröst.

### Fertilitet

Fusidinsyra Orifarm har inga kända effekter på fertiliteten.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Fusidinsyra Orifarm har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

### **Fusidinsyra Orifarm innehåller cetylalkohol, butylerad hydroxianisol och kaliumsorbat**

Cetylalkohol och kaliumsorbat kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Butylhydroxianisol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

## **3. Hur du använder Fusidinsyra Orifarm**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn:

Stryk ut krämen på det drabbade området 2–3 gånger per dag i 1–2 veckor.

### **Om du har använt för stor mängd av Fusidinsyra Orifarm**

Det är inte troligt att överdosering förekommer. Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att använda Fusidinsyra Orifarm**

Om du har glömt att använda Fusidinsyra Orifarm ska du inte ta dubbel dos. Fortsätt med vanlig dosering.

### **Om du slutar att ta Fusidinsyra Orifarm**

Fusidinsyra Orifarm är ett antibiotikum. Det är viktigt att du fortsätter att använda läkemedlet så länge som läkaren har rekommenderat. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Eksem, hudutslag, klåda, hudrodnad, smärta vid behandlingsstället (inklusive brännande eller svidande känsla på huden), irritation vid behandlingsstället.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- Överkänslighet.
- Inflammation i ögat med röda ögon och rinnande ögon (konjunktivit).

- Utslag (nässelutslag) och svullnad: kan vara allvarligt. Tala med din läkare. Det kan vara livshotande om svullnad i ansiktet, läppar eller tunga inträffar. Kontakta sjukvården omedelbart.
- Nässelfeber.
- Blåsor.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Fusidinsyra Orifarm ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarheten för öppnad tub är 4 veckor efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är fusidinsyra. Ett gram innehåller fusidinsyrahemihydrat motsvarande 20 mg fusidinsyra.
- Övriga innehållsämnen är: butylhydroxianisol (E 320), cetylalkohol, glycerol (85 %), flytande paraffin, kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, vitt vaselin, renat vatten, saltsyra.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vit kräm utan särskild doft.

Förpackningsstorlekar om 15 eller 30 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
DK-5260 Odense S  
Danmark

### **Lokal företrädare:**

Orifarm Generics AB,

Box 56048  
102 17 Stockholm  
info@orifarm.com

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:**

Danmark	Fusidinsyre Orifarm
Sverige	Fusidinsyra Orifarm
Finland	Fusidic acid Orifarm

**Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-12-04**