

Bipacksedel: Information till användaren

Golax 10 g pulver till oral lösning i dospåse

makrogol 4000

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Golax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Golax
3. Hur du tar Golax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Golax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Golax är och vad det används för

Golax innehåller den aktiva substansen makrogol 4000 och hör till en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxermedel. Det tillför vatten till avföringen, vilket gör konsistensen lösare och ökar avföringsvolymen. Detta bidrar till att lösa problem med trög mage. Golax går inte ut i blodomloppet och bryts inte ned i kroppen.

Golax används för behandling av förstoppning hos vuxna och barn från 8 års ålder.

Detta läkemedel är ett pulver som du löser upp i 50 ml vatten och sedan dricker. Det verkar gradvis inom 1–2 dygn.

Behandling av förstoppning med läkemedel ska bara vara ett komplement till en hälsosam livsstil och kost.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

Makrogol 4000 som finns i Golax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekseller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Golax

Ta inte Golax om du är allergisk mot makrogol (polyetylenglykol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har en svår tarmsjukdom som exempelvis
 - inflammatorisk tarmsjukdom (som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) eller onormal utvidgning av tarmen
 - tarmperforation (hål i tarmväggen) eller risk för tarmperforation
 - ileus (tarmstopp) eller misstanke om tarmobstruktion (stopp eller hinder i tarmen)

- smärtsamma magåkommor utan fastställd orsak.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar läkemedlet.

Varningar och försiktighet

Fall av allergiska reaktioner med hudutslag och svullnad av ansiktet eller halsen (angioödem) har rapporterats hos vuxna efter att de tagit läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol). Enstaka allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats, med svimning, kollaps eller andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla. Om du får något av dessa symtom ska du sluta att ta Golax och omedelbart kontakta sjukvården.

Eftersom detta läkemedel ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du

- har nedsatt lever- eller njurfunktion
- tar urindrivande läkemedel (vätskedrivande) eller är äldre, eftersom du kan löpa risk för låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

Andra läkemedel och Golax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet Golax innehåller bensylalkohol.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Makrogol påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Golax innehåller natrium, maltodextrin och bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Golax innehåller 120 mg maltodextrin (som innehåller glukos) per dospåse.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Läkemedlet kan skada tänderna. Golax innehåller 0,030 mg bensylalkohol per dospåse.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Läkemedlet ska inte användas under mer än en vecka till små barn (under 3 års ålder) såvida inte läkare eller apotekspersonal har rekommenderat det. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidosis). Använd med försiktighet och endast om det är nödvändigt, särskilt hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion samt hos gravida eller ammande kvinnor.

3. Hur du tar Golax

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 8 års ålder

- Den rekommenderade dosen är en till två dospåsar dagligen. Ta helst dosen som en enkeldos på morgonen.
- Börja med att ta en dospåse varje dag och öka vid behov till två dospåsar varje dag.
- Den dagliga dosen kan justeras efter den effekt du får. Det kan vara allt från en dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till högst två dospåsar per dag.
- Lös upp innehållet i dospåsen i 50 ml vatten omedelbart före användning och drick vätskan.

Obs!

- Det brukar ta 1–2 dygn innan Golax får effekt.
- Fortsätt med en hälsosam livsstil och kost för att bibehålla förbättringen av hur ofta du bajsar efter behandlingen med Golax.

- Tala med apotekspersonal eller läkare om symtomen blir sämre eller inte blir bättre efter 14 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Golax

Om du tar för stor mängd av makrogol kan du få diarré, ont i magen eller kräkas. Diarrén brukar gå över när behandlingen avbryts eller dosen minskas.

Om du har svår diarré eller kräks mycket ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att inte förlora salter (elektrolyter) på grund av vätskeförlust.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Golax

Ta nästa dos så snart du kommer ihåg.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna brukar vara lindriga och övergående. Dessa kan vara:

Hos barn:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

- Ont i magen
- Diarré, som också kan orsaka ömmande smärta runt ändtarmsöppningen

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

- Illamående eller kräkningar
- Ont i magen

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) (hudutslag, nässelutslag, svullnad av ansiktet eller svalget, andningssvårigheter, svimning eller kollaps)

Hos vuxna:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

- Ont i magen
- Uppsvälld mage
- Illamående
- Diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

- Kräkningar
- Trängande behov av att bajsas
- Avföringsinkontinens

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Låga kaliumhalter i blodet (kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm)
- Låga natriumhalter i blodet (kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall och koma)
- Uttorkning orsakad av svår diarré, särskilt hos äldre
- Symtom på allergisk reaktion, som hudrodnad, hudutslag, nässelutslag, svullnad av ansiktet eller halsen, andningssvårigheter, svimning eller kollaps

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Golax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om lösningen visar synliga tecken på försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

- Den aktiva substansen är makrogol 4000.
Varje dospåse innehåller 10 g makrogol 4000.
- Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium (E-954) och apelsinarom (innehåller maltodextrin och bensylalkohol).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Golax är vitt eller nästan vitt och fast med ett vaxliknande eller paraffinliknande utseende. Golax säljs i förpackningsstorlekar på 10, 20, 30, 40, 50, 60 respektive 100 dospåsar för beredning av oral lösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Strides Pharma (Cypern) Limited

Themistokli Dervi, 3

Julia House, 1st Floor

Nicosia 1066

Cypern

Tillverkare

Fairmed Healthcare GmbH,

Maria-Goeppert-Straße 3,

23562 Lübeck,

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt i EES:s medlemsländer under följande namn:

Land	Läkemedlets namn

Danmark	Macrogol 4000 STRIDES 10 g, Pulver til oral opløsning i en pose
Österrike	Macrogol 4000 STRIDES 10 g, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Frankrike	Macrogol 4000 STRIDES 10 g, Poudre pour solution buvable en sachet
Nederländerna	Macrogol Strides 10 g, poeder voor drank in sachet
Sverige	Golax 10 g, pulver till oral lösning i dospåse

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-11-07.