

Bipacksedel: Information till användaren

Herpzyl 50 mg/g kutant stift

aciclovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Herpzyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Herpzyl
3. Hur du använder Herpzyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Herpzyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Herpzyl är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i detta läkemedel är aciclovir, vilket tillhör gruppen antivirala medel.

Herpzyl används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Viruset orsakar blåsor eller sår, framför allt på läpparna, men också i andra delar av ansiktet. Virusinfektionen kan bryta ut när kroppens immunförsvar är försämrat, t ex vid förkylning eller annan infektion. Stark sol, stress eller menstruation kan också framkalla symtomen. Aciclovir hämmar virusets förmåga att föröka sig vilket gör att infektionen avstannar och går tillbaka.

Aciclovir som finns i Herpzyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du använder Herpzyl

Använd inte Herpzyl:

- om du är allergisk mot aciclovir, valaciclovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Herpzyl.

- om du har mycket ökad infektionskänslighet t ex på grund av att du har AIDS eller har genomgått benmärgstransplantation, bör du endast använda Herpzyl på läkares rekommendation.

Herpzyl är endast avsedd att användas på huden på läppar eller i ansiktet. Använd inte krämen mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes. Undvik att få stiftet i munnen, i ögonen och på andra slemhinnor, då det kan ge irritation.

Barn

Herpzyl ska ej användas till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Herpzyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Rådfråga läkare innan du använder Herpzyl om du är gravid.

Amning

Vid lokal användning av Herpzyl tas mycket lite aciklovir upp i kroppen. Herpzyl påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Herpzyl innehåller butylhydroxitoluen

Butylhydroxitoluen kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

3. Hur du använder Herpzyl

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen ska påbörjas så snart de första tecknen på munsår uppkommer. Infektionen brukar ge sig till känna genom att det sticker, svider eller kliar. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Innan du applicerar stiftet kan du värma det, t ex i handen eller i fickan. Då blir stiftet mjukare och lättare att applicera. Stiftet stryks på munsåret 5 gånger dagligen ungefär var fjärde timme under den vakna delen av dygnet. För att få tillräcklig mängd av det aktiva innehållsämnet aciklovir, ska stiftet vid varje tillfälle strykas 5 gånger över hela munsåret, inklusive kanterna.

Applicera inte stiftet direkt före måltid, eftersom det då lätt kan slickas av.

För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller till ögonen, bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det. Stiftet ska endast användas av en och samma person, och inte delas med andra. Stiftet kan användas vid nästkommande munsårsutbrott, så länge det inträffar före utgångsdatum.

Om du använt för stor mängd av Herpzyll

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd stift på flera ställen på huden, eller om du har svalt en mindre mängd stift efter applicering.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Herpzyll och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Övriga biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): En brännande, stickande känsla på applikationsstället, en mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudrodnad (erytem). Kontakteksem (kontaktdermatit) på applikationsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Herpzyll ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kutant stift innehåller 50 mg aciklovir.

- Övriga innehållsämnen är ricinolja, hårdfett, karnaubavax, vitt vaselin, vitt vax, oktyldodekanol, butylhydroxitoluen, vaniljarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Herpazol är ett vitt till svagt gult, runt stift.

Förpackning med stiftbehållare med lock och skruvanordning. Behållaren innehåller 3 g kutant stift.

Förpackningsstorlekar: 3 g och 2 x 3 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl

Via Vicenza 67

36015 Schio (Vicenza)

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-01-02