

Bipacksedel: Information till användaren

Iberoherb, orala droppar, lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Iberoherb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Iberoherb
3. Hur du använder Iberoherb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Iberoherb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Iberoherb är och vad det används för

Iberoherb är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid funktionell dyspepsi med huvudsymtom som magsmärtor, brännande känsla i övre delen av maggropen, fylldskänsla efter måltid och tidig mättnadskänsla, men ofta även nedsatt aptit, bevarande rapningar och halsbränna.

Iberoherb är avsedd för vuxna över 18 år.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre, eller om du mår sämre, efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Iberoherb

Du bör endast använda Iberoherb efter att din läkare har talat om för dig att du har funktionell dyspepsi

Använd inte Iberoherb

- Om du är allergisk mot de aktiva substanserna (blomsteriberis, kamomillblomma, kumminfrö, citronmelissblad, pepparmyntblad eller lakritsrot) eller mot andra flockblommiga eller korgblommiga växter.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare om något av följande inträffar, även om du vet att du har funktionell dyspepsi:

- Du är över 40 år och det är en längre tid sedan du hade din sista känning av funktionell dyspepsi, eller om symtomen är annorlunda den här gången.
- Om du nyligen har haft blod i avföringen.
- Om du har tappat aptiten eller gått ner i vikt.

Om dina symtom kvarstår efter 7 dagar, om de blir värre eller om nya besvär uppkommer, kontakta läkare eller apotekspersonal för att utesluta andra allvarliga sjukdomar.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

Andra läkemedel och Iberoherb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det finns inga kända läkemedelsinteraktioner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns ingen eller begränsad mängd data från användning av Iberoherb av gravida kvinnor. Som en säkerhetsåtgärd bör användning av Iberoherb undvikas under graviditet.

Det finns inte tillräckligt med information om de aktiva substanserna/metaboliterna i Iberoherb utsöndras i bröstmjolk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Rådfråga läkare innan användning.

Körförmåga och användning av maskiner

Iberoherb har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Iberoherb innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller 240 mg alkohol (etanol) i 20 droppar. Mängden i en dos (20 droppar/ 1 ml) av detta läkemedel motsvarar mindre än 7 ml öl eller 3 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

3. Hur du använder Iberoherb

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna över 18 år:

20 droppar 3 gånger dagligen.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion:

Det finns otillräckliga data för specifika dosrekommendationer vid nedsatt njur- eller leverfunktion.

Administreringssätt


Intas i lite vätska före eller tillsammans med måltid.

Ska sväljas.

Omskakas före användning!

Håll droppflaskan i 45° vinkel vid dispensering. Stäng flaskan ordentligt med den lila korken efter användning.

Instruktioner vid första användningen



1 Ta av korken, skruva därefter av den vita delen och kasta den.

2 Skruva fast den lila korken ordentligt på flaskan för att sätta på droppinsatsen.

3 Ta av korken och säkerställ att droppinsatsen sitter ordentligt.

Behandlingslängd

Om symtom kvarstår under användning av läkemedlet ska läkare eller apotekspersonal konsulteras (läs också varningarna i avsnitt 2 Vad du behöver veta innan du tar Iberoherb).

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

Om du har tagit stor mängd av Iberoherb

Om du av misstag har tagit några fler droppar än rekommenderat bör det inte ha någon negativ effekt. Om du fått i dig mycket mer läkemedel än rekommenderat, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Iberoherb

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner kan uppkomma med symtom som andningsbesvär eller hudreaktioner som klåda eller utslag. Baserat på tillgängliga data är frekvensen okänd (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Iberoherb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Detta läkemedel kan användas i högst 8 veckor efter att flaskan har öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

0,15 ml flytande extrakt av *Iberis amara* L (blomsteriberis) planta tota, extraktionsmedel: etanol 50 % V/V, motsvarande 58–97 mg hel färsk växt av blomsteriberis

0,30 ml flytande extrakt av *Matricaria recutita* L (kamomill), flos, extraktionsmedel: etanol 30 % V/V, motsvarande 74–149 mg torkad kamomillblomma

0,20 ml flytande extrakt av *Carum carvi* L. (kummin) fructus, extraktionsmedel: etanol 30 % V/V, motsvarande 56–78 mg torkat kumminfrö

0,15 ml flytande extrakt av *Melissa officinalis* L. (citronmeliss), folium, extraktionsmedel: etanol 30 % V/V, motsvarande 42–59 mg torkade blad av citronmeliss

0,10 ml flytande extrakt av *Mentha × piperita* L (pepparmynta), folium, extraktionsmedel: etanol 30 % V/V, motsvarande 28–40 mg torkade blad av pepparmynta

0,10 ml flytande extrakt av *Glycyrrhiza glabra* L (lakritsrot), radix, extraktionsmedel: etanol 30 % V/V, motsvarande 28–40 mg torkad lakritsrot.

Totalt etanolinnehåll 31 % V/V

1 ml = 20 droppar

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Iberoherb är mörkbrun, klar till lätt grumlig vätska i en bärnstensfärgad glasflaska med förslutningssystem som inkluderar en droppinsats och ett skruvlock.

Förpackningsstorlekar: 20 ml, 50 ml eller 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna

Tillverkare:

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraße 5

64295 Darmstadt

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien: Iberogast Balance oral drops, liquids
Estland: Iberoherb
Kroatien: Iberoheksa oralne kapi, tekućina
Lettland: Ej fastställt
Litauen: Väntar på godkännande: Iberoherb geriamasis skystis
Norge: Iberoherb
Polen: Iberogast Balance
Rumänien: Iberogast Confort picături orale, soluție
Slovakien: Väntar på godkännande: Iberogast NEO
Slovenien: Väntar på godkännande: Iberoheksa peroralne kapljice, raztopina
Sverige: Iberoherb
Ungern: Iberogast Select belsőleges oldatos cseppek
Österrike: Iberogast BALANCE Tropfen zum Einnehmen

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-02-02.