Bipacksedel: Information till användaren

Influvac injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Influensavaccin (ytantigen, inaktiverat)
Säsong 2026/2027

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig och ditt barn.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta vaccin har ordinerats åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra.
- Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Influvac är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Influvac
3. Hur du får Influvac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Influvac ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Influvac är och vad det används för

Influvac är ett vaccin för vuxna och barn som är 6 månader och äldre. Vaccinet hjälper dig att skydda dig eller ditt barn mot influensa. Användningen av Influvac bör baseras på officiella rekommendationer.

När en person får vaccinet Influvac kommer immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) att tillverka sitt eget skydd (antikroppar) mot sjukdomen. Inget av innehållsämnena i vaccinet kan orsaka influensa.

Influensa är en sjukdom som kan spridas snabbt och orsakas av olika stammar som kan ändras varje år. Detta är skälet till varför du eller ditt barn kanske måste vaccineras varje år. Den största risken för att få influensa är under de kalla månaderna mellan oktober och mars. Om du eller ditt barn inte har vaccinerats under hösten så finns det ändå anledning att vaccinera dig eller ditt barn fram till våren eftersom det finns risk att smittas av influensa fram till dess.
Din läkare kan rekommendera när det är bäst att vaccineras.

Influvac skyddar dig eller ditt barn mot de tre virusstammar som ingår i vaccinet från ca 2 till 3 veckor efter injektionen.

Det kan ta ett par dagar från smittotillfälle till att bli sjuk så om du eller ditt barn blivit exponerade för influensa direkt före eller efter din vaccination kan du eller ditt barn fortfarande insjukna.

Vaccinet skyddar inte dig eller ditt barn mot vanlig förkylning, även om symptomen liknar influensa.

2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Influvac

För att säkerställa att Influvac är lämplig för dig eller ditt barn är det viktigt att berätta för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om någon av nedanstående punkter gäller för dig eller ditt barn. Om det är någonting du inte förstår, be din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att förklara.

Använd inte Influvac
– Om du eller ditt barn är allergisk (överkänslig) mot:
- de aktiva substanserna eller
- något av innehållsämnena i Influvac (se avsnitt 6) eller
- någon beståndsdel som kan finnas i ytterst liten mängd som ägg (ovalbumin eller kycklingproteiner), formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin (ett antibiotikum som används vid behandling av bakteriella infektioner).

Varningar och försiktighet
Du bör berätta för din läkare före vaccination om du eller ditt barn:
– har ett dåligt immunförsvar (nedsatt immunförsvar eller tar läkemedel som påverkar immunsystemet)
– har ett blödningsproblem eller lätt får blåmärken.

Din läkare avgör om du eller ditt barn bör vaccineras.

Om du eller ditt barn har en sjukdom med hög feber eller akut infektion, ska vaccinationen skjutas upp till efter det att du eller ditt barn har återhämtat sig.

Svimning, svaghetskänsla eller andra stressrelaterade reaktioner kan inträffa som svar på en nålinjektion. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du tidigare har fått denna typ av reaktion.

Om du eller ditt barn av någon anledning tar ett blodprov inom några dagar efter en influensavaccination, meddela läkare. Detta beror på att falskt positiva resultat har observerats hos ett fåtal patienter som nyligen blivit vaccinerade.

Som med alla vacciner, ger Influvac eventuellt inte fullständigt skydd till alla personer som vaccinerats.

Andra läkemedel och Influvac
- Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra vacciner eller läkemedel, även receptfria sådana.
- Influvac kan ges vid samma tillfälle som andra vacciner, men i en annan extremitet (arm eller ben). Observera att biverkningarna kan bli kraftigare.
- Immunreaktionen kan minska vid immunosuppressiv behandling, såsom kortikosteroider, cytostatika eller strålbehandling.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

Influensavacciner kan användas under graviditetens alla stadier. Det finns större mängd säkerhetsdata tillgängliga från andra och tredje trimestern av graviditeten jämfört med första trimestern. Data från influensavaccinering i hela världen tyder inte på att vaccinet har skadliga effekter på graviditeten eller barnet.

Influvac kan användas under amning.

Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kan avgöra om du bör få Influvac.
Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Influvac har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Influvac innehåller natrium och kalium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
Detta läkemedel innehåller kalium, mindre än 1 mmol (39 mg) per dos, dvs. är näst intill ”kaliumfritt”.

3. Hur du får Influvac

Dosering
Vuxna får en dos på 0,5 ml.

Användning för barn och ungdomar
Barn 6 månader till 17 år får en dos på 0,5 ml.

Barn under 9 års ålder som inte tidigare har vaccinerats mot säsongsinfluensa bör ges ytterligare en dos när det har gått minst 4 veckor.
Säkerhet och effekt för Influvac för spädbarn under 6 månader har inte fastställts.

Hur Influvac ges
Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge den rekommenderade dosen av vaccinet som en injektion i en muskel eller djupt under huden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Influvac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Uppsök omedelbart läkare om du eller ditt barn upplever någon av följande biverkningar - du eller ditt barn kan behöva akut medicinsk vård:

Allvarliga allergiska reaktioner (förekommer hos okänt antal personer, har inträffat i enstaka fall under normal användning av Influvac):
- som kan leda till ett akut tillstånd med lågt blodtryck, snabb, ytlig andning, snabb hjärtrytm och svag puls, kall, fuktig hud, yrsel, som kan leda till kollaps (chock)
- svullnad mest tydligt i huvud-halsregionen, inklusive ansikte, läppar, tunga, strupe eller någon annan del av kroppen och som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem).

Under kliniska prövningar med Influvac och/eller det fyrvalenta influensavaccinet Influvac Tetra, har följande biverkningar observerats. Deras frekvenser har beräknats som:

- Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)
- Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)
- Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

- Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Biverkningar	**Vuxna och äldre**	**Barn**		
	18 år och äldre	**6 till 35 månader**	**3 till 5 år**	**6 till 17 år**
Huvudvärk	Mycket vanlig*	-	-	Mycket vanlig
Dåsighet	-	Mycket vanlig	Mycket vanlig	-
Svettningar	Vanlig	Mycket vanlig	Vanlig	Vanlig
Nedsatt aptit	-	Mycket vanlig	Mycket vanlig	-
Illamående	-	-	-	Mycket vanlig
Magsmärtor	-	-	-	Mycket vanlig
Diarré	-	Mycket vanlig	Vanlig	Mycket vanlig
Kräkningar	-	Mycket vanlig	Vanlig	Mycket vanlig
Irritabilitet/kinkighet	-	Mycket vanlig	Mycket vanlig	-
Muskelsmärta (myalgi)	Vanlig	-	-	Mycket vanlig
Ledvärk (artralgi)	Vanlig	-	-	Vanlig
Trötthet (fatigue)	Mycket vanlig	-	-	Mycket vanlig
Feber	Mindre vanlig	Mycket vanlig	Vanlig	Vanlig
Allmän sjukdomskänsla	Vanlig	-	-	Mycket vanlig
Frossa	Vanlig	-	-	Vanlig
Smärta vid injektionsstället	Mycket vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig
Rodnad vid injektionsstället	Vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig
Svullnad vid injektionsstället	Vanlig	Vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig
Förhårdnad vid injektionsstället (induration)	Vanlig	Vanlig	Mycket vanlig	Mycket vanlig
Blåmärke vid injektionsstället (ekkymos)	Vanlig	Vanlig	Vanlig	Vanlig
Alla åldersgrupper: Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)	Hudreaktioner som kan spridas över hela kroppen inklusive klåda (pruritus, urtikaria), utslag			
	Kärlinflammation som kan leda till hudutslag (vaskulit) och i mycket sällsynta fall till övergående njurpåverkan.			
	Nervsmärta (neuralgi), onormala känselförnimmelser vid beröring, smärta, värme och kyla (parestesi), anfall (kramper) i samband med feber, neurologiska störningar som kan leda till stel nacke, förvirring, domningar, smärta och svaghet i armar och ben, försämrad balans, försämrade reflexer, förlamning i delar av eller hela kroppen (encefalomyelit, neurit, Guillain-Barrés syndrom).			
	Tillfällig minskning av en sorts blodceller som kallas blodplättar, ett lågt antal av dessa kan leda till blåmärken eller blödningar (övergående trombocytopeni), tillfällig svullnad av körtlar i hals, armhåla eller ljumske (övergående lymfadenopati).			
* Rapporterat som vanlig biverkning hos äldre vuxna (från och med 61 år och uppåt)				

I alla åldersgrupper inträffade de flesta reaktionerna som nämnts ovan vanligen under de första 3 dagarna efter vaccinationen och gick tillbaka av sig själva efter 1 till 3 dagar. Reaktionerna var i allmänhet lindriga.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Influvac ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.
Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är:
Ytantigener (hemagglutinin och neuroaminidas) från influensavirus av följande stammar*:

- A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-liknande stam (A/Missouri/11/2025, IVR-279)	15 mikrogram HA **
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-liknande stam (A/Michigan/105/2025, SAN-049A)	15 mikrogram HA **
- B/Tokyo/EIS13-175/2025-liknande stam (B/Tokyo/EIS13-175/2025, vildtyp)	15 mikrogram HA ** per 0,5 ml dos

* odlade i befruktade hönsägg från friska hönsflockar
** hemagglutinin

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EU-rekommendation för säsongen 2026/2027.

Övriga innehållsämnen är: kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och vatten för injektion.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Influvac är en suspension för injektion som tillhandahålls i förfylld glasspruta (med eller utan nål), med en kolvpropp av bromobutylgummi, innehållande 0,5 ml färglös klar injektionsvätska. Varje spruta kan bara användas en gång.

Förpackningar om 1 eller 10 st.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning:
Viatris AB
Box 23033
104 35 Stockholm

Tillverkare:
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast: 2026-08-12

Följande information är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal:

Som för alla injicerbara vacciner, bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.

Vaccinet bör uppnå rumstemperatur före användning.
Omskakas före användning.
Inspektera visuellt innan användning.
Använd inte vaccinet om färgen har ändrats eller främmande partiklar förekommer i suspensionen.

Blanda inte olika läkemedel i samma spruta.
Influvac får inte injiceras direkt in i ett blodkärl.

Rekommenderade ställen för intramuskulär injektion hos barn mellan 6 till 35 månaders ålder är lårets anterolaterala del (eller deltoidmuskeln om muskelmassan är tillräcklig), eller deltoidmuskeln för barn från 36 månaders ålder och vuxna.

Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Se även avsnitt 3: Hur du får Influvac