

Bipacksedel: Information till användaren

Kloramfenikol Pharmathen 5 mg/ml ögondroppar, lösning

kloramfenikol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Kloramfenikol Pharmathen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol Pharmathen
3. Hur du använder Kloramfenikol Pharmathen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kloramfenikol Pharmathen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kloramfenikol Pharmathen är och vad det används för

Kloramfenikol Pharmathen innehåller ett läkemedel som kallas kloramfenikol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika. Det används för att behandla infektioner i ögonen.

Ibland kan delar av den yttre ytan av ögat, såsom hornhinnan (den genomskinliga hinnan som täcker ögats yta) eller bindehinnan (slemhinnan på insidan av ögonlocket och en del av ögat) bli infekterade av bakterier. Dessa ögondroppar kan användas för att behandla denna infektion och är effektiva mot många olika bakterietyper.

Om ögoninfektionen är mycket svår kan läkaren ge dig antibiotika i tablettform och detta antibiotikum som ögondroppar.

Detta läkemedel är avsett för både barn, vuxna och äldre.

Kloramfenikol Pharmathen ögondroppar, lösning är en steril lösning som inte innehåller konserveringsmedel.

Kloramfenikol som finns i Kloramfenikol Pharmathen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol Pharmathen

Använd inte Kloramfenikol Pharmathen

- om du är allergisk mot kloramfenikol eller mot något av de övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kloramfenikol Pharmathen.

Om du använder dessa ögondroppar under en längre tid kan de bli mindre effektiva eller ge upphov till allergiska reaktioner. Sluta använda detta läkemedel så snart läkaren säger till dig för att förhindra detta.

Om du har en tidigare kontakt överkänslighet mot silver, ska du inte använda den här produkten.

Barn och ungdomar

Kloramfenikol Pharmathen kan användas av barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Kloramfenikol Pharmathen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar, tala om det för läkaren eller ögonspecialisten. Han/hon kan besluta att använda dessa droppar eller ordinera ett annat alternativ. Dropparna bör inte användas under graviditet och amning om inte läkaren anser det nödvändigt.

Kontaktlinser

Kontaktlinser bör inte användas i ett infekterat öga. Läkaren kommer att be dig ta bort dina kontaktlinser före ögondropparna appliceras.

Använd inte kontaktlinser under hela behandlingstiden.

Körförmåga och användning av maskiner

Som med alla ögondroppar kan övergående dimsyn förekomma efter applicering av dropparna. Vänta tills din syn blir klar innan du kör eller använder maskinen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kloramfenikol Pharmathen innehåller bor

Detta läkemedel bör inte ges till ett barn yngre än 2 år utan medicinsk rådgivning, eftersom det innehåller bor och kan försämra fertiliteten i framtiden.

3. Hur du använder Kloramfenikol Pharmathen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd inte denna produkt längre än den tid som anges av läkaren eller ögonspecialisten eftersom den kan bli mindre effektiv för behandlingen av din ögoninfektion.

Dos

Den rekommenderade dosen är 1 till 2 droppar i varje infekterat öga upp till sex gånger om dagen. Du bör fortsätta behandlingen i 2 dagar efter det att symptomen försvunnit för att förhindra att infektionen återkommer. Den maximala rekommenderade behandlingstiden är 14 dagar.

Om dina ögon blir sämre eller inte blir bättre efter några dagars användning av dessa droppar, kontakta läkare eller ögonspecialist eller apotekspersonal.

Användning hos barn

För nyfödda kan dosen behöva justeras, eftersom de på grund av sin outvecklade ämnesomsättning kan löpa risk för dosrelaterade biverkningar.

Den maximala behandlingstiden är 10-14 dagar.

Tillåt inte att spetsen för flerdosbehållaren vidrör ögat eller områden runt ögat. Det kan orsaka skada på ditt öga. Ögondroppslösningen kan bli kontaminerad (förorenad) med bakterier som kan orsaka ögoninfektioner som leder till allvarlig ögonskada, till och med synförlust.

För att undvika kontaminering av flerdosbehållaren skall flerdosbehållarens spets hållas borta från alla ytor.


Bruksanvisning

Innan ögondropparna appliceras:

- Tvätta dina händer innan du öppnar flaskan.
- Använd inte detta läkemedel om du märker att garantiförseglingen på flaskhalsen är bruten innan du börjar använda den för första gången.
- Vid användning för första gången, och innan du droppar en droppe i ögat, bör du först av allt öva dig i att använda droppflaskan genom att klämma den långsamt för att leverera en droppe i luften, bort från ögat.
- När du är säker på att du kan leverera en droppe i taget, välj den position som känns bekvämast för applicering av dropparna (du kan sitta, ligga på rygg eller stå framför en spegel).

Applicering:


1. Håll flaskan direkt under locket och vrid locket för att öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att lösningen inte kontamineras.



2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

3. Dra det undre ögonlocket nedåt och rikta blicken uppåt. Kläm försiktigt på mitten av flaskan och låt en droppe falla i ögat. Observera att det kan finnas ett par sekunders fördröjning mellan det att du klämmer på flaskan och droppen faller i ögat. Kläm inte för hårt.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker på hur du ska applicera ditt läkemedel.



4. Blinka några gånger så att droppen sprids över ögat.




5. Efter att ha använt Kloramfenikol Pharmathen tryck med ett finger i den inre ögonvrån vid näsan i 2 minuter. På så sätt undviker du att lösningen tas upp i resten av din kropp.



6. Upprepa anvisning 2-5 för att applicera en droppe även i det andra ögat om läkaren har anvisat dig att göra så. Ibland behöver endast det ena ögat behandlas och läkaren talar om för dig om detta gäller dig och vilket öga som behöver behandlas.

7. Efter varje användning och innan locket sätts på bör flaskan skakas en gång en nedåtgående rörelse utan att droppspetsen vidrörs för att avlägsna eventuell kvarvarande vätska på spetsen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att efterföljande droppar levereras.



8. När du har använt alla doser blir det lite Kloramfenikol Pharmathen kvar i flaskan. Du behöver inte vara bekymrad eftersom en extra mängd Kloramfenikol Pharmathen har lagts till och du kommer att få hela mängden Kloramfenikol Pharmathen som läkaren har ordinerat. Försök inte använda överskottet läkemedel som finns kvar i flaskan efter att du har fullföljt behandlingen. Använd inte ögondropparna mer än i 28 dagar efter att flaskan öppnats.

Om du använt för stor mängd av Kloramfenikol Pharmathen

En överdos är mycket osannolik. Om du plötsligt känner dig dålig efter att ha tagit dropparna, tala omedelbart med läkare, ögonspecialist eller kontakta närmaste akutmottagning.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Kloramfenikol Pharmathen

Om du glömmet en dos, ta dina droppar så fort du kommer ihåg och fortsätt sedan som förut.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

- Kloramfenikol Pharmathen kan orsaka en brännande känsla, sveda, klåda och hudirritation (inklusive dermatit) runt området som det använts på. Dessa effekter är övergående.
- Svullnad i ansikte, läppar, tunga och / eller hals som kan orsaka andningssvårigheter och / eller sväljning (angioödem) kan uppstå. Om detta händer, kontakta genast läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Kloramfenikol Pharmathen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter första öppnandet kan produkten förvaras i högst 28 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kloramfenikol. Varje flerdosbehållare innehåller cirka 10 ml ögondroppar, lösning med kloramfenikol 5 mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är borax, borsyra, natriumhydroxid eller/och saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 ml Kloramphenicol Pharmathen ögondroppar löses i en vit, ogenomskinlig 11 ml LDPE-flaska och vit Novelia-munstycke (HDPE och silikon) med en vit HDPE-lock.

Varje kartong innehåller 1 flerdosbehållare.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pharmathen S.A.
6, Dervenakion Str.,
Pallini 153 51, Attiki
Grekland

Tillverkare

EXCELVISION
27 st. La Lombardière,
ZI La Lombardière,
ANNONAY 07100 Cedex
Frankrike

och

Pharmathen S.A.
6, Dervenakion Str.,
Pallini 153 51, Attiki
Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast:
2022-06-16