

Bipacksedel: Information till användaren

Klorhexidin Fresenius Kabi 2 mg/ml, kutan lösning

klorhexidindiacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för

Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

Klorhexidin Fresenius Kabi används

- före och efter operation i munhålan
- vid tillfälliga munhåleinfektioner hos protesbärare
- för tillfällig bakterie- och plackkontroll vid extrem kariesbildning, olycksfall eller sjukdom
- för desinfektion av slemhinnor efter ordination av läkare
- för desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t.ex. pungen och mellangården.

2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi

- om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),
- i örat,
- i leder eller senskidor,
- i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi.

På grund av risken för synskada får Klorhexidin Fresenius Kabi inte komma i kontakt med ögonen. Om läkemedlet kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart och grundligt med vatten. Vid irritation, röda ögon, smärta i ögat/ögonen eller synstörningar, rådfråga läkare omedelbart.

Allvarliga fall av kvarstående hornhinneskada (skada på ögats yta) som kan kräva hornhinnetransplantation har rapporterats när liknande produkter oavsiktligt har kommit i kontakt med ögonen under kirurgiska ingrepp på patienter under narkos (djup smärtfri sömn).

Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

Barn

Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning av Klorhexidin Fresenius Kabi på gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Klorhexidin Fresenius Kabi har inga kända effekter på förmågan att köra eller använda maskiner.

3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Före och efter operation i munhålan:

Munnen sköljs 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid kirurgi i munhålan sköljs munnen under 5 dagar före och 5 dagar efter operation. Vid operativ behandling av tandlossning sköljes munnen under 1-3 veckor efter operation. Annan användning enligt läkares föreskrift.

Effekten reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

Undvik kontakt med ögonen. Om lösningen kommer i kontakt i ögonen, skölj omedelbart och grundligt med vatten, se även avsnitt ”Varningar och försiktighet”.

Om du har fått i dig läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Brun missfärgning av tunga och tänder, vilket försvinner efter avslutad behandling, hudirritation.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergisk reaktion (överkänslighet) med bland annat klåda, hudreaktioner och andnöd, förändringar i smakupplevelsen.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Kemiska brännskador hos nyfödda. Skador på hornhinnan (skada på ögats yta) och permanenta ögonskador inklusive permanent synnedsättning (till följd av att läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med ögonen under kirurgiska ingrepp i huvud, ansikte och nacke) hos patienter under narkos (djup smärtlös sömn).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat
- Övriga innehållsämnen är natriumacetat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastflaska: 250 ml, 1000 ml

Mikrospol (engångsförpackning): 20x30ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare:

HP Halden Pharma AS

Svinesundsveien 80

1788 Halden, Norge

Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-07-11.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

För desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning och operation. Förebyggande av infektioner hos nyfödda orsakade av grupp B streptokocker. Desinfektion av livmodermunnen i samband med insättning av spiral och endometriebiopsi. Desinfektion av uretramynningen och angränsande slemhinnor före insättande av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna.

Huddesinfektion: Desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t.ex. scrotum och perinealområdet.

Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi i leder, på senor, hjärnan eller hjärnhinnan.

Barn

Används med försiktighet hos nyfödda, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste torka helt innan ocklusivförband läggs.

Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.