

Bipacksedel: Information till patienten

Kodein ExtractumPharma 10 mg tabletter
Kodein ExtractumPharma 15 mg tabletter
Kodein ExtractumPharma 20 mg tabletter
Kodein ExtractumPharma 30 mg tabletter

Kodeinfosfathemihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kodein ExtractumPharma tabletter är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kodein ExtractumPharma
3. Hur du tar Kodein ExtractumPharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kodein ExtractumPharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kodein ExtractumPharma är och vad det används för

Kodein ExtractumPharma kan användas hos vuxna och barn från 12 år, för kortvarig lindring av måttlig smärta som inte lindras av enbart andra smärtstillande läkemedel såsom paracetamol eller ibuprofen.

Kodein ExtractumPharma kan också användas till vuxna och barn från 12 år för symtomatisk lindring av torrhosta.

Kodein ExtractumPharma kan även användas till vuxna för symtomatisk lindring av svår diarré när behandling med loperamid misslyckats.

Denna produkt innehåller kodein. Kodein tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol.

Kodein som finns i Kodein ExtractumPharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Kodein ExtractumPharma

Ta inte Kodein ExtractumPharma

- om du är allergisk mot kodein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har andningsproblem eller annan kronisk lungsjukdom
- om du har okontrollerad eller delvis kontrollerad astma
- om du lider av alkoholism eller leversvikt
- om du löper risk för förstoppning

- om du har kraftiga magkramper orsakade av ett tillstånd som kallas gallkolik
- om du lider av svår diarré orsakad av vissa sjukdomstillstånd eller förgiftning
- om du har haft en skallskada eller förhöjt skalltryck (kan orsaka ögonsmärter, synrubbningar eller huvudvärk bakom ögonen)
- om du är under 12 år.
- För smärtlindring hos barn och ungdomar (0–18 år) efter avlägsnande av halsmandlarna eller adenoiderna (körtlar bakom näsan) på grund av obstruktiv sömnapné.
- om du ammar
- om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin.
- om du tar läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för depression eller om du har tagit dem inom de senaste 14 dagarna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kodein ExtractumPharma:

- om du tidigare haft epileptiska anfall
- om du lider av en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar ditt beteende och handlingar (toxisk psykos)
- om du har lidit av alkoholism, drogmissbruk, drogberoende eller psykisk sjukdom
- om du har någon hjärtsjukdom, särskilt om din hjärtrytm är onormalt snabb (supraventrikulär takykardi)
- om du lider av astma eller andningsproblem
- om du har inflammatorisk tarmsjukdom, inklusive svår blodig diarré (pseudomembranös kolit)
- om du nyligen opererats i mag-tarmkanalen eller urinvägarna
- om du har njur- eller leverproblem
- om du har svårt att urinera på grund av förstörd prostatakörtel eller av andra orsaker
- om du har sjukdom i binjurarna (Addisons sjukdom) eller högt blodtryck orsakat av en tumör nära en njure (feokromocytom)
- om du lider av muskelsvaghet (myasthenia gravis)
- om du har lågt blodtryck eller en underaktiv sköldkörtel
- om du är gravid
- om du är äldre eller skör
- om du upplever smärta eller ökad smärtskänslighet (hyperalgesi) som inte svarar på en ökad dosering av ditt läkemedel.

Kontakta din läkare om du upplever svår smärta i övre delen av buken som eventuellt strålar ut i ryggen, illamående, kräkningar eller feber, eftersom detta kan vara symtom förknippade med inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) och gallvägarna.

Användning av kodein kan leda till förstoppning. Om du inte tar kodein för behandling av svår diarré kan du behöva använda laxermedel.

Ta inte detta läkemedel längre än den period som ordinerats av din förskrivare. Regelbunden användning av kodein under lång tid kan leda till beroende. Du kan känna dig rastlös och irriterad när du slutar ta tabletterna. Huvudvärken kan förvärras om smärtstillande läkemedel regelbundet tas för ofta eller för länge.

Tolerans, beroende och missbruk

Detta läkemedel innehåller kodein, som är ett opioidläkemedel. Det kan leda till beroende och/eller missbruk.

Upprepad användning av opioider kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt (du vänjer dig vid det, så kallad tolerans). Upprepad användning av Kodein ExtractumPharma kan också leda till beroende och missbruk, med risk för livshotande överdosering. Risker för dessa biverkningar kan öka med en högre dos och längre behandlingstid.

Beroende eller missbruk kan innebära att du känner att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta eller hur ofta du behöver ta det.

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende eller missbruk av Kodein ExtractumPharma om:

- du eller någon i din familj någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger ("missbruk"),
- du röker,
- du någon gång har haft problem med sinnesstämningen (depression, ångest eller en personlighetsstörning) eller har behandlats av en psykiatriker för annan sjukdom.

Om du märker något av följande tecken medan du tar Kodein ExtractumPharma kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende eller har fått missbruksproblem:

- Du behöver ta läkemedlet under en längre tid än vad din läkare har ordinerat.
- Du behöver ta mer än den rekommenderade dosen.
- Du kanske känner att du måste fortsätta ta ditt läkemedel, även när det inte hjälper för att lindra din smärta eller hosta.
- Du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren har ordinerat, till exempel "för att känna dig lugn" eller för att få "hjälp att sova".
- Du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över användningen av läkemedlet.
- När du slutar ta läkemedlet kan du känna dig sjuk och mår bättre när du tar läkemedlet igen ("utsättningssymtom").

Om du märker något av dessa tecken ska du tala med din läkare för att diskutera den bästa behandlingsvägen för dig, samt när det är lämpligt att sluta och hur du ska sluta på ett säkert sätt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Kodein ExtractumPharma).

Kodein omvandlas till morfin av ett enzym i levern. Morfin är det ämne som producerar effekten av kodein och lindrar smärta och symtom på hosta. Vissa människor har en variation av detta enzym och detta kan påverka människor på olika sätt. Hos vissa människor produceras morfin inte alls eller i mycket små mängder, vilket innebär otillräcklig lindring för deras smärta eller hosta. Andra människor är mer benägna att få allvarliga biverkningar eftersom en mycket stor mängd morfin produceras. Om du märker någon av följande biverkningar måste du sluta ta detta läkemedel och omedelbart kontakta vården: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Sömnrelaterade andningsstörningar

Kodein ExtractumPharma kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningsuppehåll under sömnen, uppvaknande under natten på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller uttalad dåsigheit under dagen. Om du eller någon annan person observerar dessa symtom, kontakta din läkare. Läkaren kan överväga att sänka dosen.

Barn och ungdomar

Användning till barn och ungdomar efter operation

Kodein ExtractumPharma ska inte användas för smärtlindring hos barn och ungdomar efter avlägsnande av tonsiller (halsmandlar) eller adenoider (körtlar bakom näsan) på grund av obstruktiv sömnapné.

Användning till barn och ungdomar för svår diarré

Kodein ExtractumPharma ska inte användas för svår diarré hos barn och ungdomar.

Användning till barn med andningsproblem

Kodein ExtractumPharma rekommenderas inte till barn med andningsproblem eftersom symtomen på morfintoxicitet kan vara värre hos dessa barn.

Ungdomar äldre än 12 år

Kodein ExtractumPharma rekommenderas inte för behandling av hosta hos ungdomar med nedsatt andningsfunktion.

Andra läkemedel och Kodein ExtractumPharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, särskilt:

- monoaminoxidas (MAO)-hämmare (läkemedel som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom, såsom moklobemid, linezolid, selegilin). Kodein ExtractumPharma ska inte tas samtidigt med MAO-hämmare eller under en 2-veckorsperiod efter avslutad behandling med MAO-hämmare (se avsnittet "Ta inte Kodein ExtractumPharma")
- tricykliska läkemedel (läkemedel som används för att behandla depression, t.ex. amitriptylin, klomipramin)
- ciprofloxacin (antibakteriellt läkemedel som används för att behandla infektioner)
- metoklopramid eller domperidon (används för att förebygga illamående)
- mexiletin eller kinidin (används för att behandla oregelbundna hjärtslag)
- loperamid eller kaolin (används för att behandla diarré)
- cimetidin (används för att behandla magsår)
- läkemedel som används för att behandla högt blodtryck
- hiv-läkemedel (ritonavir)
- läkemedel som används för att behandla allergier (antihistaminer) som kan orsaka dåsighet
- atropin (används för att behandla långsamma hjärtslag)
- läkemedel som används för att behandla sömnlöshet (hypnotika)
- läkemedel som används för att minska irritation och upphetsning (sedativa, lugnande läkemedel) eller ångest (ångestdämpande medel)
- läkemedel som används för att behandla svår smärta (narkotisk analgetika)
- läkemedel som används för att behandla smärta under kirurgi (narkos)
- läkemedel som används för att behandla läkemedelsförgiftning eller läkemedelsberoende (buprenorfin, naltrexon, naloxon)
- natriumoxybat (används för att behandla narkolepsi)
- terbinafin (används för att behandla svampinfektioner)
- rifampicin (ett antibiotikum mot tuberkulos)
- barbiturater (används för att behandla epilepsi)
- johannesört ((traditionellt) växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet)
- vissa neuroleptika (används för att behandla schizofreni)
- vissa läkemedel som används för att behandla depression
- gabapentin eller pregabalin för att behandla epilepsi eller smärta orsakad av nervproblem (neuropatisk smärta).

Samtidig användning av Kodein ExtractumPharma och sedativa läkemedel som bensodiazepiner eller besläktade läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma och kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om din läkare ändå förskriver Kodein ExtractumPharma tillsammans med lugnande läkemedel bör dosen och varaktigheten av samtidig behandling begränsas av din läkare.

Berätta för din läkare om alla lugnande läkemedel du tar och följ läkarens dosrekommendation noga.

Det kan vara bra att informera vänner eller släktingar så att de är medvetna om de tecken och symtom som beskrivs ovan. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Kodein ExtractumPharma med mat, dryck och alkohol

Drick INTE alkohol medan du tar Kodein ExtractumPharma.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Kodein ExtractumPharma ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.

Regelbunden användning under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Ta inte Kodein ExtractumPharma tabletter medan du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjolk.
Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal innan du tar något annat läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Dessa tabletter kan få dig att känna dig förvirrad, orsaka anfall, dimsyn eller dubbelseende eller att se saker som inte finns där. Kodein ExtractumPharma kan påverka din förmåga att köra fordon eftersom det kan göra dig sömnig eller yr. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om det är säkert för dig att köra fordon medan du tar detta läkemedel. Använd inte maskiner om du känner att din reaktionsförmåga påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kodein ExtractumPharma innehåller laktos

Om läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Kodein ExtractumPharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du tar Kodein ExtractumPharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan behandlingen påbörjas och regelbundet under behandlingen kommer din läkare att diskutera med dig vad du kan förvänta dig av att använda Kodein ExtractumPharma, när och hur länge du behöver ta läkemedlet, när du ska kontakta din läkare och när du behöver sluta med behandlingen (se även Om du slutar att ta Kodein ExtractumPharma).

Svälj tabletterna med tillräcklig mängd vatten.

Detta läkemedel ska inte tas i mer än tre dagar. Om smärtan inte förbättras efter tre dagar ska du rådgröra med din läkare. Kodein ExtractumPharma ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen.

Normal dos är följande:

Vuxna och barn från 12 år:

För lindring av mild till måttlig smärta:

Barn i åldern 12 år och äldre bör ta 30–60 mg var 6:e timme, efter behov. Ta inte mer än 240 mg kodeinfosfathemihydrat på 24 timmar.

För hosta: 15–30 mg tre till fyra gånger om dagen.

Kodein ExtractumPharma rekommenderas inte för behandling av hosta hos ungdomar från 12 år med nedsatt andningsfunktion.

Vuxna:

För lindring av svår diarré: 15–60 mg tre till fyra gånger dagligen upp till maximalt 240 mg dagligen.

Äldre personer eller patienter med lever- eller njurskador:

Om du är äldre eller har lever- eller njurskador kan din läkare ge dig en lägre dos. Det är mycket viktigt att detta läkemedel tas exakt enligt läkarens anvisningar.

Överskrid inte den angivna dosen.

Kodein ExtractumPharma bör inte tas av barn under 12 år på grund av risken för allvarliga andningsproblem.

Om du har tagit för stor mängd av Kodein ExtractumPharma

Om du (eller någon annan) sväljer många tabletter samtidigt, eller om du tror att ett barn kan ha svält läkemedlet, kontakta närmaste akutmottagning eller Giftinformationscentralen (tel. 112) eller tala omedelbart om det för din läkare. Symtom på en överdos inkluderar illamående eller kräkningar, förvirring, kramper, yrsel, nervositet, rastlöshet, spänning, hallucinationer, muskelsvaghet, dåsighet, trötthet, lågt blodtryck, små pupiller, långsam andning, snabb hjärtfrekvens.

Om du har glömt att ta Kodein ExtractumPharma

Om du upptäcker att du inte har tagit Kodein ExtractumPharma i tid, och det redan är dags för nästa tablett, ska du ta den schemalagda dosen som om ingenting hänt. **Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.**

Om du slutar att ta Kodein ExtractumPharma

Sluta inte att ta dessa tabletter utan att tala med din läkare. Behandlingen ska fortsätta så länge som din läkare anser att det behövs. Om du slutar att ta tabletterna kan du utveckla följande abstinenssymtom: skakningar, sömnsvärigheter, illamående eller kräkningar, svettningar och ökad hjärtfrekvens, andning eller blodtryck, rastlöshet, irritabilitet, ångest, depression, anorexi, diarré, ökat tårflöde, rinnande näsa, nysningar, gäspningar, hår som står på ända, förstörade pupiller, svaghet, feber, muskelkramper, uttorkning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

- Allergiska reaktioner – allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte, tunga och hals (anafylaktisk reaktion)
- Magtarmkanalen – patienter som lider av inflammation i tarmarna (dvs. kronisk ulcerös kolit) kan uppleva lös avföring eller förstoppning under mycket lång tid

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- Allergiska reaktioner – ödem, hudutslag eller kliande hud, andningssvärigheter, ökad svettning, rodnad i ansiktet, vätskeretention (t.ex. svullna vristar och fötter)
- Magtarmkanalen – förstoppning, illamående eller kräkningar, muntorrhet, buksmärta, anorexi, aptitlöshet, lös avföring
- Symtom förknippade med inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) och gallvägarna (en störning som påverkar en sfinkter i tarmarna som kallas för Oddis sfinkterdysfunktion), t.ex. svår smärta i övre delen av buken som eventuellt strålar ut i ryggen, illamående, kräkningar eller feber
- Hjärta – långsam eller snabb hjärtfrekvens, hjärtklappning, lågt blodtryck, lågt blodtryck vid stående, svimning

- Urinvägarna – smärta och svårigheter att urinera och mindre frekvent behov av att urinera
- Centrala och perifera nervsystemet – dåsighet, obehagskänsla, trötthet, yrsel, kramper, ökat skalltryck (ögonsmärtor, synrubbingar eller huvudvärk bakom ögat), huvudvärk, tolerans (medicin har mindre effekt) eller beroende (lider av abstinenssymtom t.ex. skakningar, svettningar, ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens, förhöjt blodtryck och illamående eller kräkningar om läkemedlet stoppas för snabbt)
- Psykiatrisk effekt – humörförändringar, depression, hallucinationer (se eller höra saker som inte är verkliga), rastlöshet, anspändhet, mardrömmar, förvirring, desorientering
- Ögon – suddig syn eller dubbelseende, extremt små pupiller
- Övrigt – muskelstelhet, minskad sexlust, andningssvårigheter, låg kroppstemperatur.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Kodein ExtractumPharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe där andra personer inte kan komma åt det. Det kan orsaka allvarlig skada och vara dödligt för personer när det inte är avsett för dem.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

HDPE-burk: Använd inom 1 år efter första öppnandet.

Blisterförpackningar: Förvaras vid högst 25 °C. Förvara blistret i ytterkartongen för att skydda mot ljus.

HDPE-burk: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Håll burken väl tillsluten för att skydda mot ljus.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är Kodeinfosfathemihydrat.

Kodein ExtractumPharma 10 mg tabletter: varje tablett innehåller 10 mg Kodeinfosfathemihydrat motsvarande 7,37 mg kodein.

Kodein ExtractumPharma 15 mg tabletter: varje tablett innehåller 15 mg Kodeinfosfathemihydrat motsvarande 11,05 mg kodein.

Kodein ExtractumPharma 20 mg tabletter: varje tablett innehåller 20 mg Kodeinfosfathemihydrat motsvarande 14,73 mg kodein.

Kodein ExtractumPharma 30 mg tabletter: varje tablett innehåller 30 mg Kodeinfosfathemihydrat motsvarande 22,10 mg kodein.

- Övriga ingredienser är cellulosa, mikrokristallin, laktosmonohydrat, cellosapulver, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kodein ExtractumPharma 10 mg tabletter:

Vit eller nästan vit oval 10 mm lång tablett, konvex på båda sidor, märkt med "10" på ena sidan och med brytskåra på den andra sidan. Tabletten kan delas upp i lika stora doser.

30, 60, 90 eller 100 tabletter i klara, transparenta PVC/PVdC//Alu-blister i en kartong med bipacksedel.
50, 100 eller 250 tabletter i vit, ogenomskinlig HDPE-burk med PP-lock med torkmedel och säkerhetsring, i en kartong med bipacksedel.

Kodein ExtractumPharma 15 mg tabletter:

Vit eller nästan vit, rund, platt tablett med fasad kant och en diameter på 7,5 mm, märkt med "15" på ena sidan.

30, 60, 90 eller 100 tabletter i klara, transparenta PVC/PVdC//Alu-blister i en kartong med bipacksedel.
50, 100 eller 250 tabletter i vit, ogenomskinlig HDPE-burk med PP-lock med torkmedel och säkerhetsring, i en kartong med bipacksedel.

Kodein ExtractumPharma 20 mg tabletter:

Vit eller nästan vit, rund, platt tablett med fasad kant och en diameter på 8,5 mm, märkt med "20" på ena sidan och med brytskåra på den andra sidan. Tabletten kan delas upp i lika stora doser.

20, 30, 60, 90 eller 100 tabletter i klara, transparenta PVC/PVdC//Alu-blister i en kartong med bipacksedel.
50, 100 eller 250 tabletter i vit, ogenomskinlig HDPE-burk med PP-lock med torkmedel och säkerhetsring, i en kartong med bipacksedel.

Kodein ExtractumPharma 30 mg tabletter:

Vit eller nästan vit, platt sexkantig tablett med fasad kant och en diameter på 9,5 mm, märkt med "30" på ena sidan och med brytskåra på den andra sidan. Tabletten kan delas upp i lika stora doser.

30, 60, 90 eller 100 tabletter i klara, transparenta PVC/PVdC//Alu-blister i en kartong med bipacksedel.
50, 100 eller 250 tabletter i vit, ogenomskinlig HDPE-burk med PP-lock med torkmedel och säkerhetsring, i en kartong med bipacksedel.

Det är inte säkert att alla förpackningsstorlekar marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning

ExtractumPharma Co, Ltd.

H-1044 Budapest, Megyeri út 64, Ungern

Tillverkare

ExtractumPharma Co. Ltd.

H-6413 Kunfehértó, IV. körzet 6, Ungern

Lokal företrädare

Nordic Prime ApS

Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg, Danmark

Senaste revision av bipacksedeln 2026-04-27