

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Kyolic tablett

Vitlöksextrakt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Kyolic måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Kyolic är och vad det används för
2. Innan du tar Kyolic
3. Hur du tar Kyolic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kyolic ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD KYOLIC TABLETT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU TAR KYOLIC

Använd inte Kyolic

- om du är allergisk (överkänslig) mot vitlök eller något av övriga innehållsämnen i Kyolic tabletter.

Var särskilt försiktig med Kyolic

- Produkter innehållande vitlök bör inte användas veckorna före planerad operation.

Intag av andra läkemedel

Effekten av blodförtunnande läkemedel kan förstärkas om Kyolic används samtidigt.

Du bör därför rådfråga din läkare om du tar blodförtunnande preparat.

Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och/eller biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

3. HUR DU TAR KYOLIC

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år.

1-2 tabletter 1-2 gånger dagligen.

Kyolic rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 10 dagars behandling bör läkare kontaktas.

Om du har tagit för stor mängd av Kyolic tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112), för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Kyolic

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kyolic tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Enstaka fall av gastrointestinala besvär och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR SKA KYOLIC FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C

Använd inte Kyolic om tabletterna ändrat färg form eller lukt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

- Den aktiva substansen är 100 mg extrakt av *Allium sativum* L., lök (vitlök) motsvarande 500 mg färsk vitlök.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, karmelloskalcium, kroscarmellosnatrium, kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Runda vitbeiga tabletter

Finns i förpackningar (glasburk) om 130 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Birger Ledin AB, Norra Vägen 12 SE-542 33 Mariestad

0501-19555

E-mail info@ledins.se

Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-12-18