

Bipacksedel: Information till patienten

Lansoprazol Viatris 15 mg munsönderfallande tabletter Lansoprazol Viatris 30 mg munsönderfallande tabletter

lansoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lansoprazol Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Viatris
3. Hur du tar Lansoprazol Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lansoprazol Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lansoprazol Viatris är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Lansoprazol Viatris är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.

Läkaren kan ordinera Lansoprazol Viatris för följande:

- behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck
- behandling av inflammation i matstruben (refluxesofagit)
- förebyggande av refluxesofagit
- behandling av halsbränna och sura uppstötningar
- behandling av infektioner orsakade av bakterien *Helicobacter pylori* när det ges tillsammans med antibiotika
- behandling eller förebyggande av sår i tolvfingertarm eller magsäck hos patienter som behöver fortsatt behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)
- behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

Lansoprazol som finns i Lansoprazol Viatris kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Viatris

Ta inte Lansoprazol Viatris:

- om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lansoprazol Viatris om:

- du har problem med levern. Läkaren kan behöva justera din dos.
- du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande lansoprazol som minskar magsyran.
- du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)
- du har låga nivåer av vitamin B₁₂ eller riskfaktorer för låga vitamin B₁₂-nivåer och står på långtidsbehandling med detta läkemedel. Som för alla syrahämmande läkemedel kan medicinering med Lansoprazol Viatris leda till minskat upptag av vitamin B₁₂.

Detta läkemedel kan påverka hur din kropp tar upp vitamin B₁₂, särskilt om du behöver ta det under en längre tid. Kontakta din läkare om du märker något av följande symtom som kan tyda på låga nivåer av vitamin B₁₂:

- Extrem trötthet eller brist på energi
- Domningar och stickningar
- Öm eller röd tunga, sår i munhålan
- Muskelsvaghet
- Synstörningar
- Minnesproblem, förvirring, depression

Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolis och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med behandling med lansoprazol. Sluta använda Lansoprazol Viatris och sök vård omedelbart om du märker något av symtomen som beskrivs i avsnitt 4.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med lansoprazol. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Om läkaren har ordinerat dig Lansoprazol Viatris utöver andra läkemedel avsedda för behandling av en infektion orsakad av bakterien *Helicobacter pylori* (antibiotika) eller tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom, läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.

Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.

När du tar lansoprazol kan en inflammation i njuren uppstå. Tecken och symtom kan innefatta minskad mängd urin eller blod i urinen och/eller överkänslighetsreaktioner som feber, utslag och stela leder. Du ska rapportera sådana tecken till din läkare.

Om du tar Lansoprazol Viatris i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i ditt blod bli mycket låga. Om du blir mycket trött, förvirrad, yr eller får muskelryckningar, kramper eller ökad hjärtrytm, kontakta genast din läkare eftersom magnesiumnivåerna i ditt blod kan vara låga (se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar"). Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan därför komma att mäta magnesiumnivån i ditt blod regelbundet.

Användning av protonpumpshämmare som Lansoprazol Viatris, och särskilt vid användning i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkaren om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison) eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Om du tar Lansoprazol Viatris under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du ska rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.

Under behandling

Om det uppkommer allvarliga eller ihållande diarréer under behandling med Lansoprazol Viatris, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom lansoprazol har förknippats med något ökad förekomst av smittsam diarré.

Andra läkemedel och Lansoprazol Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande:

- hiv-proteashämmare som atazanavir eller nelfinavir (används för behandling av hiv)
- metotrexat (används för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer)
- ketokonazol (används för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar ett överskott av kortisol)
- itrakonazol (används för behandling av svampinfektioner)
- rifampicin (används för behandling av tuberkulos)
- digoxin (används för behandling av hjärtproblem)
- warfarin (används för behandling av blodproppar)
- teofyllin (används för behandling av astma)
- takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)
- fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska tillstånd)
- antacida (används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar, t.ex. aluminiumhydroxid eller magnesiumkarbonat)
- sukralfat (används för att läka magsår)
- johannesört (*Hypericum perforatum*) (används för att behandla lätt nedstämdhet).

Graviditet och amning

Användning av Lansoprazol Viatris under graviditet rekommenderas inte, eftersom information saknas.

Det är okänt om lansoprazol utsöndras i bröstmjölk. Diskutera med läkare om du ska fortsätta att ta detta läkemedel eller om du ska amma ditt barn.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom yrsel, svindel (en känsla av att allt snurrar när man sitter eller står still), sömnhet och synproblem förekommer ibland hos patienter som tar Lansoprazol Viatris. Om du får sådana biverkningar ska du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lansoprazol Viatris innehåller sakaros, aspartam och natrium

Varje 15 mg munsönderfallande tablett innehåller 5,97 mg aspartam per tablett.

Varje 30 mg munsönderfallande tablett innehåller 11,93 mg aspartam per tablett.

Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Detta läkemedel innehåller sakaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Lansoprazol Viatris

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen av Lansoprazol Viatris beror på ditt tillstånd. Rekommenderade doser av Lansoprazol Viatris för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.

Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor. Om symtomen kvarstår ska du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.

Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 2 veckor.

Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit): en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg tablett varje dag.

Behandling av infektion orsakad av *Helicobacter pylori*: Rekommenderad dos är en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på morgonen och en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på kvällen. Behandlingen pågår vanligen varje dag i 7 dagar.

Rekommenderade kombinationer av antibiotika är:

30 mg Lansoprazol Viatris tillsammans med 250–500 mg klaritromycin och 1 000 mg amoxicillin
30 mg Lansoprazol Viatris tablett tillsammans med 250 mg klaritromycin och 400–500 mg metronidazol.

Om du behandlas för infektion för att du har magsår, är det inte troligt att magsåret återkommer om behandlingen av infektionen lyckas. För att läkemedlet ska ha bästa möjlighet att verka, ska du ta det vid rätt tidpunkt och inte missa någon dos.

Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

Förebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag.

Zollinger-Ellisons syndrom: Rekommenderad dos är två 30 mg munsönderfallande tabletter varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på Lansoprazol Viatris, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.

Användning för patienter med leverproblem

Om du har måttliga eller svåra leverproblem kan din läkare ge dig hälften av den rekommenderade dosen.

Användning för äldre

Om du är äldre kan din läkare ge dig en dos som är lägre än den rekommenderade dosen. Den högsta rekommenderade dosen för äldre patienter är 30 mg per dag.

Användning för barn

Lansoprazol Viatris ska inte ges till barn.

Hur läkemedlet ska tas

För att uppnå bästa resultat med läkemedlet bör du ta Lansoprazol Viatris minst 30 minuter före intag av föda.


Om du tar Lansoprazol Viatris en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Lansoprazol Viatris genast på morgonen.

Om du tar Lansoprazol Viatris två gånger per dag, bör du ta den första dosen på morgonen och den andra dosen på kvällen.

Lansoprazol Viatris går lätt sönder, du bör därför hantera tabletterna försiktigt. Hantera inte tabletterna med blöta händer eftersom tabletterna då kan lösas upp.

Lansoprazol Viatris kan finnas tillgänglig i tryck- eller avdragbar blisterförpackning.

1. För avdragbarblister endast, håll blisterkartan i kanterna och separera en blisterenhet från resten av kartan genom att försiktigt riva längs perforeringen.
2. Dra försiktigt bort undersidan. För icke-perforerade blister, se till att inte dra loss undersidan på närliggande tabletter.
3. Tryck försiktigt ut tabletten.
4. Lägg tabletten i munnen. Den kommer lösas upp direkt i munnen, så att den lättare kan sväljas. Du kan även svälja tabletten hel med ett glas vatten.



Läkaren kan instruera dig att ta tabletten med en spruta om du har stora svårigheter att svälja.

Om du använder dig av en spruta:

- Dra ut kolven ur sprutan (använd en spruta på minst 5 ml för en 15 mg tablett och minst 10 ml för en 30 mg tablett)
- Placera tabletten i sprutcyllindern
- Sätt tillbaka kolven i sprutan
- För 15 mg tabletten: Dra upp 4 ml kranvatten i sprutan
- För 30 mg tabletten: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan
- Vänd sprutan upp och ned och dra även in 1 ml luft i den
- Skaka sprutan försiktigt i 10–20 sekunder tills tabletten är upplöst
- Innehållet kan tömmas direkt i munnen
- Fyll sprutan på nytt med 2–5 ml kranvatten för att spola ut resterna ur sprutan i munnen.
- Upprepa föregående steg om det behövs.

Om du använder dig av en nasogastrisk sond:

Det är viktigt att man noga har testat sprutans och sondens lämplighet. Den rekommenderade diametern på den nasogastriska sonden är 3,3 mm (10 French Units) eller större.

- Dra ut kolven ur sprutan (använd en spruta på minst 25 ml för en 15 mg tablett och minst 50 ml för en 30 mg tablett)
- Placera tabletten i sprutcyllindern
- Sätt tillbaka kolven i sprutan
- För 15 mg tabletten: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan
- För 30 mg tabletten: Dra upp 25 ml kranvatten i sprutan
- Vänd sprutan upp och ned och dra även in 5 ml luft i den
- Skaka sprutan försiktigt i 10–20 sekunder tills tabletten är upplöst
- Koppla sprutan till sonden och töm sprutans innehåll i den nasogastriska sonden.

- För 15 mg tabletten: Fyll sprutan på nytt med 10 ml kranvatten och töm sprutans innehåll i sonden
- För 30 mg tabletten: Fyll sprutan på nytt med 25 ml kranvatten och töm sprutans innehåll i sonden.

Om du har tagit för stor mängd av Lansoprazol Viatris

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lansoprazol Viatris

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta nästa dos. Om så är fallet, hoppa över den missade dosen och fortsätt att ta Lansoprazol Viatris som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lansoprazol Viatris

Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingens kuren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du tror att du har någon av följande svåra biverkningar, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare eller sök upp närmaste sjukhus akutmottagning omedelbart.

- Lansoprazol Viatris kan i mycket sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner (allergi). Symtom på överkänslighetsreaktioner kan omfatta feber, hudutslag, svullet ansikte, svullna lymfknotor, svullen tunga eller svalg, svårighet att svälja, nässelutslag, svårighet att andas och ibland blodtrycksfall.
- Allvarliga hudreaktioner som kan vara livshotande har i mycket sällsynta fall rapporterats för Lansoprazol Viatris. Symtom inkluderar rödaktiga fläckar på bålarna som liknar måltavlor eller är cirkulära, ofta med blåsor i mitten, flagnande hud, sår i mun, hals, näsa, på könsorgan och ögon. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom [SJS], toxisk epidermal nekrolys [TEN]).
- Utbrett utslag, hög kroppstemperatur och förstörade lymfkörtlar (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS, ingen känd frekvens]).
- Om du tar Lansoprazol Viatris under fler än tre månader är det möjligt att nivåerna av magnesium i blodet kan minska. Låga nivåer av magnesium kan yttra sig som trötthet, ofrivilliga muskelsammandragningar, förvirring, kramper, yrsel och ökad hjärtfrekvens. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga halter av magnesium kan även leda till en minskning av kalium- eller kalciumnivåerna i blodet. Din läkare kan besluta att regelbundna blodprover behövs för att kontrollera dina nivåer av magnesium.
- I mycket sällsynta fall kan Lansoprazol Viatris orsaka ett minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos) så att din motståndskraft mot infektioner minskar, eller samtidig minskning av både antalet röda och vita blodkroppar samt antalet blodplättar (pancytopeni). Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller

feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller svårigheter att kissa, eller om du känner dig trött, har blek hy med blåmärken som inte kan förklaras eller blöder under en längre tid än normalt, så ska du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet blodkroppar möjligen har minskat.

- I sällsynta fall kan Lansoprazol Viatris orsaka en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) och dess symtom inkluderar en plötslig intensiv smärta i magens mellersta eller övre del som kan stråla ut till ryggen, vilket kan leda till illamående och kräkning.
- Om allvarlig eller ihållande diarré uppstår under behandling med Lansoprazol Viatris, kontakta läkare omedelbart eftersom Lansoprazol Viatris har förknippats med en liten förhöjd risk för infektionsorsakad diarré.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk, yrsel
- diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående eller kräkningar, gaser, torr eller ont i mun eller hals
- hudutslag, klåda
- förändrade värden från leverfunktionsprov
- trötthet
- godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- depression
- led- eller muskelsmärta
- vätskeansamling eller svullnad
- förändrat antal blodkroppar.
- risk för frakturer i höft, handled och ryggrad

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- feber
- rastlöshet, dåsighet
- förvirring, upplevelser av att höra, se eller känna saker som inte är verkliga (hallucinationer), sömnproblem (sömnlöshet)
- visuella störningar
- en känsla av att allt snurrar när man står stilla (svindel)
- smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)
- hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning
- ljuskänslighet
- håravfall
- myrkrypningar (parestesi), darrning
- anemi (blekhet)
- inflammation i njurarna (tubulointerstitiell nefrit), möjliga symtom inkluderar förändringar i mängden urin och blod i urinen
- inflammation i levern (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)
- bröstsvullnad hos män, impotens
- candidainfektion (svampinfektion, kan drabba matstrupens slemhinnor)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- inflammation i munnen (stomatit)
- inflammation i tarmen (kolit)
- förhöjda testvärden såsom kolesterol- och triglyceridnivåer
- låga nivåer av natrium i blodet. Symtom inkluderar illamående och kräkningar, huvudvärk, dåsighet och trötthet, förvirring, muskelsvaghet eller kramper, lättretlighet, anfall och koma. Din läkare kan besluta att ta regelbundna blodprover för att kontrollera dina nivåer av natrium.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- hudrelaterade former av lupus eller lupusutslag
- hudutslag, möjligen med smärta i lederna
- visuella hallucinationer

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Lansoprazol Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Används inom 100 dagar efter öppnandet. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lansoprazol
- Övriga innehållsämnen är: sockersfärer, lätt magnesiumsubkarbonat (E504), krosopovidon (E1202), hydroxipropylcellulosa (E463), metakrylsyra- etylakrylatsampolymer (1:1), trietylцитrat (E1505), natriumhydroxid (E524), talk (E553b), polysorbat (E433), makrogol, järnoxid röd (E172), järnoxid gul (E172), mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, aspartam (E951), natriumlaurilsulfat, natriumvätekarbonat (E500),

citronsyramonohydrat (E330), jordgubbsarom och magnesiumstearat. (Se avsnitt 2 "Lansoprazol Viatriis innehåller sackaros, aspartam och natrium").

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är i form av munsönderfallande tabletter (i fast form att tas via munnen) som löses upp och frigör magsaftsresistenta mikrogranulat.

Lansoprazol Viatriis 15 mg munsönderfallande tabletter är vita till gulvita med orange till mörkbruna prickar. Tabletterna är runda, släta med avfasade kanter och märkta med "LP1" på ena sidan och "M" på andra sidan.

Lansoprazol Viatriis 30 mg munsönderfallande tabletter är vita till gulvita med orange till mörkbruna prickar. Tabletterna är runda, släta med avfasade kanter och märkta med "LP2" på ena sidan och "M" på andra sidan.

Lansoprazol Viatriis 15 mg och 30 mg munsönderfallande tabletter finns tillgängligt i:

- Blisterförpackningar (avdragbar) om 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter:
- Endosblisterförpackningar (avdragbar) om 28x1 tabletter:
- Blisterförpackning (genomtryckbar) om 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter:
- Endosblisterförpackning (genomtryckbar) innehållande 28x 1 tabletter:
- Endosblisterförpackning (genomtryckbar) innehållande 14x 1 tabletter:
- Plastburkar med absorberande bomull och skruvlock om 30, 100 eller 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatriis Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15, DUBLIN
Irland

Lokal företrädare

Viatriis AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige

Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.

Mylan Hungary Kft, H-2900, Komárom Mylan utca 1, Ungern.

Denna bipacksedel ändrades senast: 2025-06-26