

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Lasea, mjuka kapslar

lavendelolja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lasea är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Lasea
 3. Hur du tar Lasea
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Lasea ska förvaras
 1. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
- Vad Lasea är och vad det används för**

Lasea är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av lätt oro och för att underlätta sömn.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lasea

Ta inte Lasea

- om du är allergisk mot lavendelolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om symtomen försämras under användning av läkemedlet, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal. Användning av Lasea rekommenderas inte vid nedsatt leverfunktion eftersom beståndsdelarna huvudsakligen bryts ned i levern.

Barn och ungdomar

Lasea rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.

Andra läkemedel och Lasea

Det finns inga rapporter om att Lasea påverkar eller påverkas av andra läkemedel vid samtidigt intag.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att berätta att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Lasea har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lasea innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller cirka 12 mg sorbitol i varje kapsel.

3. Hur du tar Lasea

Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar från 12 år: 1 kapsel 1 gång dagligen.

Svälj kapseln hel med tillräckligt med vätska (helst ett glas vatten).

Behandlingstid

Om symtomen kvarstår efter två veckors användning av läkemedlet, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Användning för barn och ungdomar

Lasea ska inte ges till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Lasea

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Om du har glömt att ta Lasea

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsatt ta läkemedlet enligt anvisningar från läkare eller enligt beskrivning i denna information.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Lindriga mag- och tarmbesvär (t.ex. rapning)
- Överkänslighetsreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se kontaktuppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Lasea ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lavendelolja (*Lavandula angustifolia* Miller, aetheroleum).
1 mjuk kapsel innehåller 80 mg lavendelolja (*Lavandula angustifolia* Miller, aetheroleum).
- Övriga innehållsämnen är succinylerat gelatin, glycerol 85 %, raffinerad rapsolja, flytande icke-kristalliserande sorbitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lasea är en oval transparent färglös mjuk kapsel. Kapselns mått: längd cirka 11 mm, bredd cirka 7 mm.

De mjuka kapslarna är förpackade i blisterkartor. Lasea finns i förpackningar med 14, 28 och 56 mjuka kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe
Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-04-03