

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 175 mg/43,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade tabletter

levodopa/karbidopa/entakapon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till fråga läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm
3. Hur du använder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm är och vad det används för

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm innehåller tre aktiva substanser (levodopa, karbidopa och entakapon) i en filmdragerad tablett. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom beror på låga nivåer av ämnet dopamin i hjärnan. Levodopa ökar mängden dopamin och lindrar därför symtomen av Parkinsons sjukdom. Karbidopa och entakapon förbättrar den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

Levodopa, karbidopa och entakapon som finns i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm

Ta inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm om du

- är allergisk mot levodopa, karbidopa eller entakapon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)
- har en tumör i binjuren
- tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och MAO-B-hämmare eller icke-selektiva MAO-hämmare)
- tidigare haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS - detta är en sällsynt reaktion mot läkemedel som används för att behandla allvarlig mental sjukdom)
- tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)
- har en allvarlig leversjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm om du har eller har haft:

- en hjärtattack eller någon annan hjärtsjukdom inklusive arytmier, eller blodkärslsjukdom
- astma eller annan lungsjukdom
- leverproblem, din dos kan då behöva justeras
- njursjukdom eller hormonrelaterad sjukdom
- magsår eller krampanfall
- om du upplever långvarig diarré, kontakta läkare då detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation
- någon form av allvarlig mental sjukdom, till exempel psykos
- kroniskt vidvinkelglaukom. Din dos kan då behöva justeras och ditt ögontryck kan behöva kontrolleras.

Rådfråga din läkare om du tar:

- antipsykotika (läkemedel för behandling av psykos)
- läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck när du reser dig från en stol eller säng. Du bör vara medveten om att Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan förvärra denna effekt.

Rådfråga din läkare om du under behandlingen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm:

- upplever att dina muskler blir mycket stela eller rycker kraftigt, eller om du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls, eller kraftiga blodtryckssvängningar. Om något av detta händer, **kontakta genast din läkare**
- känner dig deprimerad, har självmordstankar, eller märker att ditt beteende förändras
- plötsligt faller i sömn, eller känner dig mycket sömning. Om det händer ska du inte köra bil eller använda maskiner (se även avsnittet "Körförmåga och användning av maskiner")
- får ofrivilliga rörelser eller om de förvärrats efter start av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm-behandling. Om detta händer kan din läkare behöva ändra din dosering av läkemedel mot Parkinsons sjukdom.
- får diarré: din vikt kan behöva övervakas för att undvika en eventuell kraftig viktninskning upplever aptitlöshet som förvärras över tid, orkeslöshet (svaghet, utmattning) och viktninskning inom en kort tidsperiod. Om detta händer bör en allmän läkarundersökning inklusive leverfunktionstest övervägas.
- känner att du vill sluta använda Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm, se avsnittet "Om du slutar använda Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm".

Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar beroendelika symtom som leder till ett begär efter större doser Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm och andra läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare upptäcker att du utvecklar drifter eller begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning och kan inkludera tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller spenderande, en onormalt hög

sexualdrift eller en upptagenhet med ökning i sexuella tankar eller känslor. Din läkare kan behöva se över din behandling.

Din läkare kan behöva ta regelbundna prover på dig under långtidsbehandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm.

Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm rekommenderas inte för behandling av extrapyramidala symtom (till exempel ofrivilliga rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar) orsakade av andra mediciner.

Barn och ungdomar

Erfarenhet av behandling av patienter under 18 år med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm är begränsad. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm rekommenderas därför inte för behandling av barn.

Andra läkemedel och Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Använd inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm om du använder vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och MAO-B-hämmare eller icke-selektiva MAO-hämmare).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan förstärka effekten och biverkningarna av vissa läkemedel. Dessa inkluderar:

- läkemedel som används för behandling av depression såsom moklobemid, amitriptylin, desipramin, maprotilin, venlafaxin och paroxetin
- rimiterol och isoprenalin, som används för att behandla sjukdomar i luftvägarna
- adrenalin, som används vid svåra allergiska reaktioner
- noradrenalin, dopamin och dobutamin, som används för att behandla hjärtsjukdomar och lågt blodtryck
- alfa-metyldopa, som används för att behandla högt blodtryck
- apomorfin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Vissa läkemedel kan försvaga effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm. Dessa är:

- dopaminantagonister, som används för att behandla mental sjukdom, illamående och kräkningar
- fenytoin, som används för att förhindra krampsyckningar
- papaverin, som används för muskelavslappning.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan försämra upptaget av järn. Ta därför inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm och järntillskott samtidigt utan med minst 2–3 timmars mellanrum.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm med mat och dryck

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan tas med eller utan mat. Hos vissa patienter kan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm upptas sämre om det tas samtidigt, eller kort efter att man ätit proteinrik föda (som kött, fisk, mjölkprodukter, frön och nötter). Kontakta din läkare om du tror att det gäller för dig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte amma när du behandlas med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm.

Körförmåga och användning av maskiner

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm kan sänka ditt blodtryck, vilket kan orsaka att du känner dig virrig eller yr. Var därför särskilt försiktig om du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Om du känner dig mycket dåsig eller om du ibland plötsligt somnar, vänta tills du känner dig fullt vaken innan du kör bil eller gör något annat som kräver att du är uppmärksam. Annars kan du utsätta dig själv eller andra för skada eller död.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per maximal rekommenderad daglig dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och äldre:

- Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm du ska ta varje dag.
- Det är inte meningen att tabletterna ska delas eller brytas i småbitar.
- Du ska bara ta en tablett i taget.
- Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren föreslå en höjning eller sänkning av dosen.
- Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 10 tabletter per dag.
- Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 175 mg/43,75 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 8 tabletter per dag.
- Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 200 mg/50 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 7 tabletter per dag.

Om du upplever att effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm är för stark eller för svag eller om du upplever eventuella biverkningar, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller upprörd, din hjärtfrekvens kan vara långsammare eller snabbare än normalt eller så kan huden, tungan, ögonen eller urinen få färgförändringar.

Om du glömmer att ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om det är mer än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg och ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Om det är mindre än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg, vänta 1 timme, och ta sedan ytterligare en tablett. Efter det kan du fortsätta som vanligt.

Se alltid till att det är minst en timme mellan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm-doserna, för att undvika eventuella biverkningar.

Om du slutar använda Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm

Sluta inte ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm annat än på uppmaning av din läkare. I ett sådant fall kan din läkare behöva ändra din övriga antiparkinsonmedicinering, speciellt levodopa, för att behålla tillräcklig symtomkontroll. Om du plötsligt slutar ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm och andra antiparkinsonmedel kan det leda till oönskade biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Många biverkningar kan mildras genom att justera dosen.

Om du vid behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm upplever följande symtom, **kontakta genast din läkare:**

- Dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls, eller kraftiga blodtryckssvängningar. Dessa kan vara symtom på malignt neuroleptikasyndrom (NMS, en sällsynt svår reaktion på läkemedel som används för att behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt svår muskelsjukdom).
- Allergisk reaktion, symtomen kan innefatta näselfeber, klåda, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

Mycket vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- ofrivilliga rörelser (dyskinesier)
- illamående
- rödbrun missfärgning av urinen (ofarlig)
- muskelsmärta
- diarré

Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- tomhets- eller svimningskänsla p.g.a. lågt blodtryck, högt blodtryck
- förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, yrsel, dåsigheit
- kräkningar, buksmärta och obehagskänslor, halsbränna, muntorrhet, förstoppning
- sömnsvårigheter, hallucinationer, förvirring, onormala drömmar (inklusive mardrömmar), trötthet
- mentala förändringar – inklusive minnesstörningar, oro och depression (eventuellt med självmordstankar)
- hjärt- eller artärsjukdom (t.ex. bröstsmärtor), oregelbunden hjärtfrekvens eller rytm
- ökad tendens att falla
- andfåddhet
- ökad svettning, utslag
- muskelkramper, svullnad av benen
- dimsyn
- blodbrist
- minskad aptit, viktninskning
- huvudvärk, ledvärk

- urinvägsinfektion

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- hjärtattack
- tarmlödning
- förändring i blodets cellbild som kan leda till blödning, onormala leverfunktionsvärden
- krampanfall
- upprördhetskänslor
- psykotiska symtom
- kolit (inflammation i tjocktarmen)
- missfärgning av annat än urin (t.ex. hud, naglar, hår, svett)
- svårighet att svälja
- oförmåga att urinera

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- Begär efter högre doser av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm som är större än det som krävs för att kontrollera motoriska symtom, känt som dopaminergt dysregleringssyndrom. Vissa patienter upplever svåra onormala ofrivilliga rörelser (dyskinesier), humörsvägningar eller andra biverkningar efter att ha tagit större doser av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm.

Följande biverkningar har också rapporterats:

- hepatit (inflammation i levern)
- klåda

Du kan uppleva följande biverkningar:

- Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, vilket kan inkludera:
 - stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser.
 - förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som berör dig eller andra betydligt, till exempel en ökad sexlust.
 - Okontrollerad överdriven shopping eller spenderande
 - hetsätning (äta stora mängder mat under en kort tid) eller tvångsmässigt matintag (äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger)

Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; man kommer diskutera hur man ska hantera eller reducera dessa symtom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan även rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att tillhandahålla mer information om detta läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter 'EXP.' Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 175 mg/43,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade tabletter
Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är levodopa, karbidopa och entakapon

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 50 mg/12,5 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 75 mg/18,75 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg levodopa, 18,75 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 100 mg/25 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 125 mg/31,25 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg levodopa, 31,25 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 150 mg/37,5 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg levodopa, 37,5 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 175 mg/43,75 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 175 mg levodopa, 43,75 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Neuraxpharm 200 mg/50 mg/200 mg
Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal kiseldioxid, povidon (E1201), krospovidon, magnesiumstearat

Filmdragering: hypromellos, polysorbat 80, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg/12,5 mg/200 mg
Bruna, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M71" på ena sidan och släta på andra sidan med en diameter på ca 10 mm.

75 mg/18,75 mg/200 mg
Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M72" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 13,9 mm och en bredd på ca 7,9 mm.

100 mg/25 mg/200 mg

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M73" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 16 mm och en bredd på ca 7,5 mm.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M74" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 14,2 mm och en bredd på ca 9,2 mm.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M75" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 14,2 mm och en bredd på ca 9,2 mm.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M76" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 17 mm och en bredd på ca 7,7 mm.

200 mg/50 mg/200 mg

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "M70" på ena sidan och släta på andra sidan med en längd på ca 17 mm och en bredd på ca 7,7 mm.

Förpackningsstorlekar: 100 eller 130 filmdragerade tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Neuraxpharm Sweden AB
Box 98
182 11 Danderyd
Sverige

Tillverkare:

Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L.
Avda. Barcelona 69
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spanien

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 23
40764 Langenfeld
Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-07-17