

Bipacksedel: Information till användaren

Lidokain Isdin 40 mg/g kräm lidokain

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lidokain Isdin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lidokain Isdin
3. Hur du använder Lidokain Isdin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lidokain Isdin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lidokain Isdin är och vad det används för

Lidokain Isdin 40 mg/g kräm innehåller lidokain och är ett läkemedel för lokal bedövning (lokanestesi) av huden.

Lidokain Isdin används för bedövning av huden inför nålstick (t.ex. vid blodprovtagning).

Lidokain som finns i Lidokain Isdin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lidokain Isdin

Använd inte Lidokain Isdin

- om du är allergisk mot lidokain eller något annat innehållsämne i innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel, mot soja eller jordnötter.
- på spädbarn som är för tidigt födda (födda före 37:e kompletta graviditetsveckan).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lidokain Isdin.

- vid kirurgiska ingrepp i hörselgången eller innerörat eftersom det finns risk att innerörat skadas.
- om du har en allvarlig bakomliggande sjukdom t.ex. hjärtsjukdom eller allvarligt nedsatt leverfunktion.
- om du tar läkemedel mot störningar i hjärtrytmen (se Andra läkemedel och Lidokain Isdin).

- nära ögonen, eftersom lidokain kan ge ögonirritation. Dessutom kan förlusten av skyddande reflexer leda till irritation eller skrapår på hornhinnan. Om Lidokain Isdin kommer i kontakt med ögonen ska dessa omedelbart sköljas med ljummet vatten och ögonen ska skyddas tills känslan återkommer.
- om du ska få vaccination med levande vaccin (t.ex. tuberkulosvaccin). Vaccin bör inte ges i områden där Lidokain Isdin redan applicerats eftersom effekten av vaccinet kan påverkas.

Informera din läkare om något av ovanstående gäller dig.

Lidokain Isdin ska endast användas på oskadad hud (ej på slemhinnor, sår eller eksem).

Andra läkemedel och Lidokain Isdin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med något av nedanstående läkemedel eftersom risken för biverkningar kan öka:

- lidokain i hög dos av annan orsak
- andra lokalbedövningsmedel
- läkemedel mot arrytmier (störning i hjärtrytmen), såsom tokainid, mexiletin och amiodaron.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Tillfälligt bruk av Lidokain Isdin under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

Lidokain Isdin passerar över i modersmjölk med påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Lidokain Isdin har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Lidokain Isdin innehåller propylenglykol, bensylalkohol, hydrogenerad sojalecitin och polysorbat 80.

Lidokain Isdin innehåller 75 mg propylenglykol per gram kräm. Propylenglykol kan orsaka hudirritation.

Lidokain Isdin innehåller 15 mg bensylalkohol per gram kräm. Bensylalkohol kan orsaka lindrig lokal irritation och allergiska reaktioner.

Lidokain Isdin innehåller 7,5 mg polysorbat 80 som kan orsaka allergiska reaktioner.

Lidokain Isdin innehåller hydrogenerad sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

3. Hur du använder Lidokain Isdin

Använd alltid Lidokain Isdin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Barn från 6 till 12 år:

Dosen vid varje enskilt tillfälle är 2-3 gram. Den rekommenderade applikationstiden, dvs. den tid som krämen ska vara på huden, är 60 minuter, dock högst 2 timmar.

Vuxna och barn över 12 år:

Dosen vid varje enskilt tillfälle är 2-3 gram. Maximal mängd per dygn är 5 gram. Den rekommenderade applikationstiden dvs. den tid som krämen ska vara på huden, är 60 minuter, dock högst 2 timmar.


Barn från 2 till 6 år:

Lidokain Isdin rekommenderas inte till denna åldersgrupp eftersom det saknas tillräcklig erfarenhet.


Barn 0 till 2 år:

Lidokain Isdin ska inte användas till denna åldersgrupp eftersom det saknas erfarenhet.

1 gram kräm motsvarar en sträng på ca 2,5 cm.




1) Ett tjockt, jämnt lager av kräm appliceras på den hudyta som ska behandlas.



2) Låt krämen sitta kvar på huden enligt ovan angiven applikationstid.

Ett täckförband rekommenderas (t.ex. ett plåster) för att undvika att krämen oavsiktligt försvinner innan applikationstiden är avslutad.



3) Torka sedan bort krämen. Hudområdet ska rengöras inför kirurgiska ingrepp.

Tillslut tuben efter användning.

Kontakta din läkare eller apotekspersonalen om du upplever att effekten av Lidokain Isdin är för stark eller för svag.

Om du använt för stor mängd av Lidokain Isdin

Överdoserings är inte sannolik vid normal användning på frisk hud.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag eller fått för stor mängd på huden kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (1 till 10 användare av 1000):

Lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, klåda och sveda) på det behandlade området. Symtomen är vanligen övergående och milda.

Sällsynta (1 till 10 användare av 10 000):

Allergiskt kontakteksem.

Mycket sällsynta (färre än 1 användare av 10 000):

Allergiska reaktioner (i allvarliga fall anafylaktisk chock).

Sluta att använda Lidokain Isdin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (anafylaktisk chock)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Lidokain Isdin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Öppnad tub är hållbar i 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lidokain. 1 gram kräm innehåller 40 mg lidokain.
- Övriga innehållsämnen är vatten, propylenglykol, hydrogenerad sojalecitin, bensylalkohol, polysorbat 80, karbomer 940, trolamin, kolesterol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lidokain Isdin är en vit till gulaktig kräm.
Förpackningsstorlekar: 5 g, 10 g, 20 g, 30 g, 40 g och 50 g i aluminiumtub.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

ISDIN S.A.
Provençals 33
08019 Barcelona
Spanien

Tillverkare:

Medinfar Manufacturing S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-05-20

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

<http://www.lakemedelsverket.se>.