

Bipacksedel: Information till användaren

Lidoposterin 50 mg/g rektalsalva

lidokain

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du ska tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lidoposterin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lidoposterin
3. Hur du använder Lidoposterin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lidoposterin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lidoposterin är och vad det används för

Lidoposterin innehåller det verksamma ämnet lidokain som har smärtlindrande och lokalbedövande effekt. Lidoposterin används till vuxna från 18 år vid lokal behandling av besvär i analområdet, t.ex. klåda och smärta orsakad av t.ex. hemorrojder.

Du ska tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, så att andra allvarigare orsaker till symtomen kan uteslutas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lidoposterin

Använd inte Lidoposterin:

- om du är allergisk mot lidokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lidoposterin.

- Ta inte mer än rekommenderad högsta dos eftersom högre dos kan leda till fler biverkningar. Om du använder mycket mer Lidoposterin, eller om du använder det oftare än rekommenderat, kan allvarliga biverkningar uppstå, t.ex. på det centrala nervsystemet och på hjärt-kärlsystemet.
- Tala med din läkare innan du börjar använda Lidoposterin om du har oregelbunden hjärtrytm och tar läkemedel (antiarytmika) för detta. Din läkare avgör om Lidoposterin är lämpligt för dig.
- Använd inte läkemedlet om du har en blödning från analområdet. Avbryt behandlingen och kontakta läkare om blödning uppstår under behandlingen.
- Om du har en infektion i analområdet måste en relevant behandling påbörjas innan du kan börja använda Lidoposterin. Be din läkare om råd.
- Lokal irritation kan ibland uppstå vid överkänslighet mot lidokain. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.
- Om du har hjärtproblem eller svår lever- eller njursvikt.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt för Lidoposterin hos barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga uppgifter finns tillgängliga.

Andra läkemedel och Lidoposterin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Lidoposterin kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

- andra lokalbedövningsmedel: undvika att använda andra lokala bedövningsmedel samtidigt med Lidoposterin,
- läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (så kallade antiarytmika), t.ex. amiodaron.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Lidokain passerar över till fostret. Risken för människa är okänd. Därför skall Lidoposterin användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Den aktiva substansen i Lidoposterin passerar över i bröstmjolk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Lidoposterin under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Lidoposterin påverkar vanligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lidoposterin innehåller cetylalkohol

Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

3. Hur du använder Lidoposterin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd inledningsvis rektalsalvan 2 – 3 gånger dagligen, därefter 2 gånger dagligen (morgon och kväll), helst före (ca 30 minuter) och efter tarmtömning. Stryk på salvan noggrant i ett tunt lager kring analområdet med ett finger. Använd en engångshandske. Analområdet skall rengöras noga före användningen.

Mängden salva beror på storleken på de hud- och slemhinneområden som ska behandlas.

Endast små mängder salva bör användas. Högst 9 cm salva (eller ungefär storleken på en vindruva, vilket motsvarar 2,5 gram salva) får användas.

I förpackningen medföljer en applikator med sidoöppningar för användning i ändtarmen. Med hjälp av applikatorn kan salvan användas direkt på platsen för smärtan och klådan.

Anvisningar för användning av applikatorn:

Applikatorn skruvas på tuben och toppen på applikatorn tas av. Genom att trycka på tuben pressas salvan in i applikatorn och kommer ut genom sidoöppningarna. Applikatorn förs sedan försiktigt in i analöppningen.

Införandet kan underlättas av att smörja in applikatorn med lite salva. Genom att trycka på tuben igen, kommer salvan att föras in i ändtarmen.

Efter användning ska applikatorn rengöras genom att pressa ut lite salva genom sidoöppningarna och torka av ytan med ett absorberande papper. Toppen ska skruvas på ordentligt igen. Detta förhindrar att salvan torkar ut.

Om salvan inte används under en längre tidsperiod bör applikatorn skruvas loss och därefter rengöras med varmt vatten.

Användningstidens längd

Rådfråga en läkare om symtomen inte har förbättrats efter 7 dagar så att orsaken till klåda och smärtan kan fastställas.

Observera:

På grund av kroppstemperatur kan användning av salvor i analområdet orsaka nedsmutsning av underkläder. Därför rekommenderas användning av någon typ av skydd i underkläderna (t.ex. en pappersnäsduk, bomull, osv.).

Om du använt för stor mängd av Lidoposterin

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoseringsom ett litet barn av misstag fått i sig salvan via munnen kan orsaka mag-tarmförgiftning med buksmärta och illamående. Vid intag av mycket höga doser av lidokain kan sänkt medvetandegrad, chock, kramper och andningsproblem förekomma.

Om du vid enstaka tillfälle har applicerat Lidoposterin oftare än vad som rekommenderas, förväntas ingen ökning av biverkningar. Fortsätt i så fall användningen med rekommenderad dos och följ behandlingsanvisningarna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta ta Lidoposterin och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare):

- Hjärtklappning
- Kallsvett
- Andningssvårigheter
- Utslag
- Uppsvällt ansikte eller hals
- Yrsel eller kollaps

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Klåda och brännande känsla i analområdet. Detta kan vara en överkänslighetsreaktion.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Obehag och rodnad i analområdet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Lidoposterin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Används inom 6 månader efter första öppnandet.

Förvaras vid högst 30 °C. För att underlätta applicering rekommenderas att salvan förvaras i rumstemperatur (18 °C upp till högst 25 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lidokain.
- Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, makrogol och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lidoposterin är en vit, homogen salva.

Förpackningsstorlek: 25 g tub och applikator.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Tyskland

Telefon: +49 30 72082-0

Fax: +49 30 72082-200

E-post: info@kade.de

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Norge, Sverige: Lidoposterin

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-01-31