

Bipacksedel: Information till användaren

Lipomeg, 1000 mg mjuka kapslar omega-3-syra etylestrar 90

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lipomeg är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lipomeg
3. Hur du tar Lipomeg
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lipomeg ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lipomeg är och vad det används för

Lipomeg innehåller höggradigt renade omega-3 fleromättade fettsyror. Lipomeg tillhör en grupp som kallas 'kolesterol- och triglyceridsänkande medel'.

Lipomeg används för:

- behandling av förhöjda triglyceridnivåer (blodfettsnivåer), när förändringar i kosten inte har givit tillräcklig effekt.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lipomeg

Ta inte Lipomeg:

- om du är allergisk mot omega-3-syra etylestrar eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lipomeg:

- om du ska opereras eller nyligen har opererats;
- om du nyligen haft en fysisk skada;
- om du har njurproblem;
- om du har okontrollerad diabetes
- om du har leverproblem. Läkaren kommer att ta blodprover för att övervaka eventuella effekter av Lipomeg på din lever.
- om du är allergisk mot fisk.
- du har, eller har haft, hjärtproblem
- du utvecklar yrsel, trötthet och orkeslöshet, hjärtklappning eller andfåddhet eftersom dessa kan vara symtom på en oregelbunden och ofta mycket snabb hjärtrytm (förmaksflimmer).

Om något av det ovanstående gäller dig, prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn och ungdomar, eftersom effekt- och säkerhetsdata saknas.

Äldre personer

Det finns begränsad mängd data från användning av Lipomeg hos äldre personer över 70 år. Använd Lipomeg med försiktighet om du är över 70 år.

Andra läkemedel och Lipomeg

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder läkemedel som stoppar blodet från att bilda proppar i dina artärer, t.ex. warfarin, kan du behöva göra extra blodtester och den vanliga dosen av din blodförtunnande medicin kan behöva justeras.

Lipomeg med mat

Kapslarna ska tas i samband med en måltid. Syftet med detta är att det minskar riskerna för biverkningar i mag-tarmkanalen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta detta läkemedel om du är gravid eller ammar, såvida inte din läkare beslutar att det är absolut nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lipomeg innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 1,38 mg propylenglykol i varje kapsel.

Om ditt barn är yngre än 4 veckor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.

3. Hur du tar Lipomeg

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Svälj kapslarna med vatten.
- Ta kapslarna i samband med en måltid för att minska biverkningar i mag-tarmkanalen.
- Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska ta detta läkemedel.

Dos för behandling av höga triglyceridnivåer i blodet (höga blodfettsnivåer eller hypertriglyceridemi)

Rekommenderad dos är 2 kapslar per dag.

Om medicinen inte fungerar tillräckligt bra vid denna dos, kan läkaren öka dosen till 4 kapslar per dag.

Om du har tagit för stor mängd av Lipomeg

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, oroa dig inte, eftersom det är osannolikt att du kommer att behöva speciell behandling. Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lipomeg

Om du glömmet att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte är dags att ta nästa dos. I så fall tar du nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Lipomeg

Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga din läkare. Tala med din läkare om du inte är nöjd med effekterna av Lipomeg.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- magproblem, såsom buksvullnad, buksmärtor, förstoppning, diarré, matsmältningsrubbnings (dyspepsi), väderspänning, rapning, halsbränna, illamående och kräkningar
- Oregelbunden, snabb hjärtrytm

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- högt blodsocker
- gikt
- yrsel
- problem med smak
- huvudvärk
- lågt blodtryck
- näsblod
- blod i avföringen
- hudutslag

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- allergiska reaktioner
- röda, upphöjda kliande hudutslag (nässelutslag)
- leverrubbnings och eventuellt förändrade blodtestresultat

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal personer men den exakta frekvensen är okänd

- klåda

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Lipomeg ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Lipomeg förvaras vid högst 30 °C. Hållbarhet efter första öppnande av HDPE-burken är 120 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är omega-3-syra etylestrar 90. Varje kapsel innehåller 1000 mg omega-3-syra etylestrar 90 som består huvudsakligen av 840 mg etylestrar av eikosapentaensyra (EPA) (465 mg) och dokosaheksaensyra (DHA) (375 mg).
- Övriga innehållsämnen är alfa-tokoferol, gelatin, glycerol, mellankedjiga triglycerider och tryckfärg (sammansättningen av tryckfärgen är shellack, isopropylalkohol, propylenglykol, titandioxid, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80.)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lipomeg är en mjuk, oval, genomskinlig gelatinkapsel, som innehåller en ljusgul oljig vätska och är märkt '740'.

Lipomeg finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

- Vit, ogenomskinlig HDPE-burk med vitt, ogenomskinligt skruvlock med induktionsförslutning. Varje burk innehåller 20, 28, 100 eller 120 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Strides Pharma (Cyprus) Limited

Themistokli Dervi, 3

Julia House

1066, Nicosia

Cypern

Tillverkare

Fairmed Healthcare GmbH

Maria-Goeppert-Straße 3

23562 Lübeck

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:

Spanien Ácidos Omega-3 Strides 1000 mg cápsulas blandas EFG

Frankrike Esters éthyliques d'acides Oméga-3 Strides 1 g capsule molle

Danmark Lipomeg bløde kapsler 1000 mg

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-03-15.