Bipacksedel: Information till användaren

Lunploro 0,3 %/0,3 %/0,3 % medicinsk gas, komprimerad
kolmonoxid, metan, acetylen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Lunploro är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lunploro
3. Hur du tar Lunploro
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lunploro ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lunploro är och vad det används för

Lunploro är endast avsedd för diagnostik.
Produkten används vid testning av lungfunktionen och mäter främst lungans förmåga att absorbera inandad gas i blodomloppet och kan dessutom användas för att mäta lungvolymen och blodflödet i lungorna.
Lunploro får endast ges till patienter som är kapabla att genomgå testet, oavsett ålder.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lunploro

Ta inte Lunploro
- Om inte din läkare begär att du ska genomgå ett lungfunktionstest.
- Om du är allergisk mot kolmonoxid, metan eller acetylen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du uppvisar tecken och symtom på kolmonoxidförgiftning.

Varningar och försiktighet
Tala med din läkare innan du tar Lunploro.
Läkaren bedömer om du har några kontraindikationer för att utföra ett lungfunktionstest eller har någon sjukdom som kan utsätta dig för risk eller inverka på testet.
Under testningen ska de anvisningar som meddelas av operatören följas.
Om du tidigare har drabbats av kranskärlssjukdom kan du löpa risk för sänkning av ST-segment orsakad av kolmonoxid (visar ett onormalt värde på EKG).
En viss ökning av blodkoncentrationen för karboxyhemoglobin kan förekomma under testet.
Inandning av kolmonoxid kan orsaka symptom på minskat syreintag, t.ex. yrsel, bröstsmärtor och en känsla av förvirring. Om några symptom av detta slag skulle uppstå ska användning av denna produkt omedelbart avbrytas och medicinsk behandling ges, om så krävs.

Barn

Denna produkt bör användas med försiktighet på barn. Fråga din läkare eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Lunploro
Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Lunploro med mat, dryck och alkohol
Fråga din läkare eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare innan denna medicinska gas används.

Lunploro får endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.
Lunploro kan användas under amningsperioden.

Körförmåga och användning av maskiner
Inandning av denna medicinska gas vid testning av lungfunktionen bör inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur du tar Lunploro

Ta alltid denna medicinska gas exakt enligt anvisningar från din läkare eller sjuksköterska och endast under lungfunktionstestet. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

Hur länge lungfunktionstestet ska pågå och hur ofta testet ska upprepas får endast avgöras av din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Lunploro
Din läkare eller sjuksköterska kommer att vidta lämpliga åtgärder.
Vid inandning av denna medicinska gas under ett lungfunktionstest kan mycket osannolika symtom relaterade till själva lungfunktionstestet uppstå, t.ex. yrsel, bröstsmärta och en känsla av desorientering. Om några symptom av detta slag skulle uppstå under testproceduren ska inandning av denna medicinska gas omedelbart avbrytas och medicinsk behandling ges, om så krävs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Lunploro orsakar inga kända biverkningar.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Lunploro ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Gasflaskorna ska förvaras i ett låst och välventilerat utrymme som är reserverat för medicinska gaser.
Håll gasflaskorna rena och torra.

Används före utgångsdatum (EXP), som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några tecken på att ventilen eller gasflaskan är skadad.
Denna medicinska gas får inte slängas. Den ska returneras till leverantören. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är kolmonoxid, metan och acetylen.
Övriga hjälpämnen är syre och kväve.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Det är en luktfri och färglös gas som komprimeras i gasflaskor av aluminiumlegering.
Gasflaskans huvuddel är vit och överdelen är grön.

Kapacitet i liter	Fyllningstryck (bar)	Gasvolym i m3 (vid 1 bar och 15 °C)
10	150	1,49
11	150	1,64
20	150	2,99
50	150	7,47

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL
75 Quai d’Orsay
75007 Paris
FRANKRIKE

Tillverkare
AIR LIQUIDE MEDICAL
Tolhuisstraat 46
2627 Schelle
BELGIEN

Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:
Lunploro: Österrike, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland , Nederländerna.

Kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Air Liquide Gas AB

Pulpetgatan 20
215 37 Malmö
Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-12-18

<---------->

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:
Säkerhetsanvisningar
• Anslut endast till en anslutning som är avsedd för medicinskt bruk.
• Håll gasflaskan ren, torr och fri från olja och fett.
• Stäng av utrustningen när den inte används.
• Stäng av utrustningen i händelse av brand.
• Tryckregulatorn måste öppnas långsamt och försiktigt.
• Gasflaskor får endast användas i väl ventilerade utrymmen.
• När gasflaskan används måste den vara fäst på lämpligt sätt.
• Gasflaskor ska returneras med ett minimalt resttryck eftersom det skyddar flaskan från föroreningar.
• Efter användning ska flaskventilen stängas med normalt handtryck. Tryckavlasta regulatorn eller kopplingen.