

Bipacksedel: Information till användaren

Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar

lymecyklin (motsvarande 300 mg tetracyklinbas)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Lymecyklin Brown & Burk är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lymecyklin Brown & Burk
3. Hur du tar Lymecyklin Brown & Burk
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lymecyklin Brown & Burk ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.

1. Vad Lymecyklin Brown & Burk är och vad det används för

Lymecyklin Brown & Burk tillhör läkemedelsgruppen tetracyklinantibiotika.

Lymecyklin Brown & Burk används främst för behandling av måttlig till svår akne. Akne yttrar sig som pormaskar och kvisslor som ofta kallas finnar.

Lymecyklin angriper de bakterier som är en av de främsta orsakerna till akne. Dessa bakterier har namnet *propionibacterium acnes*.

Om du är osäker på varför denna medicin har förskrivits åt dig ska du tala med din läkare.

Lymecyklin som finns i Lymecyklin Brown & Burk kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lymecyklin Brown & Burk

Ta inte Lymecyklin Brown & Burk:

- om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
- om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot lymecyklin, den aktiva substansen i denna medicin eller mot andra tetracyklinantibiotika så som doxycyklin eller något annat innehållsämne i Lymecyklin Brown & Burk (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan bestå av antingen utslag eller klåda
- om du någonsin har haft njursjukdom.

Lymecyklin Brown & Burk får inte ges till barn under 8 år.

Lymecyklin Brown & Burk får inte tas samtidigt som mediciner som innehåller orala retinoider (dessa inkluderar vissa andra mediciner som används för att behandla akne).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Lymecklyn Brown & Burk

- om du tidigare har haft lever- eller njurproblem
- om du har systemisk lupus erythematosus (ett allergiskt tillstånd som ger ledsmärter, hudutslag eller feber) eller myasthenia gravis (ett tillstånd som försvagar musklerna)
- om du tidigare har fått utslag som reaktion på solljus eller sollampor.

Långvarig användning av antibiotika kan leda till resistent bakteriella infektioner (bakterier som orsakar infektion inte svarar på antibiotikabehandlingen).

Ta läkemedlet med tillräckliga mängder vatten för att undvika irritation och sår i matstruben.

Andra läkemedel och Lymecklyn Brown & Burk

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

Ta inte följande mediciner samtidigt som Lymecklyn Brown & Burk, eftersom dessa kan påverka hur väl din medicin fungerar. Vänta minst två till tre timmar efter att du tagit Lymecklyn Brown & Burk innan du tar dessa typer av produkter.

- medel för matsmältningsbesvär
- sårläkande läkemedel
- kinapril (mot högt blodtryck)
- kosttillskott som innehåller kalcium, aluminium, magnesium, zink eller järn
- aktivt kol, vismutkelater och sukralfat
- didanosin för HIV-infektion

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

- blodförtunnande läkemedel, t.ex., warfarin
- diuretika (används för att behandla njursjukdom, hjärtsjukdom eller högt blodtryck)
- systemiska retinoider inklusive orala retinoider (för att behandla akne, t.ex. Roaccutan), eller läkemedel som innehåller höga doser av vitamin A (se "Ta inte Lymecklyn Brown & Burk " ovan)
- om du tar någon behandling med litium kan detta läkemedel öka litiumnivåerna i ditt blod
- om du tar p-piller har de eventuellt inte tillräcklig effekt medan du tar Lymecklyn Brown & Burk, särskilt om du av någon orsak har kräkningar eller diarré. Ett extra preventivmedel (barriärmetod t.ex. kondom) bör användas för att säkerställa att du inte blir gravid. Läs bipacksedeln som medföljde dina p-piller eller tala med läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker på hur du ska göra eller hur länge du ska vidta dessa försiktighetsåtgärder

Tala om för din läkare om du ska genomgå ett ingrepp som kräver bedövning eftersom Lymecklyn Brown & Burk inte kan användas tillsammans med vissa anestesimedel t.ex. metoxifluran

Tetracyklin Brown & Burk kan leda till ett falskt positivt urintest för glukos. Tala om för din läkare om du tar Tetracykliner och behöver ta ett urinprov.

Lymecklyn Brown & Burk med mat och dryck

Upptaget av Lymecklyn Brown & Burk påverkas inte av måttliga mjölmängder. Lymecklyn Brown & Burk kapslar ska alltid tas med ett glas vatten

Graviditet och amning

Lymecklyn Brown & Burk får inte tas om du är gravid eller ammar.

Användning av mediciner som Lymecklin Brown & Burk kan påverka tillväxten hos tänder som utvecklas och leda till permanent missfärgning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Lymecklin är inte känt för att påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du tar Lymecklin Brown & Burk

Ta alltid Lymecklin Brown & Burk enligt läkarens anvisningar. Den korrekta dosen finns på etiketten som apotekspersonalen har försett förpackningen med. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 12 år

Måttlig till svår akne

Normaldosen är en lymecyklinkapsel en gång om dagen, helst på morgonen.

Hur länge du kommer att behöva ta lymecyklin beror på hur snabbt ditt tillstånd förbättras. För akne kommer detta normalt att vara minst 8 till 12 veckor. Din läkare kan besluta att fortsätta med behandlingen i högst 6 månader.

Lymecyklinkapslar ska alltid tas med ett glas vatten. De bör också tas med en lätt måltid utan mejeriprodukter.

Nedsatt njurfunktion:

Om du har njurproblem kan din läkare besluta att minska din dos.

Ge inte Lymecklin Brown & Burk till barn under 8 år eftersom det kan skada dem.

Om du har tagit för stor mängd av Lymecklin Brown & Burk

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är bra om du tar med dig förpackningen om du behöver åka till sjukhuset. Denna kan visa hur många kapslar som har tagits.

Om du har glömt att ta Lymecklin Brown & Burk

Om du har glömt att ta en dos ska du helt enkelt ta den när du kommer ihåg det och fortsätta som innan, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos av kapslar för att kompensera för en glömd kapsel. Ta aldrig fler kapslar än vad läkaren rekommenderar.

Om du slutar att ta Lymecklin Brown & Burk

Akne reagerar långsamt på antibiotika. Det är viktigt att du tar hela dosen Lymecklin Brown & Burk som läkaren ordinerat dig. Om du slutar att ta Lymecklin Brown & Burk för fort kan din akne eller infektion bli värre eller komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lymecklin Brown & Burk orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Lymecklin Brown & Burk kan orsaka följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

- illamående (känna sig sjuk)
- buksmärtor
- diarré
- huvudvärk.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) som orsakar svullnad av ögon, läppar eller tunga*
- blåsbildning och avfjällning på stora hudområden*
- sår eller skador på munnen, läpparna, områdena för könsorgan eller ändtarmsöppning*
- synstörningar
- yrsel
- kräkningar (vara illamående)
- inflammation i matstrupen (röret som transporterar mat från halsen till magsäcken), som orsakar svårigheter att svälja och smärtsam halsbränna.
- gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot)
- inflammation i levern (hepatit)
- ökad solkänslighet i huden
- ökat tryck i hjärnan
- förändringar i antalet eller typen av vissa blodceller
- smärta i övre delen av buken
- förändringar i vissa blodtester (leverfunktionstester)
- feber
- klåda, hudutslag eller nässelutslag
- inflammation i mag-tarmkanalen.
- depression
- mardrömmar

Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med den klass av läkemedel som Lymecklin Brown & Burk tillhör (tetracykliner):

- systemisk lupus erythematosus (ett allergiskt tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag eller feber).
- pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).
- förändring av blodprov (minskning av röda blodkroppar, ökning av vissa vita blodkroppar)
- ökning av urea i blodet som kan förstärkas genom att diuretika (vätskedrivande läkemedel) tas med lymecklin
- inflammation eller sårbildning i matstrupen med smärta eller svårighet att svälja eller smärtsam halsbränna
- svårighet att svälja
- inflammation i bukspottkörteln
- leverskada
- missfärgning av tänderna
- inflammation eller ömhet i tungan, munnen, kinderna, tandköttet eller läpparna
- ömhet eller klåda i området för könsorganen
- svampinfektion runt ändtarmsöppningen eller könsorganen
- tjocktarmsinfektion
- benign intrakraniell hypertoni, vars symtom kan inkludera huvudvärk, kräkningar, synstörningar (suddig syn, blindade fläckar eller dubbelseende) eller permanent synförlust har rapporterats med tetracyklinbehandling.

*Tala genast om för läkaren om du får svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och halsen, svårighet att andas, nässelutslag, blåsbildning eller avfjällning på stora hudområden, sår eller skador i munnen, på läpparna, i området för könsorganen eller ändtarmsöppningen, svår eller bestående huvudvärk, kraftigt illamående eller eventuella synstörningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan även rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Lymecyklin Brown & Burk ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En Lymecyklin Brown & Burk kapsel innehåller 408 mg av den aktiva substansen lymecyklin (motsvarande 300 mg tetracyklinbas). Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid. Kapselhöljet innehåller gelatin, titandioxid (E171), erytrosin (E127), kinolingult (E104) och indigokarmin (E132), färgen innehåller kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172), propylenglykol och shellack.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar är hårda gelatinkapslar med gul underdel och röd överdel märkt med NM.

Lymecyklin Brown & Burk kapslar är förpackade i en kartong som innehåller 28 eller 56 kapslar förpackade i blistrar. Varje blisterremsa innehåller 7 kapslar och det finns 4 eller 8 blisterremсор i varje kartong. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Brown & Burk IR Limited
22 Northumberland Road,
Ballsbridge, Dublin 4,
Irland

Tillverkare

Kinedexe UK Limited,
Unit 15 Moorcroft,
Harlington Road,
Uxbridge, UB8 3HD,
Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-12-21