

Bipacksedel: Information till användaren

Melatonin Vitabalans 1 mg tabletter

Melatonin Vitabalans 2 mg tabletter

Melatonin Vitabalans 4 mg tabletter

melatonin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Kontakta läkare om symtomen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Melatonin Vitabalans är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Melatonin Vitabalans
3. Hur du tar Melatonin Vitabalans
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Melatonin Vitabalans ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Melatonin Vitabalans är och vad det används för

Melatonin Vitabalans innehåller den aktiva substansen melatonin, som tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen. Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattritm.

Melatonin Vitabalans används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Med jetlag avses de symtom t.ex. sömnbesvär som orsakas av tidsskillnaden när man passerar flera tidszoner.

Melatonin Vitabalans rekommenderas för vuxna som flyger över minst 5 tidszoner, i synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag i samband med tidigare resor. Vid behov kan det också användas av resenärer som passerar 2–4 tidszoner.

Detta läkemedel är endast avsett för kortvarigt bruk för behandling av jetlag. Kontakta läkare om du har andra sömnbesvär som inte orsakats av jetlag.

Kontakta läkare om symtomen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

Melatonin som finns i Melatan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Melatonin Vitabalans

Ta inte Melatonin Vitabalans:

- om du är allergisk mot melatonin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Melatonin Vitabalans, om du har:

- epilepsi
- njursjukdom
- leversjukdom
- diabetes eller nedsatt glukostolerans, eftersom detta läkemedel kan öka blodsockernivån
- autoimmun sjukdom (där kroppen "angrips" av sitt eget immunsystem).

Användning av Melatonin Vitabalans rekommenderas inte om du har något av ovanstående tillstånd.

Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Melatonin Vitabalans kan dock påverkas av vissa preventivmedel, se avsnittet "Andra läkemedel och Melatonin Vitabalans" för ytterligare information.

Barn och ungdomar

Melatonin Vitabalans ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år mot symtom på jetlag eftersom säkerheten och effekten är okänd för denna användning.

Andra läkemedel och Melatonin Vitabalans

Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar följande läkemedel:

- warfarin (används för att förhindra blodproppar) - INR (koagulationstest) kan behövas för närmare kontroll.
- fluvoxamin (används för behandling av depression och tvångssyndrom)
- kinoloner och rifampicin (används vid behandling av bakterieinfektioner)
- östrogener (används i preventivmedel eller hormonersättningsbehandling)
- karbamazepin (används vid behandling av epilepsi)
- 5- eller 8-metoxipsoralener (5- och 8-MOP) (används vid behandling av hudsjukdomar såsom psoriasis)
- adrenerga agonister/antagonister (såsom vissa typer av läkemedel som används för att kontrollera blodtrycket genom att dra ihop blodkärl, slemhinneavsvällande läkemedel mot nästäppa, blodtryckssänkande läkemedel)
- opiatagonister/antagonister (såsom läkemedel som används vid behandling av drogberoende)
- prostaglandinhämmare (så kallade NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, som används mot smärta, feber och inflammation)
- läkemedel mot depression
- tryptofan (en aminosyra som bl.a. används i läkemedel som ges till patienter som behöver tillskott av näring)
- bensodiazepiner och sömnmedel av icke-bensodiazepintyp (läkemedel som används för att framkalla sömn såsom zaleplon, zolpidem och zopiklon)
- tioridazin (för behandling av schizofreni)
- imipramin (för behandling av depression)
- beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck) eftersom dessa läkemedel kan minska effekten av melatonin.
- nifedipin (för behandling av högt blodtryck) eftersom melatonin kan minska effekten av nifedipin.
- NSAID läkemedel såsom acetylsalisylsyra och ibuprofen.
- rökning kan minska effekten av melatonin.

Melatonin Vitabalans med alkohol

Drick inte alkohol innan, medan eller efter att du tar Melatonin Vitabalans eftersom det minskar effektiviteten av Melatonin Vitabalans.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonalen innan du använder detta läkemedel.

Preventivmedel för fertila kvinnor

Fertila kvinnor och unga flickor bör använda preventivmedel under behandlingen med Melatonin Vitabalans. Vissa preventivmedel kan höja melatoninnivåerna i kroppen (se avsnittet "Andra läkemedel och Melatonin Vitabalans").

Graviditet

Melatonin Vitabalans rekommenderas inte om du är gravid. Melatonin passerar moderkakan och det finns otillräcklig information om vilken risk detta kan innebära för det ofödda barnet.

Amning

Melatonin Vitabalans rekommenderas inte om du ammar. Melatonin utsöndras i bröstmjölken och risk för det ammande barnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Melatonin Vitabalans kan orsaka dåsighet och vakenhet kan påverkas i flera timmar efter intag av melatonin. Kör inte bil och använd inte maskiner efter att ha tagit melatonin.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Melatonin Vitabalans

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det är individuellt vilken dos som behövs för att få effekt. Läkemedlet finns i styrkorna 1 mg, 2 mg och 4 mg. Rekommenderad dos är 1–5 mg per dag i maximalt 5 dagar.

Hur många tabletter du kan ta beror på vilken styrka av Melatonin Vitabalans du har. Läs på förpackningen vilken styrka du har innan du tar tabletten. Om den dos du tagit första dagen inte ger önskad effekt, kan du ta en högre eller lägre dos nästföljande dag.

Maximal daglig dos är 5 mg i 5 dagar.

Den första dosen ska tas vid ankomst till destinationen vid din vanliga tid för läggdags (lokal tid).

Tidpunkten för intag av läkemedlet de följande dagarna ska också vara vid din vanliga tid för sänggående.

Tabletten ska inte tas före 20.00 eller efter 04.00 lokal tid.

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.

Ät inte mat under 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av Melatonin Vitabalans.

Om du har tagit för stor mängd av Melatonin Vitabalans

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar mer än den rekommenderade dygnsdosen kan du känna dig dåsig.

Om du har glömt att ta Melatonin Vitabalans

Om du glömmar att ta din dos vid sänggåendet och vaknar upp under natten kan du ta den glömda dosen men inte senare än klockan 04.00.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Melatonin Vitabalans

Det finns inga kända skadliga effekter av att avbryta eller avsluta behandlingen i förtid. Såvitt man känner till ger användning av Melatonin Vitabalans inte upphov till några utsättningssymtom när man slutar med behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar vid korttidsbehandling av jetlag är huvudvärk, illamående, aptitlöshet, yrsel, sömnhet under dagen och desorientering.

När det har använts mot andra sömnstörningar har melatonin rapporterats orsaka olika biverkningar.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta läkare:

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

- medvetslöshet eller svimning
- svår bröstsmärta p.g.a. kärlkramp

Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal personer)

- överkänslighetsreaktion
- svullnad i munnen eller tungan

Om du får någon av följande andra biverkningar ska du kontakta läkare och/eller uppsöka vård:

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

- irritabilitet, nervositet, rastlöshet
- sömnlöshet
- onormala drömmar, mardrömmar
- ångest
- migrän, huvudvärk
- letargi (trötthet och brist på energi)
- rastlöshet och fysisk överaktivitet
- yrsel
- trötthet
- högt blodtryck
- buksmärta
- bröstsmärta
- matsmältningsbesvär
- sår i munnen, muntorrhet
- illamående
- förändringar i blodets sammansättning som kan ge en gulfärgning av hud och ögon
- hudinflammation
- nattliga svettningar
- klåda, utslag, torr hud
- smärta i armar och ben
- utsöndring av glukos i urinen
- ökad proteinhalt i urinen
- klimakteriesymptom
- kraftlöshet
- avvikande leverfunktion

- viktökning.

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

- bältros
- förhöjda blodfetter
- depression
- förändrad sinnesstämning
- aggressivitet, oro (agitation)
- gråtmildhet
- stressymtom
- tidigt uppvaknande på morgonen
- ökad sexualdrift
- nedstämdhet
- desorientering
- minnesnedsättning
- uppmärksamhetsstörning
- drömmande tillstånd
- rastlösa ben-syndrom
- dålig sömnkvalitet
- förnimmelse av domningar och stickningar
- hjärtklappning
- synstörningar, rinnande ögon
- svindel
- yrsel när man står eller sitter
- värmevallningar
- sura uppstötningar
- magstörning
- blåsor i munnen, sår på tungan
- magbesvär, kräkning
- onormala tarmljud
- väderspänning
- ökad salivutsöndring, dålig andedräkt
- obehag i bukområdet
- magtarmsjukdom, inflammation i magslemhinnan
- psoriasis
- eksem
- hudutslag
- hudinflammation på händerna
- kliande utslag
- nagelrubbing
- ledinflammation
- muskelkramper
- nacksmärta
- nattliga muskelkramper
- blod i urinen
- riklig utsöndring av urin
- ökat behov att urinera på natten
- långvarig erektion som kan vara smärtsam
- inflammation i prostata
- utmattning
- smärtor
- törst
- minskat antal vita blodkroppar
- minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning eller blånader

- förhöjda leverenzymvärden
- avvikande blodelektrolyter
- avvikande resultat vid laboratorieundersökningar.

Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal personer)

- svullnad i huden
- onormal utsöndring av mjölk.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Melatonin Vitabalans ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

1 mg tabletter i blisterförpackning:

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

1 mg tabletter i burk och 2 mg och 4 mg tabletter i blisterförpackning och i burk:

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är melatonin.

En tablett innehåller 1 mg, 2 mg eller 4 mg melatonin.

Övriga innehållsämnen är:

kalciumpvåtefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 mg tablett: vit till beigefärgad kapselformad tablett, 5 mm x 10 mm.

2 mg tablett: vit till beigefärgad, rund, konvex tablett, 6 mm i diameter.

4 mg tablett: vit till beigefärgad, rund, konvex tablett, 7 mm i diameter.

10 tabletter i blisterförpackningar (PVC/Aluminium).

10 tabletter i plastburk med plastlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vitalans Oy

Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Finland

Detta läkemedel är godkänt för försäljning i EEAs medlemsstater under följande namn:
Melatonin Vitabalans: Sverige, Danmark, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-02-28