

Bipacksedel: Information till användaren

Nix, 1%, schampo permetrin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om behandlingen inte ger effekt.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Nix är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nix
3. Hur du använder Nix
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nix ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nix är och vad det används för

Nix innehåller som verksamt ämne permetrin, som påverkar nervsystemet hos huvudlöss. Detta leder till att lössen och deras ägg dör.

Nix används vid behandling av huvudlöss. Ett vanligt symtom på huvudlöss är klåda i hårbotten. Man kan också finna svart lusavföring och lusskinn på kragen eller kudden.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nix

Använd inte Nix:

om du är allergisk mot permetrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot pyretriner eller andra pyretroider.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nix om du samtidigt lider av någon annan typ av hudsjukdom.

Huvudlöss kan som andra insekter utveckla motståndskraft mot de produkter som används. Otillräckligt genomförda behandlingar och behandlingar som görs ”för säkerhets skull” ökar risken för att lössen blir motståndskraftiga mot lusmedel. Utebliven effekt kan bero på felaktig behandling, återsmitta eller motståndskraftiga löss. Det är viktigt att man följer

doseringsanvisningen noga. Observera att levande löss kan ses i håret direkt efter behandlingen. Detta behöver inte vara ett tecken på att lössen blivit motståndskraftiga, eftersom det kan ta en stund för lössen att dö efter behandlingen.

Effekten av produkten på färgat, blekt eller permanentat hår har inte studerats. Reklamationer av detta slag är extremt ovanliga, men en god idé är att först behandla en liten del av håret innan hela hårbotten behandlas.

Nix påverkas inte av klor i simbassänger, aktiviteter där kan fortsätta efter behandlingen.

Barn

Till barn under 6 månader får Nix endast användas efter läkarordination.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenhet om användningen av permetrin hos gravida kvinnor är begränsad och därför ska behandling under graviditet övervägas endast om det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om permetrin utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avstå från behandling med Nix. Tala med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Nix påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Nix innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, propylenglykol, cetylalkohol och stearalkoniumklorid.

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Detta läkemedel innehåller 0,78 mg propylenglykol per ml vilket motsvarar 46 mg per flaska (59 ml).

Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Stearalkoniumklorid kan orsaka hudirritation. Detta läkemedel innehåller 31,5 mg stearalkoniumklorid per ml vilket motsvarar 1 858,5 mg per flaska (59 ml).

3. Hur du använder Nix

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

Vid misstanke om att någon i familjen har huvudlöss, bör hela familjen undersökas. Undersökningen görs med hjälp av luskam och förstöringsglas. Endast de personer som har levande löss eller ägg intill hårbotten ska behandlas med Nix.

Familjemedlemmar som inte har löss bör fortsätta att kamma håret med luskam för att kontrollera att smittan inte sprids. Huvudlöss smittar framförallt vid direkt huvud-huvudkontakt. För att undvika att bli smittad på nytt är det viktigt att ta reda på varifrån lössen kommer så att alla i omgivningen som har löss kan behandlas. Barn som nyligen blivit

smittade och vuxna personer med löss saknar ofta symtom. De kan därför vara en viktig smittkälla.

Kammar, borstar och mössor bör rengöras noga för att undvika att smitta sprids via dem. Annan städning och rengöring av föremål är inte nödvändig.

Dosering

Vuxna och barn över 6 månader: 1 flaska räcker till behandling av en person med axellångt hår. Alla i familjen/omgivningen som har löss bör behandlas samtidigt.

Till barn under 6 månader får Nix endast användas efter läkarordination.

Nix är endast för utvärtes bruk.

Undvik att få preparatet i ögonen även om Nix inte irriterar ögonen. Om så sker bör man genast skölja med rikligt med vatten eller koksaltlösning.

Vissa personer, t ex personer med funktionsnedsättning och äldre människor kan behöva hjälp för att kunna utföra behandlingen rätt.

Personer som utför många behandlingar i följd bör använda handskar för att undvika irritation av huden.

Bruksanvisning

1. Tvätta först håret med vanligt schampo. Använd inte balsam eller kombinerade schampo/balsam produkter. Medicinska schampon med låga pH-värden är inte heller lämpliga. Efter sköljning torkas håret noga med handduk. Håret ska vara fuktigt, inte blött.



2. Skaka flaskan med Nix schampo ordentligt före användning. Gör benor i håret, börja vid ena sidan av huvudet. Applicera Nix i benan och massera noga. Fortsätt tills hela huvudet har behandlats. Det är viktigt att Nix kommer ordentligt ner i hårbotten. Speciellt viktiga områden är bakom öronen och i nacken. Se därefter till så att Nix fördelas över resterande hår.



3. Låt Nix verka i 10 minuter. Skölj omsorgsfullt med vatten och torka sedan håret med en ren handduk.



4. Medan håret ännu är vått avlägsnas döda löss med hjälp av den i förpackningen medföljande finkammen. Äggen sitter fastlimmade på hårstrån och kan vara svåra att få bort.



Behandlingen upprepas efter 7-10 dagar. Noggrann kamning med finkammen bör fortsätta varje dag i två veckor efter behandlingen, för att avlägsna eventuellt nykläckta löss. Nix har en kvardröjande effekt under ca 14 dagar. Man kan tvätta håret som vanligt under denna tid.

Om behandlingen inte ger effekt, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för att få råd om annan behandling.

Om du har använt för stor mängd av Nix

Om du använt för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom som har rapporterats vid oavsiktlig sväljning eller överdriven användning är illamående, kräkningar, yrsel och kramper.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare*): Lätt svullnad i hårbotten.

Sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare*): Sveda och stickningar.

Klåda, rodnad och hudutslag har rapporterats men kan också vara orsakade av lusangreppet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Nix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är permetrin. 1 ml schampo innehåller 10 mg permetrin.
- Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, stearalkoniumklorid, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat), kollagenhydrolysat, hydroxietylcellulosa, propylenglykol, citronsyra, ceteth 10 (BRIJ-56), cetylalkohol, kanadabalsam, färgämne (para-orange E110), parfym och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastflaska med 59 ml schampo.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Medgenix Benelux NV, Wevelgem, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-07-02