

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Olimel N7E, infusionsvätska, emulsion**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan läkemedlet ges till dig. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande**

1. Vad Olimel N7E är och vad den används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Olimel N7E
3. Hur Olimel N7E ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Olimel N7E ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Olimel N7E är och vad den används för**

Olimel N7E är en infusionsvätska, emulsion. Den tillhandahålls i en påse med tre sektioner.

En sektion innehåller en glukoslösning med kalcium, den andra innehåller en lipidemulsion och den tredje innehåller en aminosyralösning med elektrolyter.

Olimel N7E används för att ge näring till vuxna och barn över två års ålder genom en slang i en ven (infusion) när normalt näringsintag via munnen inte är lämpligt.

Olimel N7E får endast användas under medicinsk övervakning.

#### **2. Vad du behöver veta innan du ges Olimel N7E**

##### **Använd inte Olimel N7E:**

- till för tidigt födda barn, nyfödda och barn yngre än 2 år.
- om du är allergisk (överkänslig) mot ägg, sojabönsprotein, jordnötsprotein eller majs/majsprodukter (se också avsnitt "Varningar och försiktighet" nedan) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du vet med dig att din kropp inte kan utnyttja vissa aminosyror.
- om du har särskilt höga fettnivåer i blodet.
- om du har hyperglykemi (för mycket socker i blodet).
- om du har en onormalt hög plasmakoncentration av någon elektrolyt (natrium, kalium, magnesium, kalcium och/eller fosfor).

I alla lägen kommer läkaren att grunda sitt beslut om du bör få detta läkemedel på faktorer som ålder, vikt och medicinska tillstånd, tillsammans med resultat från eventuella tester som utförts.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller sjuksköterska innan Olimel N7E ges till dig.

Om du får nutritionslösningar via infusion (TPN) för snabbt kan det leda till skada eller dödsfall.

Infusionen måste avbrytas omedelbart om några onormala tecken eller symtom på allergisk reaktion (som svettning, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag eller svårighet att andas) utvecklas. Den här produkten innehåller sojabönsolja och äggfosfolipider. Sojabönsprotein och äggprotein kan i sällsynta fall orsaka överkänslighetsreaktioner. Korsallergiska reaktioner mellan sojabönsprotein och jordnötsprotein har observerats.

Olimel N7E innehåller glukos som framställts av majs. Det kan orsaka överkänslighet (allergiska reaktioner) om du är allergisk mot majs eller majsprodukter (se avsnitt “Använd inte Olimel N7E” ovan).

Andningssvårigheter kan också vara ett tecken på att små partiklar har bildats som blockerar blodkärl i lungorna (utfällningar i lungkärlen). Om du upplever andningssvårigheter, tala med läkare eller sjuksköterska. De kommer att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

Ceftriaxon (ett antibiotikum) får inte blandas eller ges tillsammans med lösningar som innehåller kalcium (inklusive Olimel N7E) via dropp i en ven. Dessa läkemedel får inte ges tillsammans, inte ens om olika infusionsslangar eller infusionsställen används. Din läkare kan ge dig Olimel N7E och ceftriaxon efter varandra om infusionsslangar vid olika infusionsställen används eller om infusionsslangen byts ut eller spolas noggrant med fysiologisk koksaltlösning mellan infusionerna för att undvika utfällning (partiklar som bildats av ceftriaxon-kalciumsalt).

Vissa mediciner och sjukdomstillstånd kan öka risken för att utveckla en infektion eller sepsis (bakterier i blodet). Risken för infektion eller sepsis är särskilt stor när en slang (intravenös kateter) förs in i venen. Läkaren kommer att övervaka dig noggrant och vara uppmärksam på eventuella tecken på infektion. Patienter som behöver parenteral nutrition (näringstillförsel genom en slang i venen) kan löpa större risk för att utveckla infektion på grund av sitt sjukdomstillstånd. Risken för infektion kan minskas genom att man använder “aseptisk teknik” (“bakteriefri teknik”) när man placerar och sköter om katetern och när man bereder näringslösningen (TPN).

Om du är allvarligt undernärld så att du behöver få näring genom en ven kommer din läkare att börja behandlingen långsamt. Din läkare kommer också att noggrant övervaka dig för att undvika plötsliga förändringar i vätske-, vitamin-, elektrolyt och mineralnivåerna.

Balansen mellan vatten och salt i kroppen och rubbningar i ämnesomsättningen kommer att rättas till före infusionen. Läkaren övervakar ditt tillstånd medan du får läkemedlet och kan ändra dosen eller ge dig ytterligare näringsämnen, t.ex. vitaminer, elektrolyter och spårämnen om han/hon finner det lämpligt.

Leversjukdomar, inkluderande problem med att göra sig av med gallan (kolestas), fettlever, fibros (bindvävsbildning), som kan leda till leversvikt, liksom gallblåseinflammation och gallsten i gallblåsan, har rapporterats hos patienter som får intravenös näring. Orsaken till dessa sjukdomar anses bero på flera faktorer och kan variera mellan olika patienter. Om du får symtom som illamående, kräkningar, buksmärter, gulfärgning av hud eller ögon, kontakta din läkare för att identifiera möjliga orsaker och bidragande faktorer och möjliga behandlingar och förebyggande åtgärder.

Läkaren ska känna till följande tillstånd:

- allvarliga problem med njurarna. Informera även din läkare om du får dialys eller annan typ av rening av blodet
- allvarliga leverproblem
- problem med blodkoagulationen
- binjurar som inte fungerar som de ska (binjuresvikt). Binjurarna är triangelformade körtlar som sitter ovanpå njurarna.
- hjärtsvikt
- lungsjukdom
- vattenansamling i kroppen (hyperhydrering)
- otillräcklig mängd vatten i kroppen (dehydrering)
- högt blodsocker (diabetes mellitus) som inte behandlas
- hjärtattack eller chock på grund av plötslig hjärtsvikt
- allvarlig metabolisk acidosis (när blodet är för surt)
- generaliserad infektion (sepsis)
- koma.

För att kontrollera effekten och kontinuerligt övervaka att infusionen sker säkert utför läkaren kliniska tester och laborietester medan du får detta läkemedel. Om du får detta läkemedel i flera veckor övervakas din blodstatus regelbundet.

Om din kropp har nedsatt förmåga att göra sig av med fetterna i detta läkemedel kan "fettöverblastningssyndrom" uppkomma (se avsnitt 4 – Eventuella biverkningar).

Om infusionsstället ömmar, bränns eller svullnar under infusionen, eller om infusionen läcker, ska du berätta det för läkaren eller sjuksköterskan. Infusionen avbryts omedelbart och påbörjas i en annan ven.

Om ditt blodsocker blir för högt ska läkaren justera hastigheten för infusionen av Olimel N7E eller ge dig läkemedel som kontrollerar blodsockret (insulin).

Olimel N7E kan endast ges via en slang (kateter) i en stor ven i bröstet (centralven).

### **Barn och ungdomar**

Om ditt barn är under 18 år kommer särskild försiktighet vidtas för att ge rätt dos. Fler säkerhetsåtgärder kommer också att vidtas, eftersom barn har en högre känslighet för infektioner. Tillsatser av vitaminer och spårämne krävs alltid. Läkemedelsformer som är anpassade till barn ska användas.

### **Andra läkemedel och Olimel N7E**

Tala om för läkare om du tar eller använder eller nyligen har tagit eller använt eller kan tänkas ta eller använda andra läkemedel.

I normala fall är det inga problem att använda andra läkemedel samtidigt med detta läkemedel. Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana för att kontrollera att de går bra att ta samtidigt.

Tala om för din läkare om du använder eller får något av följande läkemedel:

- Insulin
- Heparin.

Olimel N7E får inte ges samtidigt som blod genom samma slang.

Olimel N7E innehåller kalcium. Det får inte ges tillsammans med eller genom samma slang som ceftriaxon (ett antibiotikum) eftersom partiklar då kan bildas. Om samma slang används för att ge dig dessa läkemedel efter varandra ska den sköljas noggrant.

Olimel N7E får inte ges i samma infusionslinje eller blandas tillsammans med ampicillin (antibiotikum) eller fosfentoin (antiepileptika) på grund av risken för utfällning.

Oliv- och sojabönsoljan i Olimel N7E innehåller K-vitamin. Detta påverkar normalt inte blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) såsom kumarin, men du ska tala om för läkaren om du tar blodförtunnande läkemedel

Fetterna i denna blandning kan påverka resultaten av vissa laboratorietester om blodprov tas innan fetterna har försvunnit från ditt blodomlopp (vanligtvis har de försvunnit 5 till 6 timmar efter att infusionen avslutats).

Olimel N7E innehåller kalium. Särskild försiktighet bör iaktas för patienter som tar diuretika, ACE -hämmare eller angiotensin II-receptorantagonister (läkemedel mot högt blodtryck) eller immunsuppressiva läkemedel. Dessa typer av läkemedel kan öka kaliumnivåerna i blodet.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

Det saknas tillräckliga data från användningen av Olimel N7E hos gravida kvinnor och kvinnor som ammar. Vid behov kan Olimel N7E övervägas som behandling under graviditet och amning. Olimel N7E ska endast ges till gravida och ammande kvinnor efter noggrant övervägande.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Ej relevant.

## **3. Hur Olimel N7E ges**

### **Dosering**

Olimel N7E ska endast ges till vuxna och barn över två år.

Olimel N7E är en infusionsvätska, emulsion som ges via en slang (kateter) in i en ven i bröstet.

Olimel N7E ska anta rumstemperatur före användning.

Olimel N7E är endast för engångsbruk.

Att ge en påse via infusion tar vanligtvis mellan 12 och 24 timmar.

### **Dosering – vuxna**

Läkaren anger en flödeshastighet som motsvarar dina behov och ditt kliniska tillstånd.

Behandlingen kan fortsätta så länge som det behövs, beroende på ditt kliniska tillstånd.

### **Dosering – barn över 2 års ålder och ungdomar**

Läkaren avgör vilken dos och under hur lång tid läkemedlet ska ges. Det beror på ålder, vikt, längd, medicinskt tillstånd och kroppens förmåga att bryta ner och tillgodogöra sig innehållsämnen i Olimel N7E.

### **Om du har fått för stor mängd av Olimel N7E**

Om dosen är för hög eller infusionen sker för snabbt kan aminosyror göra blodet för surt, och tecken på hypervolemi (ökning av cirkulerande blodvolym) kan uppkomma. Glukosnivåerna i blodet och urinen kan öka, hyperosmolärt syndrom (för hög viskositet i blodet) kan utvecklas och fettinnehållet kan öka triglyceridmängden i blodet. En alltför snabb infusion eller stor volym av Olimel N7E kan framkalla illamående, kräkningar, frossa, huvudvärk, värmevallningar, överdriven svettning (hyperhidros) och störningar i elektrolytbalansen. Om något av detta inträffar måste infusionen avbrytas omedelbart.

I vissa allvarliga fall kan läkaren behöva ge tillfällig njurdialys för att hjälpa njurarna att göra sig av med överskottsprodukten.

För att förhindra detta kommer läkaren övervaka ditt tillstånd och testa dina blodvärden regelbundet.

Rådfråga läkare vid ytterligare frågor om hur man använder denna produkt.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker någon förändring i hur du mår under eller efter behandlingen, kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska.

Testerna som läkaren utför medan du tar detta läkemedel ska minimera risken för biverkningar.

Om några onormala tecken eller symtom på allergisk reaktion utvecklas, t.ex. svettning, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag eller andningssvårigheter, ska infusionen avbrytas omedelbart.

Följande biverkningar har rapporterats för Olimel N7E:

*Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare*

- Hjärtklappning (takykardi)
- Nedsatt aptit
- Ökad koncentration av fett i blodet (hypertriglyceridemi)
- Buksmärtor
- Diarré
- Illamående
- Förhöjt blodtryck (hypertoni).

*Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare*

- Överkänslighetsreaktioner inklusive svettning, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag (hudrodnad (erytematös), knottig hud (papulös), varblåsor i huden (pustulös), fläckig hud (makulär), generaliserat utslag), klåda, värmevallningar, andningssvårigheter

- Infusionsläckage till omgivande vävnad (extravasation) som kan ge smärta, irritation, svullnad/ödem, rodnad (erytem)/hetta, döda vävnadsceller (hudnekros) eller blåsor/vesiklar, inflammation, förtjockad eller stramande hud
- Kräkningar.

Följande biverkningar har rapporterats för liknande läkemedel för parenteral nutrition:

*Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*

- Försämrad förmåga att göra sig av med fetter (fettöverbelastningssyndrom) som är förenat med en plötslig och abrupt försämring av patientens medicinska tillstånd. Följande tecken på fettöverbelastningssyndrom försvinner oftast när infusionen av lipidemulsionen stoppas:
  - o Feber
  - o Minskat antal röda blodkroppar som kan leda till blek hud, svaghet och andfåddhet (anemi)
  - o Lågt antal vita blodkroppar, vilket kan öka infektionsrisken (leukopeni)
  - o Lågt antal blodplättar, vilket kan öka risken för blåmärken och/eller blödningar (trombocytopeni)
  - o Koaguleringsjukdomar som påverkar blodets koagulationsförmåga
  - o Höga fettnivåer i blodet (hyperlipidemi)
  - o Inlagring av fett i levern (hepatomegali)
  - o Försämrad leverfunktion
  - o Symtom i centrala nervsystemet (t.ex. koma).

*Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare*

- Allergiska reaktioner
- Onormala blodtester för kontroll av leverns funktion
- Problem med att göra sig av med gallan (kolestas)
- Förstorad lever (hepatomegali)
- Leversjukdom i samband med parenteral nutrition (näringstillförsel genom en slang i venen) (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet")
- Ikterus (gulsot)
- Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
- Ökade kvävenivåer i blodet (azotemi)
- Förhöjda leverenzymmer
- Bildande av små partiklar som kan blockera blodkärl i lungorna (utfällningar i lungkärlen) och orsaka lungemboli och andningssvårigheter.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## 5. Hur Olimel N7E ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på behållaren och den yttre förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterpåsen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i varje påse av färdigberedd emulsion är 11,1 % (motsvarar 11,1 g/100 ml) L-aminosyralösning (alanin, arginin, glycin, histidin, isoleucin, leucin, lysin (som lysinacetat), metionin, fenylalanin, prolin, serin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin, asparaginsyra, glutaminsyra) med elektrolyter (natrium, kalium, magnesium, fosfat, acetat, klorid), 20 % (motsvarar 20 g/100 ml) lipidemulsion (raffinerad olivolja och raffinerad sojaolja) och 35 % (motsvarar 35 g/100 ml) glukoslösning (som glukosmonohydrat) med kalcium.

Övriga innehållsämnen är:

| Sektion med lipidemulsion                                                                                       | Sektion med aminosyralösning                                            | Sektion med glukoslösning                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Renad äggfosfolipider, glycerol, natriumoleat, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor | Koncentrerad ättiksyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor | Saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor |

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Olimel N7E är en infusionsvätska, emulsion förpackad i en påse med tre sektioner. En sektion innehåller en fettemulsion, den andra en aminosyralösning med elektrolyter och den tredje en glukoslösning med kalcium. Sektionerna separeras av icke-permanenta förseglingar. Före administrering ska innehållet i sektionerna blandas genom att rulla ihop påsen med början från den övre änden tills förseglingarna är öppna.

### Utseende före blandning:

- aminosyra- och glukoslösningarna är klara, färglösa eller lätt gulfärgade.
- fettemulsionen är homogen och mjölkaktig.

**Utseende efter blandning:** homogen mjölkaktig blandning.

Påsen med tre sektioner är tillverkad i flerskiktad plast. Påsmaterialets inre skikt (kontaktskiktet) är utformat så att det är kompatibelt med innehållsämnen och de godkända tillsatserna.

För att undvika kontakt med syre från luften är påsen förpackad i en ytterpåse som syrebarriär. Den innehåller en liten påse med en syreabsorberare.

### **Förpackningsstorlekar**

1000 ml påse: 1 kartong med 6 påsar, 1 kartong med 5 påsar  
1500 ml påse: 1 kartong med 4 påsar, 1 kartong med 5 påsar  
2000 ml påse: 1 kartong med 4 påsar, 1 kartong med 5 påsar  
1 påse à 1 000 ml, 1500 ml och 2000 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Baxter Medical AB  
Box 3090  
103 61 Stockholm

### **Tillverkare**

Baxter S.A.  
Boulevard René Branquart, 80  
7860 Lessines  
Belgien

### **Denna bipacksedel ändrades senast 2026-05-01**

.....

### **Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:**

Farmakoterapeutisk grupp: Lösningar för parenteral nutrition/blandningar  
ATC-kod: B05 BA10.

## **A. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

Olimel N7E tillhandahålls i en påse med 3 sektioner.

Varje påse innehåller en glukoslösning med kalcium, en lipidemulsion och en aminosyralösning med elektrolyter.

|                                                   | <b>Innehåll per påse</b> |                |                |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                   | <b>1000 ml</b>           | <b>1500 ml</b> | <b>2000 ml</b> |
| 35 % glukoslösning (motsvarar 35 g/100 ml)        | 400 ml                   | 600 ml         | 800 ml         |
| 11,1 % aminosyralösning (motsvarar 11,1 g/100 ml) | 400 ml                   | 600 ml         | 800 ml         |
| 20 % lipidemulsion (motsvarar 20 g/100 ml)        | 200 ml                   | 300 ml         | 400 ml         |

Sammansättning hos den färdigberedda emulsionen efter att de tre sektionerna blandats:

| <b>Aktiva substanser</b>                               | <b>1000 ml</b> | <b>1500 ml</b> | <b>2000 ml</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raffinerad olivolja + raffinerad sojaolja <sup>a</sup> | 40,00 g        | 60,00 g        | 80,00 g        |
| Alanin                                                 | 6,41 g         | 9,61 g         | 12,82 g        |
| Arginin                                                | 4,34 g         | 6,51 g         | 8,68 g         |

|                                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Asparaginsyra                          | 1,28 g                 | 1,92 g                 | 2,56 g                 |
| Glutaminsyra                           | 2,21 g                 | 3,32 g                 | 4,42 g                 |
| Glycin                                 | 3,07 g                 | 4,60 g                 | 6,14 g                 |
| Histidin                               | 2,64 g                 | 3,97 g                 | 5,29 g                 |
| Isoleucin                              | 2,21 g                 | 3,32 g                 | 4,42 g                 |
| Leucin                                 | 3,07 g                 | 4,60 g                 | 6,14 g                 |
| Lysin<br>(motsvarar lysinacetat)       | 3,48 g<br>(4,88 g)     | 5,23 g<br>(7,31 g)     | 6,97 g<br>(9,75 g)     |
| Metionin                               | 2,21 g                 | 3,32 g                 | 4,42 g                 |
| Fenylalanin                            | 3,07 g                 | 4,60 g                 | 6,14 g                 |
| Prolin                                 | 2,64 g                 | 3,97 g                 | 5,29 g                 |
| Serin                                  | 1,75 g                 | 2,62 g                 | 3,50 g                 |
| Treonin                                | 2,21 g                 | 3,32 g                 | 4,42 g                 |
| Tryptofan                              | 0,74 g                 | 1,10 g                 | 1,47 g                 |
| Tyrosin                                | 0,11 g                 | 0,17 g                 | 0,22 g                 |
| Valin                                  | 2,83 g                 | 4,25 g                 | 5,66 g                 |
| Natriumacetat, trihydrat               | 1,50 g                 | 2,24 g                 | 2,99 g                 |
| Natriumglycerofosfat, hydratiserat     | 3,67 g                 | 5,51 g                 | 7,34 g                 |
| Kaliumklorid                           | 2,24 g                 | 3,35 g                 | 4,47 g                 |
| Magnesiumklorid, hexahydrat            | 0,81 g                 | 1,22 g                 | 1,62 g                 |
| Kalciumklorid, dihydrat                | 0,52 g                 | 0,77 g                 | 1,03 g                 |
| Glukos<br>(motsvarar glukosmonohydrat) | 140,00 g<br>(154,00 g) | 210,00 g<br>(231,00 g) | 280,00 g<br>(308,00 g) |

<sup>a</sup> Blandning av raffinerad olivolja (cirka 80 %) och raffinerad sojaolja (cirka 20 %) motsvarande en kvot essentiella fettsyror/fettsyror totalt på 20 %.

Övriga hjälpämnen är:

| Sektion med lipidemulsion                                                                                       | Sektion med aminosyra-lösning och elektrolyter                          | Sektion med glukoslösning                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Renad äggfosfolipider, glycerol, natriumoleat, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor | Koncentrerad ättiksyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor | Saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor |

Näringsintag för färdigberedd emulsion per påsstorlek:

|                                 | 1000 ml    | 1500 ml   | 2000 ml    |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| Lipider                         | 40 g       | 60 g      | 80 g       |
| Aminosyror                      | 44,3 g     | 66,4 g    | 88,6 g     |
| Kväve                           | 7,0 g      | 10,5 g    | 14,0 g     |
| Glukos                          | 140,0 g    | 210,0 g   | 280,0 g    |
| Energi:                         |            |           |            |
| Kalorier totalt (cirka)         | 1140 kcal  | 1710 kcal | 2270 kcal  |
| Icke-proteinkalorier            | 960 kcal   | 1440 kcal | 1920 kcal  |
| Glukoskalorier                  | 560 kcal   | 840 kcal  | 1120 kcal  |
| Lipidkalorier <sup>a</sup>      | 400 kcal   | 600 kcal  | 800 kcal   |
| Icke-proteinkalorier/kväve-kvot | 137 kcal/g | 137kcal/g | 137 kcal/g |

|                               |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Glukos-/lipidkalorier-kvot    | 58/42       | 58/42       | 58/42       |
| Lipidkalorier/kalorier totalt | 35 %        | 35 %        | 35 %        |
| Elektrolyter:                 |             |             |             |
| Natrium                       | 35,0 mmol   | 52,5 mmol   | 70,0 mmol   |
| Kalium                        | 30,0 mmol   | 45,0 mmol   | 60,0 mmol   |
| Magnesium                     | 4,0 mmol    | 6,0 mmol    | 8,0 mmol    |
| Kalcium                       | 3,5 mmol    | 5,3 mmol    | 7,0 mmol    |
| Fosfat <sup>b</sup>           | 15,0 mmol   | 22,5 mmol   | 30,0 mmol   |
| Acetat                        | 45 mmol     | 67 mmol     | 89 mmol     |
| Klorid                        | 45 mmol     | 68 mmol     | 90 mmol     |
| pH-värde                      | 6,4         | 6,4         | 6,4         |
| Osmolaritet                   | 1360 mOsm/l | 1360 mOsm/l | 1360 mOsm/l |

<sup>a</sup> Inkl. kalorier från renade äggfosfolipider.

<sup>b</sup> Inkl. fosfat som kommer från lipidemulsionen.

## B. DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

### Dosering

Olimel N7E rekommenderas inte till barn under 2 år beroende på olämplig sammansättning och volym (se avsnitt 4.4, 5.1 och 5.2 i produktresumén).

Den maximala dagliga dosen som nämns nedan bör ej överskridas. På grund av flerkammarpåsens fasta komposition, kan patientens totala nutritionsbehov inte alltid tillgodoses. Vid vissa kliniska situationer kan patienten behöva en dos näringsämnen som inte täcks av påsens fasta sammansättning. I en sådan situation måste volym (dos)- justeringens effekt på doseringen av alla övriga näringsämnen i Olimel N7E beaktas.

#### Till vuxna

Doseringen beror på patientens energiförbrukning, kliniska status, kroppsvikt och förmåga att metabolisera innehållsämnen i Olimel N7E, liksom på extra energi- eller proteintillskott som ges oralt/enteralt. Därför skall påsstorleken väljas i enlighet med detta.

De genomsnittliga dagliga behoven är:

- 0,16 till 0,35 g kväve/kg kroppsvikt (1 till 2 g aminosyror/kg), beroende på patientens nutritionsstatus och graden av katabolism
- 20 till 40 kcal/kg
- 20 till 40 ml vätska/kg eller 1 till 1,5 ml per förbrukad kcal.

För Olimel N7E bestäms den maximala dagliga dosen av totala kaloriintaget, 40 kcal/kg som ingår i volymen 35 ml/kg, vilket motsvarar 1,5 g/kg aminosyror, 4,9 g/kg glukos, 1,4 g/kg lipider, 1,2 mmol/kg natrium och 1,1 mmol/kg kalium. För en patient som väger 70 kg skulle detta motsvara 2 450 ml Olimel N7E per dag, vilket resulterar i ett intag på 108 g aminosyror, 343 g glukos och 98 g lipider (dvs. 2 352 icke-proteinkalorier och 2 793 kalorier totalt).

I normala fall behöver flödes hastigheten ökas gradvis under den första timmen och sedan anpassas med hänsyn till dosen, den dagliga tillförda volymen och infusionens varaktighet.

För Olimel N7E är den maximala infusionshastigheten 1,7 ml/kg/timme, motsvarande 0,08 g/kg/timme aminosyror, 0,24 g/kg/timme glukos och 0,07 g/kg/timme lipider

### Till barn över 2 års ålder och ungdomar

Inga studier har genomförts för den pediatrika populationen.

Doseringen beror på patientens energiförbrukning, kliniska status och kroppsvikt och förmåga att metabolisera innehållsämnen i Olimel N7E, liksom extra energi- eller proteintillskott som ges oralt/enteralt. Därför skall påsstorleken väljas i enlighet med detta.

Dessutom minskar dagsbehovet av vätska, kväve och energi med åldern. Två åldersgrupper beaktas, 2 till 11 år och 12 till 18 år.

För Olimel N7E är den begränsande faktorn för båda åldersgrupperna som nämns ovan magnesiumkoncentration med avseende på daglig dos och glukoskoncentrationen med avseende på infusionshastigheten. Det resulterar i följande intag:

|                                             | 2 till 11 år                |                       | 12 till 18 år               |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                             | Rekommendation <sup>a</sup> | Olimel N7E max. volym | Rekommendation <sup>a</sup> | Olimel N7E max. volym |
| <b>Beståndsdel</b>                          |                             |                       |                             |                       |
| <b>Maximala dagliga doser</b>               |                             |                       |                             |                       |
| Vätska (ml/kg/dag)                          | 60 – 120                    | 25                    | 50 – 80                     | 25                    |
| Aminosyror (g/kg/dag)                       | 1 – 2 (upp till 2,5)        | 1,1                   | 1 – 2                       | 1,1                   |
| Glukos (g/kg/dag)                           | 1,4 – 8,6                   | 3,5                   | 0,7 – 5,8                   | 3,5                   |
| Lipider (g/kg/dag)                          | 0,5 – 3                     | 1,0                   | 0,5 – 2 (upp till 3)        | 1,0                   |
| Energi totalt (kcal/kg/dag)                 | 30 – 75                     | 28,5                  | 20 – 55                     | 28,5                  |
| <b>Maximal infusionshastighet per timme</b> |                             |                       |                             |                       |
| Olimel N7E (ml/kg/timme)                    |                             | 2,6                   |                             | 1,7                   |
| Aminosyror (g/kg/timme)                     | 0,2                         | 0,11                  | 0,12                        | 0,08                  |
| Glukos (g/kg/timme)                         | 0,36                        | 0,36                  | 0,24                        | 0,24                  |
| Lipider (g/kg/timme)                        | 0,13                        | 0,10                  | 0,13                        | 0,07                  |

<sup>a</sup> Rekommenderade värden från ESPGHAN/ESPEN/ESPR Guidelines, 2018

I normala fall behöver flödes hastigheten ökas gradvis under den första timmen och sedan anpassas med hänsyn till dosen, den dagliga tillförda volymen och infusionens varaktighet.

I allmänhet rekommenderas att infusionen för små barn startar på en låg daglig dos, och att den ökas gradvis upp till den maximala dosen (se ovan).

### **Administreringsätt och behandlingslängd**

Endast för engångsbruk.

Det rekommenderas att innehållet används omedelbart efter att påsen har öppnats och får inte sparas för en senare infusion.

Utseende efter rekonstitution: homogen vätska med ett mjölkaktigt utseende.

För anvisningar om beredning och hantering av denna infusionsvätska, emulsion, se avsnitt 6.6 i produktresumén.

På grund av dess höga osmolaritet kan Olimel N7E endast administreras via en central ven.

Den rekommenderade infusionstiden för en parenteral nutritionspåse är mellan 12 och 24 timmar.

Behandling med parenteral nutrition kan fortsätta så länge som patientens kliniska tillstånd kräver det.

### **C. INKOMPATIBILITETER**

Tillsätt inte andra läkemedel eller substanser till någon av påsarnas sektioner eller till den färdigberedda emulsionen utan att först bekräfta deras kompatibilitet och stabiliteten hos den slutliga beredningen (särskilt lipidemulsionens stabilitet).

Inkompatibiliteter kan till exempel uppstå vid alltför hög surhetsgrad (lågt pH) eller olämpligt innehåll av tvåvärdade katjoner ( $\text{Ca}^{2+}$  och  $\text{Mg}^{2+}$ ) vilket kan destabilisera lipidemulsionen. Som med alla parenterala näringsblandningar måste kalcium- och fosfatkvoten beaktas. För stor tillsats av kalcium och fosfat, speciellt i form av mineralsalter, kan leda till att kalciumfosfatutfällningar bildas.

Olimel N7E innehåller kalciumjoner som medför ökad risk för utfälld koagulering i citrat-antikoagulerat blod eller blodkomponenter.

Ceftriaxon får inte blandas eller administreras tillsammans med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Olimel N7E, genom samma infusionsslang (t.ex. via Y-koppling) på grund av risken för utfällning av ceftriaxon-kalciumsalt (se avsnitt 4.4 och 4.5 i produktresumén). Lösningar som innehåller ceftriaxon och kalcium får administreras sekventiellt efter varandra om infusionsslangar vid olika infusionsställen används, eller om infusionsslangen byts ut eller spolats ordentligt med fysiologisk koksaltlösning mellan infusionerna för att undvika utfällning.

Olimel N7E ska inte administreras i samma infusionslinje eller blandas tillsammans med ampicillin eller fosfentoin på grund av risken för utfällning.

Kontrollera kompatibiliteten med lösningar som administreras samtidigt genom samma aggregat, kateter eller kanyl.

Olimel N7E får inte administreras före, samtidigt som eller efter blod genom samma utrustning på grund av risken för pseudoagglutination.

### **D. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING**

En översikt över de förberedande stegen för administrering av Olimel N7E ges i figur 1.

## Öppna

Avlägsna den skyddande ytterpåsen.

Kasta den lilla påsen med syreabsorberaren.

Kontrollera att påsen och de icke-permanenta förslutningarna är oskadda. Använd endast om påsen är oskadd och de icke-permanenta förslutningarna är intakta (dvs. de tre sektionernas innehåll har inte blandats), om aminosyralösningen och glukoslösningen är klara, färglösa eller lätt gulfärgade, praktiskt taget fria från synliga partiklar och om lipidemulsionen är en homogen vätska med mjölkliknande utseende.

## Blanda lösningarna och emulsionen

Kontrollera att produkten har antagit rumstemperatur när de icke-permanenta förslutningarna bryts.

Rulla för hand ihop påsen med början från påsens övre ände (änden med upphängningen). De icke-permanenta förslutningarna öppnas från den sidan som är närmast portarna. Fortsätt att rulla påsen tills förslutningarna är öppna längs halva sin längd.

Blanda genom att vända påsen upp och ned minst tre gånger.

Blandningens utseende efter beredning är en homogen mjölkliknande emulsion.

## Tillsatser

Påsen är tillräckligt stor för att tillsatser som vitaminer, elektrolyter och spårämnen skall kunna tillsättas.

Alla tillsatser (inklusive vitaminer) kan göras i den färdigberedda blandningen (efter att de icke-permanenta förslutningarna har öppnats och innehållet i de tre sektionerna har blandats).

Vitaminer kan också tillsättas i glukossektionen innan blandningen har beretts (innan de icke-permanenta förslutningarna har öppnats och innan de tre sektionerna har blandats).

När tillsatser görs till beredningar som innehåller elektrolyter ska den mängd elektrolyter som redan finns i påsen tas med i beräkningen.

Tillsatser måste göras under aseptiska förhållanden och av kvalificerad personal.

Elektrolyter kan tillsättas i Olimel N7E enligt tabellen nedan:

| Per 1000 ml      |                      |                              |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  | Inkluderad nivå      | Maximal ytterligare tillsats | Maximal total nivå           |
| Natrium          | 35 mmol              | 115 mmol                     | 150 mmol                     |
| Kalium           | 30 mmol              | 120 mmol                     | 150 mmol                     |
| Magnesium        | 4,0 mmol             | 1,6 mmol                     | 5,6 mmol                     |
| Kalcium          | 3,5 mmol             | 1,5 (0,0 <sup>a</sup> ) mmol | 5,0 (3,5 <sup>a</sup> ) mmol |
| Oorganisk fosfat | 0 mmol               | 3,0 mmol                     | 3,0 mmol                     |
| Organisk fosfat  | 15 mmol <sup>b</sup> | 10 mmol                      | 25 mmol <sup>b</sup>         |

<sup>a</sup> Värdet motsvaras av tillsatsen av oorganisk fosfat.

<sup>b</sup> Inkluderar fosfat som kommer från lipidemulsionen.

### Spårämnen och vitaminer:

Stabilitet har demonstrerats för vitamin- och spårämnespreparat som finns i handeln (innehållande upp till 1 mg järn).

Information om kompatibilitet för andra tillsatser finns på begäran.

Att göra en tillsats:

- Iaktta aseptiska förhållanden.
- Förbered påsens injektionsport.
- Punktera injektionsporten och injicera tillsatserna med en injektionsnål eller en beredningsanordning.
- Blanda innehållet i påsen och tillsatserna.

### **Förbereda infusionen**


Iaktta aseptiska förhållanden.

Häng upp påsen.


Avlägsna plastskyddet från administreringsporten.

För in infusionsaggregatets spike ordentligt i administreringsporten.


**Figur 1. Beredningssteg för administrering av Olimel N7E**




Öppna ytterpåsen genom att riva av från toppen.




Dra av ytterpåsens framsida för att få fram Olimel N7E-påsen. Kasta ytterpåsen och den lilla syrepåsen.




Lägg påsen platt på en horisontell och ren yta med handtaget framför dig.



Lyft upphängningsdelen för att tömma lösningen från den övre delen av påsen. Rulla ordentligt den övre delen av påsen tills förslutningarna är helt öppna (ungefär halvvägs).



Blanda genom att vända påsen upp och ned minst tre gånger.



Häng upp påsen. Vrid av skyddet från administreringsporten. Anslut spike-kontaktdonet ordentligt.

## Administrering

Endast för engångsbruk

Administrera produkten först efter att de icke-permanenta förslutningarna mellan de tre sektionerna har brutits och innehållet i de tre sektionerna har blandats.

Kontrollera att den slutliga emulsionen för infusion inte visar några tecken på fassparation.

Efter att påsen öppnats måste innehållet användas genast. Den öppnade påsen får aldrig sparas för en senare infusion. Återanslut aldrig en delvis förbrukad påse.

Seriekoppla inte påsarna, risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av gasrester i den primära påsen.

Ej använt läkemedel, avfall och alla berörda instrument ska kasseras.

### Extravasation

Övervaka kateterområdet regelbundet för att identifiera tecken på extravasation.

Om extravasation förekommer ska administreringen avbrytas omedelbart. Katetern eller kanylen ska sitta kvar så att patienten kan få omedelbar hjälp. Om möjligt ska vätskan aspireras genom den insatta katetern/kanylen så att mängden vätska minskar i vävnaderna innan katetern/kanylen tas bort.

För alla skador som orsakats av den extravaserade produkten (inklusive den produkt/de produkter som blandas med Olimel N7E om tillämpligt) ska specifika åtgärder vidtas i enlighet med skadans skede/omfattning. Behandlingsalternativen kan omfatta icke-farmakologiska, farmakologiska och/eller kirurgiska ingrepp. Om extravasationen är stor ska en plastikkirurg rådfrågas inom de närmaste 72 timmarna.

Extravasationsområdet ska övervakas minst var fjärde timme under de första 24 timmarna, därefter en gång per dag.

Infusionen får inte påbörjas på nytt i samma centrala ven.