

Bipacksedel: Information till patienten

Palbociclib Avansor 75 mg filmdragerade tabletter
Palbociclib Avansor 100 mg filmdragerade tabletter
Palbociclib Avansor 125 mg filmdragerade tabletter

palbociklib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Palbociclib Avansor är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Palbociclib Avansor
3. Hur du tar Palbociclib Avansor
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Palbociclib Avansor ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Palbociclib Avansor är och vad det används för

Palbociclib Avansor är ett läkemedel mot cancer, som innehåller den aktiva substansen palbociklib.

Palbociklib fungerar genom att blockera proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 och 6 vilka reglerar cellernas tillväxt och delning. När dessa proteiner blockeras kan cancercellernas tillväxt bromsas så att sjukdomen utvecklas långsammare.

Palbociclib Avansor används för behandling av patienter med en viss typ av bröstcancer (hormonreceptorpositiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ) som har spridit sig utanför den ursprungliga tumören och/eller till andra organ. Det ges tillsammans med aromatashämmare eller fulvestrant, som är hormonbehandlingar mot cancer.

Palbociklib som finns i Palbociclib Avansor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Palbociclib Avansor

Ta inte Palbociclib Avansor

- om du är allergisk mot palbociklib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- användning av produkter innehållande johannesört, ett växtbaserat läkemedel som används vid lätt nedstämdhet och oro, ska undvikas samtidigt som du tar Palbociclib Avansor.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Palbociclib Avansor.

Palbociclib Avansor kan minska antalet vita blodkroppar och försvaga ditt immunsystem. Därför kan risken öka för att du ska få en infektion när du tar Palbociclib Avansor.

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får några tecken eller symtom på en infektion, till exempel frossa eller feber.

Blodprover tas regelbundet under behandlingen för att se om Palbociclib Avansor påverkar dina blodkroppar (vita och röda blodkroppar samt blodplättar).

Palbociclib Avansor kan orsaka blodproppar i vener. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får några tecken eller symtom på blodproppar i venerna som till exempel smärta eller stelhet, svullnad och rodnad i det berörda benet (eller den berörda armen), bröstsmärta, andfåddhet eller svimningskänsla.

Palbociclib Avansor kan orsaka allvarlig eller livshotande inflammation i lungorna under behandlingen, vilket kan leda till döden. Tala omedelbart om för hälso- och sjukvårdspersonal om du får nya eller förvärrade symtom som omfattar:

- svårighet att andas eller andfåddhet
- torrhosta
- bröstsmärta

Barn och ungdomar

Palbociclib Avansor ska inte användas till barn eller ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Palbociclib Avansor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Palbociclib Avansor kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

Följande läkemedel kan i synnerhet öka risken för biverkningar av Palbociclib Avansor:

- Lopinavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, telaprevir och sakvinavir, som används för att behandla hiv-infektion/aids.
- Klaritromycin och telitromycin, som är antibiotika mot bakterieinfektioner.
- Vorikonazol, itraconazol, ketokonazol och posakonazol, som används för att behandla svampinfektioner.
- Nefazodon som används för att behandla depression.

Följande läkemedel kan öka risken för biverkningar om de tas tillsammans med Palbociclib Avansor:

- Kinidin som ofta används för att behandla problem med hjärtrytm.
- Kolkicin som används för att behandla gikt.
- Pravastatin, simvastatin, atorvastatin, fluvastatin och rosuvastatin, som används för att behandla höga kolesterolvärden.
- Sulfasalazin som används för att behandla reumatoid artrit.
- Alfentanil som används vid narkos. Fentanyl som används som smärtlindring före ingrepp och även som narkosmedel.
- Ciklosporin, everolimus, takrolimus och sirolimus, som används vid organtransplantationer för att förhindra avstötning.
- Dihydroergotamin och ergotamin, som används för att behandla migrän.
- Pimozid som används för att behandla schizofreni och kronisk psykos.

Följande läkemedel kan minska effekten av Palbociclib Avansor:

- Karbamazepin och fenytoin, som används för att häva krampanfall.
- Enzalutamid som används för att behandla prostatacancer.
- Rifampin som används för att behandla tuberkulos.
- Johannesört, växtbaserat läkemedel eller växtbaserad produkt, som används mot lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Palbociclib Avansor med mat och dryck

Palbociclib Avansor -tabletter kan tas med eller utan mat.

Undvik grapefrukt och grapefruktjuice medan du tar Palbociclib Avansor eftersom det kan öka biverkningarna av Palbociclib Avansor.

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte använda Palbociclib Avansor om du är gravid.

Du ska undvika att bli gravid medan du tar Palbociclib Avansor.

Diskutera preventivmedel med din läkare om det finns en risk för att du eller din partner blir gravid.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Kvinnor i fertil ålder som får detta läkemedel, eller deras manliga partner, ska använda lämpliga preventivmedel (t ex två barriärmetoder såsom kondom och pessar). Dessa preventivmedel ska användas under behandlingen och i minst 3 veckor efter avslutad behandling för kvinnor och 14 veckor för män.

Amning

Du bör inte amma medan du tar Palbociclib Avansor. Det är inte känt om Palbociclib Avansor utsöndras i bröstmjolk.

Fertilitet

Palbociclib kan minska fertiliteten hos män.

Män bör därför överväga spermaförvaring innan de tar Palbociclib Avansor.

Körförmåga och användning av maskiner

Trötthet är en mycket vanlig biverkning av Palbociclib Avansor. Om du känner dig ovanligt trött ska du vara särskilt försiktig när du kör något fordon eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Palbociclib Avansor innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Palbociclib Avansor

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Palbociclib Avansor är 125 mg en gång dagligen i 3 veckor, följt av 1 vecka då du inte tar Palbociclib Avansor. Din läkare talar om för dig hur många Palbociclib Avansor -tabletter du ska ta.

Om du får vissa biverkningar när du tar Palbociclib Avansor (se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar") kan det hända att läkaren sänker dosen eller avbryter behandlingen, tillfälligt eller helt och hållet. Dosen kan sänkas till en av de andra tillgängliga styrkorna, 100 mg eller 75 mg.

Ta Palbociclib Avansor en gång dagligen, vid ungefär samma tidpunkt varje dag, med eller utan mat.

Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas. Dela inte tabletterna innan du sväljer dem. Ta inte en tablett som är trasig, sprucken eller på annat sätt inte är intakt.

Om du har tagit för stor mängd av Palbociclib Avansor

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med dig kartongen och denna bipacksedel så att läkaren vet vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Palbociclib Avansor

Om du missar en dos eller kräks upp den ska du ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Palbociclib Avansor

Sluta inte att ta Palbociclib Avansor om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkaren omedelbart om du får något av följande symtom:

- feber, frossa, svaghet, andfåddhet, blödning eller tendens att lätt få blåmärken, vilket kan vara tecken på en allvarlig blodsjukdom
- svårighet att andas, torrhosta eller bröstsmärta, vilket kan vara tecken på inflammation i lungorna.
- smärtande svullet ben, bröstsmärta, andfåddhet, snabb andning eller snabb puls, eftersom dessa kan vara tecken på blodproppar i venerna (vilket kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

Andra biverkningar av Palbociclib Avansor kan vara:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- Infektioner
- Minskat antal vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.
- Trötthet
- Minskad aptit. Inflammation i munnen och läpparna (stomatit), illamående, kräkningar, diarré.
- Hudutslag
- Håravfall
- Svaghet
- Feber
- Onormala leverfunktionsvärden i blodprover
- Torr hud

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Feber med minskat antal vita blodkroppar (febril neutropeni)
- Dimsyn, rinnande ögon, torra ögon
- Smakförändring (dysgeusi)
- Näsblod
- Rodnad, smärta, flagnande hud, svullnad och blåsor på handflator och/eller fotsulor (palmarplantar erytrodysestesisyndrom [PPES])
- Onormala njurvärden i blodprover (höga kreatininvärden i blodet)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Hudinflammation som orsakar röda, fjällande fläckar och som eventuellt förekommer tillsammans med smärta i leder och feber (kutan lupus erythematosus [CLE]).
- Hudreaktion som orsakar röda prickar eller fläckar på huden, som kan se ut som en måltavla med ett mörkrött centrum omgivet av blekare röda ringar (erythema multiforme).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Palbociclib Avansor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker att förpackningen är skadad eller ser ut att ha manipulerats. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är palbociclib.

Palbociclib Avansor 75 mg filmdragerade tabletter: varje tablett innehåller 75 mg palbociclib.

Palbociclib Avansor 100 mg filmdragerade tabletter: varje tablett innehåller 100 mg palbociclib.

Palbociclib Avansor 125 mg filmdragerade tabletter: varje tablett innehåller 125 mg palbociclib.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon, kopovidon, magnesiumstearat, bärnstenssyra, natriumstearyl fumarat (tablettkärnan) hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin, röd järnoxid (E172), hypromellos (filmdragering). (se avsnitt 2 ”Palbociclib Avansor innehåller natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarPalbociclib Avansor 75 mg filmdragerade tabletter

Rosa, runda, bikonvexa tabletter, ca. 9 mm diameter och märkat med ”L” på den ena sidan och släta på den andra sidan.

Palbociclib Avansor 100 mg filmdragerade tabletter

Röda, ovala bikonvexa tabletter, ca 15 mm långa och 7 mm breda, märkta med ”I” på den ena sidan och släta på den andra sidan.

Palbociclib Avansor 125 mg filmdragerade tabletter

Rosa, ovala, bikonvexa tabletter, ca. 16 mm långa och 8 mm breda, märkta med "H" på den ena sidan och släta på den andra sidan.

Palbociclib Avansor 75 mg, 100 mg och 125 mg finns i oPA/Al/PVC/Al blister innehållande 21 eller 63 tabletter i en kartong.

Palbociclib Avansor 75 mg, 100 mg och 125 mg finns i oPA/Al/PVC/Al endosblister. Varje kartong innehåller 21x1 eller 63x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Avansor Pharma Oy
Teknikvägen 14
02150 Esbo
Finland

Tillverkare

Synthon Hispania, S.L.
c/ Castelló, 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-05-07