

Bipacksedel: information till användaren

Paracut Forte 1 g tabletter paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracut Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Paracut Forte
3. Hur du använder Paracut Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Paracut Forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Paracut Forte är och vad det används för

Paracut Forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

Paracut Forte används mot värk och smärtor av olika slag, t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärter, muskelsmärter och reumatiska smärtor samt vid feber, t.ex. vid förkylningar.

Paracut Forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Paracetamol som finns i Paracut Forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracut Forte

Använd inte Paracut Forte

- om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder paracetamol.

Var särskilt försiktig med Paracut Forte

- om du har nedsatt lever- eller njurfunktion
- om du har alkoholproblem
- Tag aldrig mer Paracut Forte än vad läkaren har ordinerat. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracut Forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

- *Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symptomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.*
- *Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk. Använd inte Paracut Forte utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracut Forte tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracut Forte.*
- *Paracut Forte bör ej användas för långvarigt bruk, eftersom det finns risk för skador på njurar.*

Under behandling med Paracut Forte, kontakta genast läkare

- om du har svåra sjukdomar t.ex. svårt nedsatt njurfunktion eller sepsis (när bakterier och deras toxiner cirkulerar i blodet och orsakar organskador), vid undernäring, kronisk alkoholism eller om du samtidigt tar flukloxacillin (läkemedel mot infektioner). Allvarlig blod- och vätskerubbning s.k. metabolisk acidosis har rapporterats hos patienter i dessa situationer, när paracetamol ges i rekommenderade doser under en längre period eller när paracetamol tas tillsammans med flukloxacillin. Symtom på metabolisk acidosis kan inkludera:
 - allvarliga andningssvårigheter med djup och snabb andning
 - dåsighet, illamående och kräkningar

Andra läkemedel och Paracut

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Paracut Forte kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel / naturläkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

- Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)
- Rifampicin (antibiotika)
- Probenicid (läkemedel mot gikt)
- Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Paracut Forte anses inte påverka effekten av warfarin.
- Kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.
- Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.
- Johannesört (hypericum, ingår i vissa naturläkemedel)
- Flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidosis) som kräver skyndsam behandling (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).

Paracut Forte med mat och dryck

Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av paracetamol blir långsammare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Paracut användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare/barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracut Forte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av Paracut Forte påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.

3. Hur du använder Paracut Forte

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn över 40 kg (> 12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Paracut Forte tabletter kan delas och de skall sväljas med vatten (t.ex. ½ glas vatten).

Om du har tagit för stor mängd av Paracut Forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

Om du har glömt att ta Paracut Forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Paracut Forte orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Paracut Forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom. Ring eventuellt 112:

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Angioödem
 - svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 - svårigheter att svälja
 - nässelutslag och andningssvårigheter.
- Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktion med andnöd, minskat blodtryck, chock)
- Störningar i blodbildningen (inklusive agranulocytos). Paracut Forte kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.
- Kramp i luftrören (svårigheter att andas)
- Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Ett allvarligt tillstånd som kan göra blodet för surt (s.k. metabolisk acidosis) hos patienter med svår sjukdom som använder paracetamol (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): trötthet, illamående, kräkningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, svettningar, nedsatt kroppstemperatur, yrsel, nervositet, diarré, magsmärtor (inklusive kramp och brännande känsla), förstoppning, halsbränna

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): rodnad i huden

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Paracut Forte ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är paracetamol 1 g i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, kapselformad tablett med brytskåra. Längden är 22,5 mm och bredden är 9 mm.

5, 30 och 100 tabletter i blisterförpackning eller i tablettburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitalbans Oy

Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-03-21