

Peceve 800 mg filmdragerade tabletter

Peceve 1 g filmdragerade tabletter

Observera att Din läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Peceve?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: fenoxymetylpencicillinkalium 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen: povidon, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, magnesiumstearat, basisk butylerad metakrylatsampolymer och makrogol.

Hur verkar Peceve?

Peceve är ett penicillin som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 19 00

Tillverkare

A/S ROSCO, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark.

Vad används Peceve för?

Vid bakteriella infektioner bl.a. i luftvägarna t.ex. halsfluss, öroninflammation, infektioner i näshålans bihålor, vid luftrörskatarr och lunginflammationer samt vid bakterieinfektioner i hud och underhud, borreliainfektion och tandinfektion.

När skall Peceve inte användas?

Av personer som tidigare konstaterats vara överkänsliga för penicillin.

Att tänka på innan och när Peceve används

Du som är överkänslig för cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska informera läkaren om detta innan Peceve används.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Fenoxymetylpencicillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. *Rådgör dock alltid med läkare innan du använder Peceve under amning.*

Trafikvarning

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Vad skall Du undvika när Du använder Peceve?

Behandlande läkare behöver känna till om du tar andra läkemedel samtidigt. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Peceve, t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) och mot gikt (probenicid).

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandlingen med Peceve.

Hur skall Du använda Peceve?

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Peceve ger den bästa effekten om medicinen tas på fastande mage eller en timme före eller två timmar efter måltid.

Även om du känner dig bättre efter några dagar är det viktigt att hela Pecevekuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

Vad händer om Du tagit för stor dos?

Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vilka biverkningar kan Peceve ge?

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring, samt hudutslag.

Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändringar (eosinofili).

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25° C.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Denna bipacksedel reviderades: 2009-09-01